



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**СЕМЕНА ГОРОХА  
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10246—86**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**РАЗРАБОТАН** Госагропромом СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. Н. Зеленов, А. Ф. Путинцев, Г. Г. Котляров, А. П. Де-Милло,  
Н. А. Цветкова, А. М. Корн

**ВНЕСЕН** Госагропромом СССР

Зам. председателя Г. А. Романенко

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государст-  
венного комитета СССР по стандартам от 12 декабря 1986 г.  
№ 3810

СЕМЕНА ГОРОХА.  
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

Технические условия

Pea seeds Varietal and sowing  
characteristics Specifications

ГОСТ  
10246—86

Взамен  
ГОСТ 10246—81

ОКП 97 1610

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 декабря 1986 г. № 3810 срок действия установлен

с 01.07.87  
до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена гороха, предназначенные для посева.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для посева должны использоваться семена гороха районированных и перспективных сортов, утвержденные в установленном порядке.

1.2. Сортовая чистота семян гороха питомников размножения, суперэлиты и элиты должна быть не менее 99,7%, засоренность их посевов пелюшкой не допускается.

1.3. Семена гороха первой и последующих репродукций в зависимости от сортовой чистоты делят на три категории в соответствии с нормами, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Категория	Сортовая чистота, %, не менее	Примесь пелюшки в посевах сортов продовольственного гороха, %, не более
I	99,5	0,5
II	98,0	1,0
III	95,0	1,0

1.4. По посевным качествам семена гороха делят на два класса, которые должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для класса	
	1	2
Чистота, %, не менее	99,00	97,00
Содержание семян других растений, шт. на 1 кг, не более	5	30
в том числе семян сорных растений, шт. на 1 кг, не более	Не допускается	5
Всхожесть, %, не менее	95	90
Влажность, %, не более:		
а) для Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Калмыцкой АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Краснодарского и Ставропольского краев, Алма-Атинской, Астраханской, Волгоградской, Ворошиловградской, Гурьевской, Джамбулской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Крымской, Одесской, Кзыл-Ординской, Мангышлакской, Николаевской, Ростовской, Херсонской и Чимкентской областей	14,0	14,0
б) для Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Мордовской АССР, Татарской АССР, Чувашской АССР, Брянской, Владимирской, Волынской, Горьковской, Ивановской, Ивано-Франковской, Калининградской, Калининской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Львовской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ровенской, Рязанской, Смоленской, Тернопольской, Тульской, Ярославской областей	15,5	15,5
в) для Бурятской АССР, Карельской АССР, Коми АССР, Тувинской АССР, Удмуртской АССР, Якутской АССР, Марийской АССР, Башкирской АССР, Алтайского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Актыубинской, Амурской, Архангельской, Вологодской, Восточно-Казахстанской, Джезказганской, Камчатской, Карагандинской, Кемеровской, Кировской, Кокчетавской, Курганской, Кустанайской, Иркутской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Павлодарской, Пермской, Сахалинской, Свердловской, Северо-Казахстанской, Семипалатинской, Томской, Тургайской, Тюменской, Уральской, Целиноградской, Челябинской и Читинской областей	16,0	17,0
г) для всех остальных областей, краев и республик	15,0	15,0
Примесь пелюшки, %, не более	Не допускается	1,00

Примечание. Допускается с разрешения Госагропрома СССР, исходя из местных климатических условий, всхожесть заготавливаемых и высеваемых семян менее установленных норм 2-го класса: для посева на семена и зерно — до 3%, для посева на кормовые цели — до 5%.

1.5. Семена питомников размножения, суперэлиты и элиты по посевным качествам должны соответствовать требованиям 1-го класса.

1.6. Влажность семян гороха, закладываемых для хранения на год и более, а также закладываемых на хранение в металлические силосы или емкости силосного типа, должна быть не более 14%.

1.7. В семенах, используемых для посева на кормовые цели, допускается содержание семян других культурных растений в пределах отхода; семена пелюшки допускается не учитывать в семенах, предназначенных для посева на кормовые цели.

1.8. Семена гороха в зависимости от назначения должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Назначение семян	Репродукция	Категория	Класс
		не ниже	
Семена, высеваемые и реализуемые для размножения опытно-производственными хозяйствами научно-исследовательских учреждений и учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов и техникумов	Питомники размножения, суперэлита, элита I	По п. 1.2	1
		I	2
	Семена, высеваемые для размножения и реализуемые специализированными семеноводческими хозяйствами, семеноводческими бригадами и отделениями колхозов, совхозов и других хозяйств	I—II III—IV	I
II			2
Семена, высеваемые в колхозах, совхозах и других хозяйствах для получения товарного зерна	II и последующие репродукции	III	2

1.9. Семена гороха должны быть протравлены по ГОСТ 23914—79.

1.10. Не допускаются к посеву семена гороха при наличии в них:

карантинных сорняков (семян и плодов), вредителей и болезней, в соответствии с перечнем, утвержденным Госагропромом СССР 6 августа 1986 г.;

семян ядовитых сорняков гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой;

живых вредителей и личинок, повреждающих семена данной культуры, кроме клеща и гороховой зерновки, наличие которой допускается в количестве не более 10 шт. на 1 кг семян.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортные качества семян гороха определяют апробацией посевов по документации, указанной в справочном приложении.

3.2. Посевные качества семян определяют — по ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12043—66, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81, ГОСТ 12046—85, ГОСТ 12047—85.

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Семена гороха питомников размножения, суперэлиты, элиты и первой репродукции, подлежащие реализации, упаковывают в тканевые мешки по ГОСТ 18225—72 массой нетто не более 50 кг, допускаемые отклонения по массе заполненных мешков  $\pm 1\%$ .

4.2. Каждый мешок должен быть зашит.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

На каждый мешок с семенами должна быть нанесена маркировка с указанием:

наименования культуры;

сорта;

репродукции;

сортовой чистоты;

класса по посевным качествам;

года урожая;

номера партии семян;

массы нетто семян;

наименования и номера сортового документа;

названия и адреса хозяйства, вырастившего семена;

обозначения настоящего стандарта.

В каждый мешок с семенами вкладывают этикетку с теми же данными, на которой допускается не указывать класс по посевным качествам.

4.4. Семена гороха транспортируют всеми видами транспорта по правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. При транспортировании семян железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. Транспортирование семян гороха пакетами — по ГОСТ 21929—76. Высота пакета не должна превышать 1,2 м, масса пакета должна быть не более 1 т.

4.5. Семена гороха хранят в закрытых, обеззараженных помещениях.

4.6. Каждую партию семян гороха, упакованную в мешки, укладывают отдельными штабелями. В складах с асфальтированным, бетонным или каменным полом мешки кладут на поддоны или деревянные настилы, отстоящие от пола не менее чем на 15 см. Число рядов мешков, уложенных друг на друга, должно быть не более восьми, ширина штабеля — не более длины двух мешков. Допускается высота штабеля 15 мешков при влажности семян не более 14%.

Проходы между штабелями, а также штабелями и стенами складского помещения должны быть не менее 0,7 м, а проходы между штабелями для приема и отпуска семян — не менее 1,5 м.

4.7. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекладывают не менее одного раза в 4 месяца, при этом верхние ряды мешков кладут в нижний ряд, а нижние — наверх.

4.8. Допускается транспортирование и хранение семян гороха первой и последующих репродукций насыпью.

---

**НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ**

Апробацию сортовых посевов гороха проводят по Инструкции по апробации сортовых посевов, утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 19 мая 1978 г.

Редактор *А. А. Зимовнова*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб 12 01 87 Подп в печ 03 03 87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр-отт. 0,36 уч-изд. л.  
Тир 20 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 66