

СПРАВОЧНИК

МЕТОДЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МИКРОКОЛИЧЕСТВ  
ПЕСТИЦИДОВ  
В ПРОДУКТАХ  
ПИТАНИЯ,  
КОРМАХ  
И ВНЕШНЕЙ  
СРЕДЕ

Том 2

СПРАВОЧНИК

МЕТОДЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МИКРОКОЛИЧЕСТВ  
ПЕСТИЦИДОВ  
В ПРОДУКТАХ  
ПИТАНИЯ,  
КОРМАХ  
И ВНЕШНЕЙ  
СРЕДЕ

В ДВУХ ТОМАХ

Том 2



МОСКВА ВО «АГРОПРОМИЗДАТ» 1992

ББК 41.4  
М54  
УДК 631.58(035)

Составители: М. А. Клисенко, А. А. Калинина, К. Ф. Новикова,  
Г. А. Хохолькова

Редакторы: А. А. Белоусова, Е. М. Козига

**М54** **Методы** определения микроколичеств пестицидов в про-  
дуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. —  
Т. 2/Сост. Клисенко М. А., Калинина А. А., Новикова К. Ф.  
и др. — М.: Агропромиздат, 1992. — 416 с.: ил.  
ISBN 5—10—002699—5.

Во второй том справочника включены официально утвержденные методики определения шестичленных гетероциклических соединений, веществ, применяемых при биологической защите растений; приведены методические указания по контролю уровней и изучению динамики содержания пестицидов в почве и растениях, систематический ход определения смесей пестицидов в одной пробе; методика определения различных пестицидов в воздухе рабочей зоны.

М 4105020000—059 19—92  
035(01)—92

ББК 41.4

ISBN 5—10—002772—X  
ISBN 5—10—002699—5 (т. 2)

© М. А. Клисенко, А. А. Калинина,  
К. Ф. Новикова, Г. А. Хохолько-  
ва, составление, 1992

Утверждено 24.08.83 № 2860—83 (метод ТСХ)  
03.01.85 № 3196—85 (метод ГЖХ)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ДИАЗИНОНА, ЭПТАМА, ГАММА-ИЗОМЕРА ГХЦГ,  
ФЕНМЕДИФАМА, ЛЕНАЦИЛА, ФОСФАМИДА И ПИРАЗОНА  
ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОЗДУХЕ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ\***

Краткая характеристика препаратов. Диазинон (см. с. 60). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м<sup>3</sup>.

Эптам (см. с. 389 (т. 1)). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 2,0 мг/м<sup>3</sup>.

Гамма-изомер ГХЦГ (см. с. 13 (т. 1)). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК ГХЦГ в воздухе рабочей зоны 0,05 мг/м<sup>3</sup>.

Фенмедифам (см. с. 368 (т. 1)). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

Ленацил - 3 - циклогексил - 5,6 - триметиленурацил. Брутто - формула C<sub>13</sub>H<sub>17</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Молекулярная масса 234,3. Синоним — гексилур. Белое кристаллическое вещество. Т. пл. 315—317 °С. Практически нелетуч. Растворимость в воде 6 мг/л, в большинстве органических растворителей — 40 г/кг. В воздухе может находиться в виде аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

Фосфамид (см. с. 64 (т. 1)). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

Пиразон-5-амино-2-фенил-4-хлор-пиридазон-3. Брутто-формула C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>ClN<sub>2</sub>O. Молекулярная масса 221,7. Синонимы — пирамин, феназон, хлоридазон. Белое кристаллическое вещество. Т. пл. 205—206 °С. Давление паров 9,9 Па при 40 °С. Растворимость в воде 400 мг/л, ацетоне — 28 г/кг, метаноле — 34, бензоле — 0,7 г/кг. Плохо растворим в петролейном эфире. В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

Методика определения диазинона, эптама, гамма-изомера ГХЦГ, фенмедифама, ленацила, фосфамида и пиразона в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. Принцип метода. Метод основан на хроматографировании препаратов в тонком слое силикагеля (пластинки «Силуфол») с последующим обнаружением зон локализации препаратов путем использования следующих реагентов: бромфеноловый синий; 2,6-дибром-N-оксихино-

\* Разработаны И. Г. Белашовой (КНИИГТиПЗ).

## 180. Метрологическая характеристика метода

Препарат	Нижний предел измерения в анализируемом объеме пробы, мкг (ТСХ), иг (ГЖХ)	Нижний предел измерения в воздухе, мг/м <sup>3</sup>	Диапазон измеряемых концентраций, мг/м <sup>3</sup>	Граница суммарной погрешности, %
<i>Метод тонкослойной хроматографии*</i>				
Диазинов	2	0,044*	0,044—0,660	±18,4
Эптам	1	0,22	0,022—0,660	±18,4
γ-ГХЦГ	1	0,22	0,022—0,660	±18,4
Фенмедифам	1	0,22	0,022—0,660	±18,4
Ленацил	0,5	0,011	0,011—0,440	±18,4
Фосфамид	0,5	0,011	0,011—0,440	±18,4
Пиразон	0,5	0,011	0,011—0,440	±18,4
<i>Метод газожидкостной хроматографии**</i>				
γ-ГХЦГ	0,1	0,002	0,002—0,5	±16,3
Пиразон	1	0,02	0,02—1,6	±16,3
Диазинов	5	0,1	0,1—4,0	±16,3
Фосфамид	5	0,1	0,1—12,0	±16,3
Фенмедифам	5	0,1	0,1—12,0	±16,3

\* При отборе 45 л воздуха

\*\* При отборе 10 л воздуха

нимин; *o*-толидин; дифениламин; *o*-толуидин; иодкрахмальный реактив. Отбор проб проводят с концентрированием (бумажный фильтр «синяя лента», пенополиуретан эластичный).

Метрологическая характеристика метода представлена в таблице 180.

**Избирательность метода.** Определению не мешают другие компоненты технических препаратов (40%-ный с. п. диазинона; 75%-ный к. э. эптама, 90%-ный техн. препарат гамма-изомера ГХЦГ; 16%-ный к. э. фенмедифама; 80%-ный с. п. ленацила; 40%-ный к. э. фосфамида; 60%-ный с. п. пиразона).

**Реактивы, растворы, материалы.** Диазинов х. ч. Эптам х. ч. Гамма-изомер ГХЦГ х. ч. Фенмедифам х. ч. Ленацил х. ч. Фосфамид х. ч. Пиразон х. ч. Ацетон х. ч. Хлороформ ч. д. а. *n*-Гексан ч. Эфир диэтиловый х. ч. Бензол х. ч. Толуол ч. д. а. Метанол х. ч. Этанол 96%-ный. Хлороводородная кислота х. ч. Лимонная кислота х. ч., 2%-ный раствор. Ледяная уксусная кислота х. ч. Гидроксид натрия х. ч., 0,5%-ный раствор. Пероксид водорода х. ч., 3%-ный раствор. Нитрат серебра ч. д. а. Вольфрам натрия ч., 10%-ный раствор. Перманганат калия х. ч. Иодид калия х. ч. Крахмал растворимый. Бромфеноловый синий ч. д. а. *орто*-толидин ч. *орто*-толуидин ч. Дифениламин ч. д. а. 2,6-Дибром-*N*-оксихинонимин. Фильтры бумажные «синяя лента». Пенополиуретан эластичный бесцветный, очищенный ацетоном в течение 12 ч, а затем хлороформом в течение 36—48 ч в аппарате Сокслета. После очистки нарезают кусочки размером 2—3 мм и 5—6 мм.

**Подвижные фазы:** гексан—ацетон (4:1); гексан—эфир диэтиловый (2:1); гексан—бензол (1:1); гексан—толуол (1:1); бензол—метанол—ацетон (7:1:2); бензол—метанол—эфир диэтиловый (7:1:2,5).

**Проявляющие реагенты:**

№ 1—раствор 0,05 г бромфенолового синего в 10 мл ацетона разбавляют до 100 мл 0,5%-ным водно-ацетоновым (1 часть воды+3 части ацетона) раствором нитрата серебра. Для обесцвечивания фона используется 2%-ный раствор лимонной кислоты. Реактив устойчив длительное время;

№ 2 — 0,5%-ный раствор 2,6-дибром-N-оксихинолина в *n*-гексане. Устойчив длительное время;

№ 3 — смесь равных объемов раствора А и Б. Раствор А — 0,5%-ный профильтрованный раствор *o*-толидина в ацетоне. Хранится на холоду 3 дня. Раствор Б — 3 части 0,5%-ного раствора гидроксида натрия и 2 части 3%-ного раствора пероксида водорода. Используется свежеприготовленным;

№ 4 — 1%-ный раствор дифениламина в ацетоне. Используется свежеприготовленным;

№ 5 — 160 мг *o*-толидина растворить в 30 мл ледяной уксусной кислоты, раствор довести до 50 мл дистиллированной водой и добавить 1 г иодида калия. Реагент устойчив месяц;

№ 6 — 32 мг *o*-толуидина растворить в 10 мл 1 н. раствора уксусной кислоты, добавить 1,5 мл 10%-ного раствора вольфрама натрия, 25 мг иодида калия и 12 мл ацетона. Реагент используется свежеприготовленным;

№ 7 — 5 мл 1%-ного раствора иодида калия смешать с 5 мл 3%-ного свежеприготовленного раствора крахмала и добавить 2 мл этанола. Реагент используется свежеприготовленным.

Стандартные растворы препаратов в ацетоне или хлороформе концентрации 100 мкг/мл. Готовят из химически чистых или технических препаратов с учетом содержания действующего начала. Растворы хранятся 3 мес.

**Приборы; посуда.** Аспирационное устройство. Фильтродержатели. Поглотительные трубки гофрированные, стеклянные длиной 5 см, наполненные пенополиуретаном (кусочки размером 2—3 мм, на торцах — по 5—6 мм). Ротационный испаритель с набором колб. Водяная баня. Аппарат Сокслета. Посуда стеклянная лабораторная. Пластины «Силуфол» размером 150×150 мм. Камеры хроматографические. Пульверизаторы стеклянные. Лампа УФ-света ОКН-11. Камера для хлорирования (можно использовать большой эксикатор). На дно камеры помещают чашку Петри со взвешенным марганцовокислым калием (4—5 г), в нее наливают 12—15 мл концентрированной хлороводородной кислоты. Камера готова к использованию через 10 мин.

**Условия отбора проб воздуха.** Исследуемый воздух со скоростью 1,5 л/мин аспирируют через последовательно соединенные фильтр «синяя лента», 1-ю поглотительную трубку с пенополиуретаном и 2-ю поглотительную трубку с пенополиуретаном, смоченным дистиллированной водой (для улавливания паров фосфамида). Воздух аспирируют в течение 30 мин. Для определения 1/2 ПДК препаратов следует отобрать не более 45 л воздуха. Пробы хранятся в закрытых склянках 12 дней.

**Ход анализа.** Фильтр в колбе заливают 10 мл ацетона, закрывают пробкой и оставляют на 1 ч. Пенополиуретан из первой и второй поглотительной трубки помещают в 2 разные колбочки, заливают по 25 мл хлороформа, закрывают пробками и оставляют на 15 мин при периодическом перемешивании. Раствор пробы с фильтра и с пенополиуретана 1-й поглотительной трубки сливают в колбу ротационного испарителя, фильтр промывают дважды по 5 мл ацетона, а пенополиуретан тщательно отжимают. Раствор пробы с пенополиуретаном 2-й поглотительной трубки сливают в ту же колбу ротационного испарителя через слой безводного сульфата натрия, тщательно отжимая пенополиуретан. Растворитель отгоняют до объема 0,1—0,2 мл. Остаток в колбе ротационного испарителя количественно наносят на предварительно размеченную хроматографическую пластинку «Силуфол» в точку А (рис. 20), которая находится на высоте 3,5 см от нижнего края пластинки и на расстоянии 1,5 см от левого края пластинки. В точку Б, находящуюся на высоте 3,5 см от нижнего края пластинки и на расстоянии 1,5 см от правого края пластинки, наносят по 0,03 мл стандартных растворов диазинона и эптама, что соответствует 3 мкг каждого вещества. Пластинку помещают в хроматографическую камеру, в которую за 30 мин до хроматографирования была налита подвижная фаза гексан—ацетон (4:1) или гексан—эфир (2:1), и подвергают первому хроматографированию (на рисунке 20 — на-




Рис. 20. Схема № 1 (ТСХ) разметки пластин и пояснения (размеры в см):

точки нанесения: А — пробы; В — смеси стандартных растворов диазинона и эптама; Г — смеси стандартных растворов фенмедифама, ленацила, фосфамида и пиразона; Г — стандартного раствора  $\gamma$ -изомера ГХЦГ; 1, 2 — части пластинки после ее разреза; 1а, 1б, 1с — фрагменты первой части пластинки после ее разреза; I — направление первого хроматографирования — в ПФ гексан — ацетон (4 : 1) или гексан — диэтиловый эфир (2 : 1); II — направление второго хроматографирования — в ПФ гексан — бензол (1 : 1) или гексан — толуол (1 : 1); III — направление второго хроматографирования — в ПФ бензол — метанол — ацетон (7 : 1 : 2) или бензол — метанол — диэтиловый эфир (7 : 1 : 2,5).

правление I). После поднятия фронта подвижной фазы на высоту 10 см пластинку вынимают и оставляют до полного испарения растворителей.

В точку В, находящуюся на расстоянии 1,5 см от нижнего и от левого края пластинки, наносят по 0,03 мл стандартных растворов фенмедифама, ленацила, фосфамида и пиразона, а в точку Г, находящуюся на расстоянии 1,5 см от верхнего края и левого края пластинки, наносят 0,03 мл стандартного раствора  $\gamma$ -изомера ГХЦГ, что соответствует 3 мкг вещества. Затем пластинку разрезают по горизонтали на уровне 2,5 см вверх от точки нанесения пробы А.

Часть 1 (верхнюю) пластинки поворачивают на 90°, помещают в хроматографическую камеру, в которую за 30 мин до хроматографирования была налита подвижная фаза гексан — бензол (1 : 1) или гексан — толуол (1 : 1), и подвергают второму хроматографированию в направлении II (см. рис. 20). После подъема фронта подвижной фазы на высоту 10 см пластинку вынимают из камеры и оставляют до полного испарения следов растворителей. Затем пластинку разрезают по линиям, как указано на рисунке. Части 1а и 1б пластинки обрабатывают проявляющим реагентом № 1, помещают на 20 мин в сушильный шкаф, нагретый до 80 °С, затем охлаждают ее и обесцвечивают фон раствором лимонной кислоты. Диазинон и эптам проявляются в виде быстро обесцвечивающихся (в течение 5 мин) лиловых пятен на желтом фоне. Части 1а и 1б пластинки можно обработать и проявляющим реагентом № 2 в качестве альтернативы, поместить на 10 мин в сушильный шкаф, нагретый до 115 °С. При этом диазинон проявляется в виде розового (нижний предел измерения 0,5 мкг), а эптам — в виде желтого пятна. Цвет пятен устойчив длительное время. Величина  $R_f$  диазинона и эптама приведены в таблице 181.

Часть 1б пластинки обрабатывают проявляющим реагентом № 3 или 4 и влажную помещают под УФ-свет на 15—20 мин. При обработке *o*-толидином  $\gamma$ -изомер ГХЦГ проявляется в виде сине-зеленого, а при обработке дифениламином — серого пятна. Окраска пятен устойчива несколько дней. Величины  $R_f$   $\gamma$ -изомера ГХЦГ приведены в таблице 181.

Часть 2 пластинки поворачивают на 90°, помещают под углом наклона 30—40° в хроматографическую камеру, в которую непосредственно перед хроматографированием была налита подвижная фаза бензол — метанол —

181. Величины  $R_f$  препаратов для различных подвижных фаз

Препарат	Гексан — ацетон (4 : 1)	Гексан — эфир (2 : 1)	Гексан — бензол (1 : 1)	Гексан — толуол (1 : 1)	Бензол — метанол — ацетон (7 : 1 : 2)	Бензол — мета- нол — эфир (7:1:2,5)
Диазинон	0,48	0,45	0,02	0,00	—	—
Эптам	0,79	0,82	0,07	0,03	—	—
$\gamma$ -изомер ГХЦГ	0,57	0,73	0,79	0,83	—	—
Фенмедифам	0,07	0,05	—	—	0,83	0,62
Ленацил	0,09	0,01	—	—	0,74	0,48
Фосфамид	0,03	0,00	—	—	0,55	0,40
Пиразон	0,02	0,00	—	—	0,45	0,35

ацетон (7:1:2) или бензол — метанол — эфир (7:1:2,5) в самом минимальном количестве (например, 12 мл в камеру диаметром 15 см), и подвергают второму хроматографированию (на рисунке 20 — направление III). После подъема фронта подвижной фазы на высоту 11 см пластинку вынимают из камеры и оставляют до полного испарения следов растворителей. Затем пластинку помещают на 5—10 мин в камеру для хлорирования, вынимают ее, оставляют на воздухе до улетучивания остатков хлора (15—20 мин) и после этого обрабатывают проявляющим реагентом № 1, 2 или 3. Окраска пятен ленацила, фосфамида и пиразона устойчива несколько дней, пятна фенмедифама — несколько часов. Величины  $R_f$  фенмедифама, ленацила, фосфамида и пиразона приведены в таблице 181.

Содержание препаратов в пробе определяют по предварительно построенным (во время проведения исследований) градуировочным графикам зависимости площади пятен препаратов ( $\text{мм}^2$ ), которая определяется путем использования миллиметровой бумаги, от количества препаратов ( $\text{мкг}$ ).

Обработка результатов анализа. Концентрацию каждого вещества в воздухе ( $X$ ,  $\text{мг}/\text{м}^3$ ) вычисляют по формуле

$$X = \frac{G}{V_{20}}$$

где  $G$  — количество препарата в пробе, найденное по калибровочному графику,  $\text{мкг}$ ;  $V_{20}$  — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

Методика определения диазинона, гамма-изомера ГХЦГ, фосфамида, пиразона и фенмедифама в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом. Принцип метода. Метод основан на газохроматографическом определении препаратов с использованием ДЭЗ. Отбор проб проводят с концентрированием

Метрологическая характеристика метода (см. табл. 180).

Избирательность метода. Определению не мешают близкие по срокам применения препараты эптам, тиллам и ленацил.

Реактивы, растворы, материалы. Диазинон х. ч. Гамма-изомер ГХЦГ х. ч. Фосфамид х. ч. Пиразон х. ч. Фенмедифам х. ч. Ацетон х. ч. Хлороформ ч. д. а. Безводный сульфат натрия ч. д. а. 5% SE-30 на хроматоне N-AW (0,250—0,315 мм); 5% XE-60 на хроматоне N-AW-DMCS (0,250—0,315 мм). Фильтры бумажные «синяя лента». Пенополиуретан эластичный, бесцветный, порезанный на куски размером 2—5 мм и очищенный ацетоном (12 ч) и хлороформом (12 ч) в аппарате Сокслета. Стандартные растворы препаратов в ацетоне с концентрацией 10  $\text{мкг}/\text{мл}$  готовят из химически чистых препаратов. Растворы хранятся в холодильнике 3 мес.



**Приборы, посуда.** Хроматограф с ДЭЗ. Аспирационное устройство. Микрошприц. Фильтродержатели. Стеклоянные гофрированные поглотительные трубки длиной 5 см, диаметром 1 см. Аппарат Сокслета. Ротационный вакуумный испаритель с набором колб. Водяная баня. Посуда лабораторная стеклянная. Колонки стеклянные длиной 1, 2 м, диаметром 3 мм.

**Условия отбора проб воздуха.** Воздух со скоростью 1,0 л/мин протягивают через фильтр, помещенный в фильтродержатель, и соединенную с ним первую поглотительную трубку с пенополиуретаном и вторую поглотительную трубку с пенополиуретаном, смоченным дистиллированной водой (для поглощения паров фосфамида). Для определения  $1/2$  ПДК препаратов следует отобрать не более 10 л воздуха. Пробы хранятся в холодильнике в закрытых склянках 12 дней.

**Ход анализа.** Подготовка проб к анализу. Фильтр в колбе заливают 10 мл ацетона, закрывают пробкой и оставляют на 1 ч. Пенополиуретан из первой и второй поглотительных трубок помещают в 2 разные колбы, в одну заливают 25 мл ацетона, в другую — 25 мл хлороформа, закрывают пробками и оставляют на 15 мин при периодическом перемешивании. Ацетоновые растворы от фильтра и пенополиуретана первой поглотительной трубки объединяют (фильтр при этом промывают дважды по 5 мл ацетона, а пенополиуретан тщательно отжимают) и упаривают в вакууме до объема около 0,5 мл. Раствор пробы от пенополиуретана второй поглотительной трубки пропускают через слой безводного сульфата натрия, тщательно отжимая сорбент, упаривают в вакууме досуха, сухой остаток растворяют в 0,2—0,3 мл ацетона и количественно переносят в смесь растворов пробы от фильтра и пенополиуретана первой поглотительной трубки. Общий объем раствора доводят ацетоном до 1 мл. Для анализа берут аликвотную часть (5 мкл) полученного раствора пробы.

**Условия газохроматографического анализа.** ДЭЗ. Колонка стеклянная (длина 2 м, внутренний диаметр 3 мм; длина 1 м, внутренний диаметр 3 мм). Набивка хроматон N-AW+5% XE-60 ( $l=1$  м,  $d=3$  мм); хроматон N-AW+5% SE-30 и хроматон N-AW-DMCS+5% XE-60 в соотношении 1:1 ( $l=2$  м). Температура, °C: испарителя — 230 или 200\*; колонки — 190—250 или 140\*; детектора — 250 или 200\*. Скорость газа-носителя на колонке 50 мл/мин, на детекторе — 6 л/ч. Шкала амперметра  $50 \times 10^{-12}$  А. Скорость диаграммной ленты 20 см/ч. Объем анализируемой пробы 5 мкл. Общий объем пробы 1 мл.

Анализ фенмедифама вследствие его более низкой термической устойчивости и особенности его структуры проводят отдельно. Присутствующие в смеси препараты диазинов,  $\gamma$ -изомер ГХЦГ, фосфамид и пиразон определению не мешают. Смесь препаратов диазинона,  $\gamma$ -изомера ГХЦГ, фосфамида и пиразона анализируют отдельно. Присутствующий в смеси фенмедифам определению не мешает.

В таблице 182 приведены значения времени удерживания препаратов на разных колонках.

Количество препаратов в анализируемом объеме пробы определяют по предварительно построенным градуировочным графикам зависимости площади пика на хроматограмме ( $\text{мм}^2$ ) от количества препарата ( $\text{нг}$ ).

**Обработка результатов анализа.** Концентрацию каждого вещества в воздухе ( $X$ ,  $\text{мг}/\text{м}^3$ ) рассчитывают по формуле

$$X = \frac{GV_2}{V_1V_{20}},$$

где  $G$  — количество препаратов в хроматографируемом объеме пробы,  $\text{нг}$ ;  $V_1$  — объем раствора пробы, взятый для хроматографирования,  $\text{мкл}$ ;  $V_2$  —

\* Температурные условия анализа фенмедифама.

## 182. Время удерживания препаратов на разных колонках

Препарат	5 % SE-30+5 % XE-60	5 % XE-60
Диазинон	1 мин 07 с	1 мин 11 с
γ-ГХЦГ	2 мин 04 с	2 мин 10 с
Фосфамид	5 мин 35 с	6 мин 12 с
Пиразон	11 мин 08 с	11 мин 00 с
Фенмедифам	1 мин 07 с	2 мин 08 с

общий объем анализируемого раствора, мл;  $V_{20}$  — объем воздуха, отобран-  
ный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

**Требования безопасности.** Соблюдать все необходимые требования без-  
опасности при работе в химических лабораториях.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Азот особой чистоты, ГОСТ 9293—74.  
Амиловый эфир уксусной кислоты, ТУ 6-09-1239—76.  
4-Аминоантипирин, ТУ 6-09-3948—75.  
Аммиак особой чистоты, ГОСТ 24147—82; водный, ГОСТ 3760—79.  
Аммония молибдат, ГОСТ 3765—78.  
Аммония персульфат, ГОСТ 20478—75.  
Аммоний роданистый, ГОСТ 27067—86.  
Аммоний сульфаминовой кислоты, ТУ 6-09-15-364—78.  
Аммоний углекислый кислый, ГОСТ 3762—78.  
Аммония хлорид, ГОСТ 3773—72.  
Ангидрид уксусный, ГОСТ 5815—77.  
Анилини солянокислый, ГОСТ 5822—78.  
Анионообменная смола АВ-17-8, ГОСТ 20301—74.  
Ацетон, ГОСТ 2603—79.  
Ацетонитрил, ТУ 6-09-3534—74.  
Бария хлорид, ГОСТ 4108—72.  
Бензидин, ТУ 6-09-10-1310—78.  
Бензол, ГОСТ 5955—75.  
Бор трехфтористый, эфират, ТУ 6-09-804—77.  
Бром, ГОСТ 4109—79.  
Бромкрезоловый зеленый, ТУ 6-09-450-77.  
Бромтимоловый синий, ТУ 6-09-2045—77.  
Бромфеноловый синий, ТУ 6-09-4530—77.  
Бумага индикаторная универсальная, ТУ 6-09-1181—76.  
Вазелиновое масло, ГОСТ 3164—78.  
Висмута нитрат основной, ГОСТ 4110—75.  
Водород газообразный, из баллона, ГОСТ 3022—80.  
Воздух газообразный, из баллона, ГОСТ 9-010—80.  
n-Гексан, ТУ 6-09-3375—78.  
n-Гептан, ГОСТ 25828—83.  
Гибберелин кристаллический, ТУ 64-3-103—75.  
Гидразин сульфат, ГОСТ 5841—74.  
Гидроксиламин солянокислый, ГОСТ 5456—79.  
Гипс медицинский, ГОСТ 3210—77.  
Глицерин, ГОСТ 6824—76.  
2,6-Дибром-N-хлорхинонимин, ТУ 6-09-05-63—73.  
n-Диметиламинобензальдегид, ТУ 6-09-3272—77.  
Диметилсульфоксид, ТУ 6-09-3818—74.  
Диметилформамид, ГОСТ 20258—74 Е.  
Дитизон, ГОСТ 10165—79.  
Дифениламин, ГОСТ 5825—70.  
Диэтиламин, ГОСТ 13279—67.  
Диэтиленгликоль, ГОСТ 10136—77.  
Диэтиловый эфир фталевой кислоты, ТУ 6-09-3663—74.  
Железо (III) хлорное, ГОСТ 4147—74.

Изооктан, ГОСТ 12433—83.  
Индиго (динатриевая соль дисульфокислоты), ТУ 6-09-07-44—73.  
Индоксилацетат, ТУ 6-09-07-1156—78.  
Индофенилацетат, ТУ 6-09-469—77.  
Иод, ГОСТ 4159—79.  
Иодистый метил, ГОСТ 6518—69.  
Кадмия нодид, ГОСТ 8421—79.  
Кадмий уксуснокислый, ГОСТ 5824—79.  
Калия бромат, ГОСТ 4457—74.  
Калия бромид, ГОСТ 4160—74.  
Калия гидроксид, ГОСТ 24363—80.  
Калий железистосинеродистый, ГОСТ 4207—75.  
Калий железосинеродистый, ГОСТ 4206—75.  
Калия нодид, ГОСТ 4232—74.  
Калия перманганат, ГОСТ 20490—75.  
Калия роданид, ГОСТ 4139—75.  
Калий фосфорноокислый, двузамещенный, трехводный, ГОСТ 2493—75.  
Калия фосфат однозамещенный, ГОСТ 4198—75.  
Калий хлорноватокислый, ГОСТ 2713—74.  
Калий щавелевокислый, ГОСТ 5868—78.  
Кальция сульфат, ГОСТ 3210—77.  
Кальция хлорид, ГОСТ 4161—77.  
Катиониты, ГОСТ 20298—74.  
Кислота азотная особой чистоты, ГОСТ 11125—84.  
Кислота аскорбиновая, ГОСТ 4815—76.  
Кислота борная, ГОСТ 9656—75.  
Кислота винная, ГОСТ 5817—77.  
Кислота кремниевая, ГОСТ 4214—78.  
Кислота лимонная, ГОСТ 908—79 Е.  
Кислота муравьиная, ГОСТ 5848—73.  
Кислота серная особой чистоты, ГОСТ 14262—78; х. ч., ГОСТ 4204—77.  
Кислота сульфаниловая, ГОСТ 5821—78.  
Кислота тиогликолевая, ТУ 6-09-3115—73.  
Кислота трихлоруксусная, ТУ 6-09-1926—77.  
Кислота уксусная особой чистоты, ГОСТ 18270—72; ледяная ч. д. а., ГОСТ 61—75.  
Кислота о-фосфорная, ГОСТ 6552—80.  
Кислота фосфорно-вольфрамовая, ГОСТ 18290—72.  
Кислота фосфорно-молибденовая, ТУ 6-09-3540—78.  
Кислота хлороводородная х. ч., ГОСТ 3118—77; особой чистоты, ГОСТ 14261—77.  
Кислота щавелевая, ГОСТ 22180—76.  
Крахмал водорастворимый, ГОСТ 10163—76.  
Кремния диоксид для люминофоров, ТУ 6-09-3644—74.  
Ксилол, ТУ 6-09-3825—78.  
Лантана нитрат, ТУ 6-09-4676—78.  
Магния сульфат, ГОСТ 4523—77.  
Магния хлорат, ГОСТ 10483—83 Е.  
Меди нитрат, ТУ 6-09-3757—74.  
Меди сульфат, ГОСТ 19347—84 Е.  
Медь уксуснокислая, ГОСТ 5852—79.  
Метиламин солянокислый, ТУ 6-09-2088—77.  
Метиловый красный, ТУ 6-09-5169—84.  
Метиловый оранжевый, ТУ 6-09-4530—77.  
Мочевина, ГОСТ 6691—77.  
Натрия нитрит, ГОСТ 4197—74.  
Натрия нитрат, ГОСТ 4168—79.

Натрий вольфрамвокислый, ГОСТ 18289—78.  
Натрия гидроксид х. ч., ГОСТ 4328—77; очищенный, ГОСТ 11078—78.  
Натрия гидросульфат, ГОСТ 246—76.  
Натрий двууглекислый, ГОСТ 83—79.  
Натрия дитионат, ТУ 6-09-01-283—75.  
Натриевая соль додецилсульфокислоты, ТУ 6-09-64—75.  
Натрий лимоннокислый, ГОСТ 22280—76.  
Натрия мета-бисульфит, ГОСТ 10575—76.  
Натрия нитропруссид, ГОСТ 4218—78.  
Натрия сульфат безводный, ГОСТ 4166—76.  
Натрий серноватистоокислый, ГОСТ 27068—86.  
Натрий тетраборокислый, ГОСТ 4199—76.  
Натрий углекислый кислый, ГОСТ 4201—79.  
Натрий уксуснокислый, ГОСТ 18290—72.  
Натрия хлорид, ГОСТ 4233—77.  
*α*-Нафтиламин, ГОСТ 8827—74.  
N-(1-Нафтил)этилендиамин дигидрохлорид, ТУ 6-09-15-420—80.  
*α*-Нафтол, ГОСТ 5838—79.  
*n*-Нитроанилин, ТУ 6-09-258—77.  
4-(*n*-Нитробензил)пиридин, ТУ 6-09-15-93—74.  
Нитрометан, ТУ 6-09-11-876—77.  
Нингидрин, ТУ 6-09-10-1384—79.  
*n*-Нитрофенол, МРТУ 6-09-3973—75.  
Оксид алюминия для хроматографии, ГОСТ 8136—85.  
Олово гранулированное, ТУ 6-09-2704—78.  
Олово двуххлористое, ГОСТ 36—78.  
Палладий двуххлористый, ТУ 6-09-2025—72.  
Парафин, ТУ 6-09-3637—74.  
Пенополиуретан эластичный, ТУ 6-05-1688—79.  
Перекись водорода, ГОСТ 10929—76.  
Пирокатехин фиолетовый, ТУ 6-09-07-1087—78.  
Полидиэтиленгликоль сукцинат (ПДЭГС), ТУ 6-09-2827—77.  
Прочный голубой Б, ГОСТ 11263—80.  
Прочный красный Б, ГОСТ 11827—77.  
Резорцин, ГОСТ 9970—74.  
Ртуть металлическая, ГОСТ 4658—73 Е.  
Сахароза, ГОСТ 5833—75.  
Свинец уксуснокислый, ГОСТ 1027—67.  
Серебра нитрат, ГОСТ 1277—75.  
Силикагель КСК для хроматографии, ГОСТ 3956—76 Е.  
Спирт амиловый, ТУ 6-09-3467—79.  
Спирт *n*-бутиловый, ГОСТ 6006—78.  
Спирт *изо*-пропиловый, ГОСТ 9805—84.  
Спирт метиловый, ГОСТ 6995—77.  
Спирт октиловый, ТУ 6-09-11-1055—78.  
Спирт этиловый ректификат, ГОСТ 5962—67.  
Судан, ТУ 6-09-4124—75.  
Тальк очищенный, ГОСТ 19729—74.  
Тетраэтиленпентамин, ТУ 6-09-05-804—78.  
Титана сульфат, ТУ 6-09-01-477—77.  
Титан треххлористый, ГОСТ 311—78.  
*о*-Толлидин, ТУ 6-09-2232—75.  
*о*-Толуидия, ТУ 6-09-2992—73.  
Толуол, ГОСТ 5789—78.  
Трилон-Б, ГОСТ 10652—73.  
Трифторуксусный ангидрид, ТУ 6-09-4135—75.  
2,2,2-Трихлорэтанол, ТУ 6-09-11-719—76.

Углерод четыреххлористый, ГОСТ 20288—74.  
Уголь активированный АГ-3, АГ-5, ГОСТ 20464—75.  
Уголь активированный БАУ, ТУ 6-09-3247—73.  
Уголь активированный КАД, МРТУ 6-09-1049—64.  
Уголь активированный ОУ-А, МРТУ 6-09-1049—64.  
2-Феноксизтанол, ТУ 6-09-13-493—76.  
Фенолфталеин, ГОСТ 5850—72.  
Фильтры бумажные, ТУ 6-09-1678—77.  
Хлористый метилен, ГОСТ 12794—80.  
Хлороформ, ГОСТ 20015—74.  
Циклогексан, ТУ 6-09-06-452—76.  
Цинк гранулированный, ГОСТ 989—75.  
Цинк-дитиол, ТУ 6-09-05-142—79.  
Цинковая пыль, ГОСТ 12601—76.  
Цинка сульфат, ГОСТ 4529—78.  
Цинка хлорид, ГОСТ 4529—78.  
Этилацетат, ГОСТ 22300—76.  
Этиленгликоль, ГОСТ 10164—75.  
Этилендиамин дигидрохлорид, ТУ 6-09-10-645—77.  
Эфир диэтиловый, ГОСТ 6265—74.  
Эфир петролейный, ТУ МХП-1867—48.

## Приложение 2

### НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОСУДУ ЛАБОРАТОРНУЮ

Посуда мерная лабораторная стеклянная (цилиндры, мензурки, мерные колбы, градуированные пробирки), ГОСТ 1770—74 Е.

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые, ГОСТ 9147—80 Е.

Посуда и аппаратура лабораторная стеклянная. Шлифы сферические и взаимозаменяемые (вся химическая посуда на нормальных шлифах: круглодонные, плоскодонные, грушевидные колбы, колбы Эрленмейера, холодильники, двугорлые колбы, аллонжи, дефлегматоры и т. д.), ГОСТ 9737—70.

Приборы мерные лабораторные стеклянные (бюретки, пипетки), ГОСТ 20292—74 Е.

Пикнометры стеклянные, ГОСТ 22524—74 Е.

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (воронки делительные, эксикаторы, камеры хроматографические, водоструйные насосы, стаканы стеклянные, пульверизаторы, бюксы, колбы, воронки Шотта и т. д.), ГОСТ 25336—82 Е.

## Приложение 3

### НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРИБОРЫ И АППАРАТУРУ

Аппарат для встряхивания, ТУ 64-1-1081—73 или аналогичный.

Аспирационное устройство, ТУ 64-1862—77.

Баня водяная, ТУ 64-1-2850—76.

Весы аналитические типа ВЛР-200, ГОСТ 19491—74.

Весы аналитические лабораторные, ТУ 64-1-1065—73.

Генератор водорода.

Гомогенизатор, МРТУ 42-1505—63.  
Денситометр БИАИ-170, ТУ 64-1-56—73.  
Ротационный вакуумный испаритель ИР-1М, ТУ 25-11-917—76 или аналогичный.  
Лампа ртутно-кварцевая, ТУ 16-535-280—74 или аналогичная.  
Мельница электрическая лабораторная, ТУ 46-22-236—79 или аналогичная.  
Микрошприц МШ-10, МШ-1, ГОСТ 20292—74 Е.  
Центрифуга, МРТУ 42-219—69.  
Шкаф сушильный, ТУ 64-1-1411—76 Е.  
Шприц медицинский, ГОСТ 22090—83 Е.  
Электрокофемолка, ГОСТ 19423—81 Е.  
Электроплитка, ГОСТ 14919—83 Е.  
Колбонагреватель электрический, ТУ 92-275—76.

## Приложение 4

### **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, ВОЗДУХЕ, ВОДЕ И ПОЧВЕ**

Приведенные в данном сборнике методики определения остаточных количеств пестицидов предназначены для контроля за содержанием пестицидов в различных средах с целью выявления нарушений санитарно-гигиенических норм (МДУ, ПДК), их устранения и разработки мер профилактики.

Определения терминов заимствованы из «Словаря терминов и их определения в области гигиенического нормирования факторов окружающей среды» под ред. академика Г. И. Сидоренко (М., 1988) и «Методических указаний по гигиенической оценке новых пестицидов» (Киев: ВНИИГИНТОКС, 1988).

Предельно допустимая концентрация (ПДК)—наибольшая концентрация вредного вещества в объектах окружающей среды, которая в условиях постоянного воздействия на организм или в отдаленные сроки после него не вызывает у человека каких-либо заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, а также не влияет на условия его жизни.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ)—устанавливаемый расчетным методом временный ориентировочный гигиенический норматив содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водоемов, продуктах питания, используемый в основном для целей предупредительного санитарного надзора. Утверждается Министерством здравоохранения СССР на ограниченный срок (2—3 года), после чего может быть заменен ПДК, переутвержден на новый срок или отменен в зависимости от перспективы применения вещества и имеющейся информации о его токсических свойствах.

ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны — концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, воздействие которой независимо от наличия других вредных факторов в пределах нормативов при ежедневной работе в течение 8 ч (при другой продолжительности в пределах 41 ч в неделю) за весь рабочий стаж и в отдаленный после него период не вызовет у работающего и его потомства каких-либо заболеваний или других отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами.

ПДК пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве — это предельно допустимые концентрации, установленные с учетом особенностей сельскохозяйственного производства (кратковременность и периодичность работы с пестицидами, влияние метеорологических факторов, непостоянство концентраций и т. п.) (табл. 196, 197, 198).

ПДК химических веществ в атмосфере населенных мест — максимальная концентрация вещества, отнесенная к определенному времени осреднения (20—30 мин, 24 ч, месяц, год), которая при регламентированной вероятности ее появления не оказывает ни прямого, ни косвенного вредного действия на организм человека, его потомство и санитарные условия жизни (табл. 199).

ПДК химических веществ в воде природных водоемов — максимальная концентрация вещества, которая не оказывает прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья настоящего и последующих поколений (выявляемого современными методами исследований) при его воздействии на организм человека в течение всей жизни и не ухудшает гигиенические условия водопользования населения (табл. 200).

ПДК химических веществ в почве — максимальное количество вещества (в мг на 1 кг пахотного слоя почвы), не вызывающее прямого или опосредованного влияния на самоочищающую способность почвы, соприкасающейся с почвой среды и на здоровье человека.

ПДК пестицида в почве — максимальное содержание остатков, при котором происходит миграция препарата в сопредельные с почвой среды (растения, вода, почва) в количествах, не превышающих гигиенические нормы содержания этого вещества в указанных объектах и не оказывающих отрицательного влияния на биологическую активность почвы. ОДК — ориентировочная допустимая концентрация пестицида в почве — может быть рассчитана по формуле

$$\text{ОДК} = 1,15 + 0,76 \lg \text{МДУ}.$$

При необходимости вводят коэффициент запаса  $q$ , учитывающий стойкость и метаболизм препарата

$$q = (n + 1) m.$$

где  $n$  — поправка на стойкость препаратов, равная 1 для препаратов с временем распада  $T_{95}$  в почве в природных условиях до 2 лет, в эксперименте до 7 мес. Для более стойких препаратов  $n=2$ ;  $m$  — поправка на метаболизм, равная в случае образования высокотоксичных продуктов метаболизма 2, в других случаях  $m=1$  (см. табл. 200).

МДУ остаточных количеств загрязнителей (в пищевых продуктах) — максимальные концентрации вредных веществ в пищевых продуктах, которые не вызывают заболевания или отклонения в состоянии здоровья населения, потребляющего эти продукты, или не могут отрицательно повлиять на последующие поколения (табл. 201).

МДУ устанавливают на уровне фактического содержания пестицидов при условии соблюдения гигиенически обоснованных регламентов применения и контролируют путем сопоставления с допустимой суточной дозой пестицида для человека (ДСД). МДУ выражают в мг на 1 кг пищевого продукта.

ДСД — суточная доза, ежедневное поступление которой на протяжении всей жизни человека не должно оказывать вредного воздействия на организм. ДСД выражают в мг на 1 кг массы человека в сутки (см. табл. 201).

При отсутствии нормативов для отдельных культур следует ориентироваться на нормативы, установленные для соответствующих групп пищевых продуктов (овощи, фрукты, зерновые и т. д.) или отдельных культур из этих групп, учитывая возможную суточную норму потребления продукта и величину ДСД.

МДУ может быть рассчитан по формуле

$$\text{МДУ} = \frac{\text{ДСД} \cdot M \cdot 0,7}{C_n} = \frac{49 \text{ ДСД}}{C_n},$$

где  $M$  — средняя масса взрослого человека (70 кг);  $C_n$  — суточная норма потребления (табл. 202); 0,7 — доля от суммарного содержания пестицидов во всех средах, приходящаяся на продукты питания.



196. Предельно допустимые концентрации пестицидов в воздухе рабочей зоны

Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе *	Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе *
Абат	0,5	п + а	Д.ПТ	0,1	п + а
Алипур	1,0	а	2,4-Д кислота	1,0	а
Альдрин	0,01	п + а	(2,4-Д)		
Амидофос	0,5	п	2,4-ДА аминная	1,0	а
Алифос	0,5	п + а	соль		
Анабазин сульфат	0,1	п + а	2,4-Д бутиловый	0,5	п + а
Антро (формотнион)	0,5	п + а	эфир		
Атразин	2,0	а	Дианат	1,0	а
Афуган (пирозофос)	0,05	п + а	Дибром	0,5	п
Ацилат-1	2,0	п + а	Дилор (дигидрогептахлор)	0,2	п + а
Банвел Д (дикамба)	1,0	а	Дильдрин	0,01	п + а
Базагран (бентазон)	5,0	п + а	Дикрезил	0,5	п + а
Базудин (диазинон)	0,2	п + а	Диметилхлортиофосфат	0,5	а
Байлетон (триадимефон)	0,5	п + а	Динитро-изопропилфенол	0,05	п + а
Бетанал (фенмедифам)	0,5	а	Динитро-о-крезол	0,05	п + а
БМК (карбендазим)	0,1	а	Диносеб	0,05	п + а
Боверин	0,3	а	Дифенамид (ридерон)	5,0	п + а
Бромофос	0,5	п + а	Дихлоральмочевина	5,0	а
Бронкот (броипрол)	1,0	п + а	Дозанекс (метоксурон)	0,5	а
Бутифос	0,2	п + а	Дропп (тидназурон)	1,0	а
Валексон	0,1	п + а	Зоокумарин (варфарин)	0,001	а
Вернам (вернолат)	5,0	п + а	Иодофенфос (С-9491)	0,5	п + а
Витавакс (карбоксия)	1,0	а	Иразин	2,0	а
Волатон (фоксим)	0,1	а	Карбин	0,5	а
Гардона (тетра-хлорвинифос)	1,0	а	Карбофос (малатион)	0,5	п + а
ГХБД (гексахлорбутадиев)	0,005	п	Кетозфир	2,0	п + а
ГХЦГ (гексахлорциклогексан)	0,1	п + а	Кронетон (тиофенкарб)	0,05	п + а
γ-Изомер ГХЦГ	0,05	п + а	Купроцин	0,5	а
Гексилур	0,5	п + а	Ленацил (вензар)	0,5	п + а
Гептахлор	0,01	п	Линурон	1,0	а
Гетерофос	0,02	п + а	Малоран (хлорбромурон)	0,5	а
Глифтор	0,05	п	Манеб	0,5	п
ДДВД (дихлофос)	0,2	п + а	Меди трихлорфенолят	0,1	а
			Мельпрекс (карпен)	0,1	а

Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущест- венное агре- гатное состоя- ние в воздухе *	Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущест- венное агре- гатное состоя- ние в воздухе *
Меркаптофос	0,02	п + а	Ронит (циклоат)	1,0	п + а
Меркуран (по ртути)	0,005	п + а	Сапроль (трифо- рин)	1,0	а
Метальдегид	0,2	а	Севин (карба- рил)	1,0	а
Металлилхлорид	0,3	п	Семерон (десмет- рин)	2,0	а
Метатион (фени- тротион)	0,1	п + а	Сероуглерод	1,0	п
Метафос (пара- тион метил)	0,1	п + а	Симазин	2,0	а
Метила бромид	1,0	п	Солан (лентано- хлор)	1,0	п + а
Метилацетофос	1,0	п + а	Сульфазин	1,0	а
Метилизоцианат (карбатион)	0,1	п	Сумилекс (про- цимидон)	1,0	а
Метилмеркапто- фос	0,1	п + а	Тиазон (дазомет)	2,0	а
Метилнитрофос	0,1	п + а	Тиллам (небулат)	1,0	п + а
Метилэтилтиофос	0,03	п + а	Тиодан (эндо- сульфан)	0,1	п + а
Метурин	3,0	а	Тиофос	0,05	а
Митак (амитрац)	0,5	п + а	Тиурам Д, ТМТД	0,5	а
2М-4Х (МСРА)	1,0	а	Тордон 22 К (хло- рамп)	2,0	а
Нитрафен	1,0	а	Трефлан (три- флураллин)	3,0	п + а
Никотин-суль- фат	0,1	п + а	Триаллат	1,0	п + а
Оксамат	5,0	п + а	(авадекс, диптал)		
Октаметил	0,02	п + а	Трихлормета- фос-3	0,03	п + а
Ордрам (молинат, ялан)	0,5	п + а	Тролен	0,3	п + а
Пентахлорфе- нолят натрия	0,1	п + а	Фенагон (2,4-Д)	0,5	а
Пирамин (хлор- дазон, феназон)	0,5	п + а	Фенмедифам	2,0	а
Пликтран (ци- гексатин)	0,02	а	Фенурон	3,0	а
Полимарцин	5,0	а	Фитон (картоцид)	2,0	а
Полихлорпинен	0,2	п + а	Фозалон	0,5	п
Пропазин	5,0	а	Фосфамид (дн- местоат, рогор)	0,5	п + а
Пропанид (про- панил)	0,1	а	Фосфид цинка	0,1	а
Прометрин	5,0	а	Фталан (фолнет)	0,5	а
Рамрод (пропа- лор)	0,5	а	Фталофос (фос- мет)	0,3	п + а
Ратиндан (дифе- нацил)	0,01	а	Фурадан (карбо- фуран)	0,05	п + а
Раундап (гли- фосат)	3,0	а	Хлоразин	2,0	а
Реглон (дикват)	0,05	а	Хлорхолинхлорид	0,3	а
Рицид-П (кита- цин)	0,3	а	Холнхлорид	10	а
			Хостаквик (геп- тенофос)	0,5	п + а
			Хлорат магния	5,0	а

Продолжение

Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущест- венное агре- гатное состоя- ние в воздухе *	Пестицид	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущест- венное агре- гатное состоя- ние в воздухе *
Хлорофос (три- хлорфон)	0,5	п + а	Цинеб (купрозан)	0,5	а
Церкошид	2,0	а	Циодрин	0,2	п + а
Цианамид (сво- бодный)	0,5	п + а	Энтобактерин	1,0	а
Цианокс (циано- фос)	0,3	п + а	Эптам (ЕРТС)	2,0	п + а
Цидиал (фентоат)	0,15	п + а	Этафос	0,1	а
Циклофос	0,3	п + а	Этилмеркурфос- фат	0,005	п + а
Амибен	5,0	—	Этилмеркурхло- рид (гранозан)	0,005	п + а
Бромистый метил	1,0	—	Карбатион	0,1	—
Бутилкаптакс	2,0	—	Которан	5,0	—
Гидрел	3,5	—	Котофор	3,0	—
Далапон	3,0	—	Лонтрел	2,0	—
ДД	5,0	—	Мильтокс-специаль	0,1	—
2,4-Д октиловый	1,0	—	2М—4ХМ	0,5	—
эфир			2М—4ХМ	1,0	—
2,4-ДП натриевая соль	1,0	—	Полихлоркамфен	0,5	—
Дикват	0,05	—	Томилон	1,0	—
Изатрин	1,0	—	Трихлорацетат натрия	2,5	—
Каратан	0,2	—	Фостоксин	0,1	—
			Хлор ИФК	2,0	—

\* а — аэрозоль, п — пары.

### 197. Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны (мг/м<sup>3</sup>) и классы опасности пестицидов и регуляторов роста растений

Препарат	ПДК пестицида в воздухе рабочей зоны	
	для условий сельского хозяйства	для животноводческих помещений
Амбуш	0,5 а+п (II)	—
Актеллик	0,2 п+а (III)	—
Ализор	—	2,0 п+а (III)
Базудия	—	0,2 п+а (II)
Бициклат	0,65 п+а (II)	—
Бетанал компакт	—	2,0 а (III)
Буферен ФД	—	1,0 а (II)
Волатон	—	0,1 п+а (II)
Витавурам (смесевой препарат)	—	1,0 а (II) (карбоксин) 0,5 а (II) (тирам)
Витавакс	—	—
Гардона	0,1	—
Гамма-изомер ГХЦГ	0,1	—

Препарат	ПДК пестицида в воздухе рабочей зоны	
	для условий сельского хозяйства	для животноводческих помещений
Гетерофос	0,05 п+а (I)	0,02 п+а (I)
Гексилур	—	0,05 а (II)
Глифопин	3,0 а (III)	—
Дайфуран	0,05 п (I)	—
Децис-квик	0,5 п+а (II)	—
Дилор	0,5 п+а (II)	0,2 п+а (II)
Золон	—	0,5 п (II)
Кисваке	—	1,0 а (II)
Малоран	—	0,5 а (II)
Метафос	—	0,1 п+а (I)
Метатион	—	0,1 п+а (I)
Пирамин ФЛ	—	0,5 п+а (II)
Прадо	—	2,0 а (III)
Поликарбацин 0,1 п (II)	—	—
Прометрин	—	5,0 а (III)
Тиолент	—	0,5 п+а (II)
Трефлан	—	3,0 п+а (III)
Тубарид	—	0,5 а (II)
Фамидофос на аммофосе	—	0,65 п+а (II)
Фастак	—	0,1 п (I)
Хлорокись меди	—	0,5 а (II)
Чистарт	3,0 а (III)	—
Элсан	—	0,15 п+а (II)
Циднал	—	—
Эрадикан	—	По элгаму
Этафос	—	0,1 а (II)
2М-4ХМ октиловый эфир	0,5 а (II)	—
Аклинол	(IV)	—
Квартазин	(III)	—
Краснодар-1	(III)	—
ФАМ	(III)	—

Примечание. Гигиенические нормативы (ПДК) и классы опасности в воздухе рабочей зоны производственных помещений приведены согласно ГОСТ 12.1.005—88, для условий сельского хозяйства — в соответствии со списком, утвержденным Главным санитарным врачом СССР или его заместителем. Указано преимущественное агрегатное состояние пестицидов, в котором они могут находиться в воздухе рабочей зоны: а — аэрозоль, п — пары. Классы опасности указаны в скобках.

198. ОБУВ пестицидов в воздухе рабочей зоны

Пестицид	ОБУВ, мг/м <sup>3</sup> *	Преимущественное агрегатное состоя- ние в воздухе *
А-1	2,0	а
Акрекс (динобутон)	0,2	а
Анометрин Н (перметрин)	1,0	п + а
Баверсан	0,3	а
Бенлат (беномил)	0,01	а
Болстар (сульпрофос)	0,25	п + а
Видат (оксамил)	0,01	п
Гибберсиб	0,2	а
Гидрел	1,0	п + а
Децис (дельтаметрин)	0,1	а
Дравин 755 (бутокарбоксим)	1,0	п + а
Дурсбан (хлорпирифос)	0,3	п + а
Изатрин (бворесметрин)	2,0	а
Иллоксан (дихлофоп-метил)	0,5	а
Лейбацит (фентвон)	0,3	п + а
Лассо (алахлор)	0,5	а
Митран (хлорфензон + хлорфенетон)	2,0	а
Офунак (пиридафентион)	0,5	п + а
Пиримор (пиримикарб)	0,05	п + а
Пиримицид (пиримифосэтил)	0,2	п + а
Рипкорд	0,2	а
Ровраль (ипродион)	1,0	а
Саегор (пиклорам + 2,4-Д)	0,5	а
Сумицидин (фенвалерат)	0,3	а
Суффикс (бензонлпропэтил)	0,5	а
Тачигарен (гимексазол)	1,0	а
Томнлон (тетрафлуорон)	2,0	а
Топсин М (тиофанатметил)	1,5	а
Трихоцетин	0,2	а
Фадеморф (триморфамид)	0,3	а
Фенвал	0,5	п + а
Хлорокись меди	0,5	а
Цимбуш (циперметрин)	0,2	а
Экамет (этримфос)	0,5	а
Эупарен (дихлорфлуанид)	1,0	а
Альетт, эфаль	1,0	—
Банкол	0,5	—
Даконил	1,0	—
Карагард 3587	1,0	—
Метазин	0,5	—
Омайт	0,3	—
Раундап (глифосат)	1,5	—
Ромуцид	0,3	—
Селекрон	0,3	—
Стомп	0,5	—
Тилт	1,0	—
Торк	1,5	—
Эдил	0,2	—

\* а — аэрозоль, п — пары.

Примечание. ОБУВ приведены согласно спискам, утвержденным Минздравом СССР.

199. ПДК и ОБУВ пестицидов (мг/м<sup>3</sup>) в атмосферном воздухе

Пестицид	ПДК	ОБУВ	Пестицид	ПДК	ОБУВ
Арриво (ципер- метрин)	—	0,01	ДНОК	—	0,0008
Амбуш	—	0,01	Дозанекс	—	0,02
Актеллик	—	0,025	Дроп	0,2	—
Баверсан	—	0,005	Зеллек	0,006	—
Базудин	0,01	—	Иодофенфос	0,5	—
Волатон	—	0,002	Каратан	0,2	—
Гетерофос	—	0,0002	Карбин	—	0,006
Деис	—	0,003	Карбофос	0,015	—
Золон	0,008	—	Малоран	1,0	—
Метафос	0,1	—	Металлихлор- рид	0,01	—
Митак	0,001	—	Метоксихлор	—	0,01
Сумицидин	—	0,005	Морестан	0,5	—
Цидиал	0,15	0,005	Нитрафен	0,5	0,01
Этафос	0,1	0,006	Паторан	0,05	—
Витавакс	—	0,015	Пиримор	0,2	—
Гербитреф (трефлан)	—	0,03	Полнкарбацин	—	0,0005
Пирамин	—	0,001	Прометрин	5,0	—
Прометрин	—	0,04	Пропазин	—	0,04
Эрадиқан	—	0,02	Пропанид	—	0,002
Хлорокись меди	—	0,0008	Рамрод	0,5	—
Актеллик	—	0,025	Рицид-П	—	0,01
Акрекс	0,02	—	Ронит	1,0	—
Альфа	3,0	—	Семерон	2,0	—
Амибен	—	0,006	Симазин	—	0,02
Антио	0,01	—	Солян	0,01	—
Атразин	0,02	—	Сумицидин	—	0,005
Банвел-Д	1,0	—	Сульфазин	—	0,01
Беномил	0,01	—	ТМТД	—	0,06
Болстар	0,01	—	Тилт	—	0,005
Бромофос	0,5	—	Тиллам	—	0,01
Бромистый метил	—	0,1	Тиодан	0,017	—
Брококот	0,03	—	Томилон	0,6	—
Бутилкаптакс	0,015	—	Тордон 22К	—	0,02
Витавакс	1,0	—	Триаллат	—	0,01
Гардона	0,007	—	Трисбен-200	—	0,006
Гидрел	—	0,033	Трихлормета- фос	0,03	0,004
Гранозап	0,005	—	Трихлорфено- лят меди	—	0,001
ГХЦГ	0,1	—	Фосфамид	0,003	—
ГХБД	—	0,0002	Фталофос	0,004	—
γ-ГХЦГ	0,03	—	Хлорофос	0,04	—
2,4-Д аминная соль	—	0,01	Хлор ИФК	—	0,02
Далалон	—	0,05	Цианокс	0,3	—
ДДВФ	—	0,002	Цидиал	0,15	—
Дибром	0,5	—	Эптам	—	0,02
Диурон	—	0,05	Этафос	0,1	—
			Эупарен	1,0	—

200. Санитарно-гигиенические нормативы ПДК и ориентировочных допустимых количеств (ОДК) пестицидов в почве, ПДК пестицидов в воде водоемов санитарно-бытового водопользования

Пестицид	Концентрация в почве, мг/кг		ПДК в воде водоемов, мг/л
	ПДК	ОДК	
Абат		0,6	
Агелон	0,15; 0,01 <sup>1</sup>	—	—
Акрекс	0,1	—	0,2
Актеллик	0,50; 0,10 <sup>2</sup>	—	0,010
Амбуш	—	0,05	0,070
Амибен	0,1	0,50	—
Антио	—	0,20	0,004
Арезин	—	0,70	0,05
Атразин	0,50; 0,01 <sup>1</sup>	—	0,5
Базудин	0,10	—	0,004
Байлетон	—	0,40	0,020
Байтекс	—	0,40	—
Банвел-Д	0,25	—	0,15
Бенлат	—	0,10	0,5
Бетанал	0,25	—	0,500
БМК	—	0,10	0,10
Болстар	—	—	0,003
Бромофос	—	0,20	—
Бронокот	—	0,50	0,03
Валексон	1,00	—	0,200
Витавакс	—	—	1,000
Гардона	1,40	—	0,300
Гексахлорбензол	—	0,03	—
Гербан	—	0,70	—
γ-ГХЦГ (линдан)	0,10	—	0,02
ГХЦГ (гексахлоран)	0,10	—	0,02
ГХБД (гексахлорбутадиен)	0,50	—	0,01
Гептахлор	0,05	—	—
Гетерофос <sup>3</sup>	0,05	—	Не доп.
Гидрел	—	—	Не доп.
Глифосат	0,50	—	0,100
Глифтор	—	—	0,006
Дактал	—	0,10	Не доп.
Далапон	0,50	—	0,04
2,4-Д дихлорфеноксиуксусная кислота	0,10	—	0,100
2,4-Д аминная соль <sup>4</sup>	0,25	—	0,002
Бутиловый эфир группы 2,4-Д	0,15	—	0,002
Кротилловый эфир группы 2,4-Д	0,15	—	0,002
Октиловый эфир группы 2,4-Д	0,15	—	0,002
Малолетучие эфиры группы 2,4-Д	0,15	—	0,002
2,4-Дихлорфенол	0,05	—	0,002
ДД	—	—	0,400
ДДВФ	—	0,10	0,01
ДДТ и его метаболиты (суммарное количество) <sup>3</sup>	0,10	—	0,100

Пестицид	Концентрация в почве, мг/кг		ПДК в воде водосмоов, мг/л
	ПДК	ОДК	
Дебос	—	—	2,000
Девринол	—	—	1,000
Делан	—	—	0,030
Делис	0,01	—	0,006
Дибром	—	—	0,020
Дилор	0,50	—	0,04
Дитан М-45	—	—	0,003
Диурон	0,50	—	0,06
2,4-ДМ	—	—	0,010
ДНОК	—	—	0,06
Дозанекс	—	—	0,010
Дравин 755	—	—	0,03
Дурсбан	0,20	—	0,002
Иллоксан	—	—	0,100
Иодофенфос	0,50	—	0,01
Каптан	—	1,00	0,200
Карагард	—	0,40	0,01
Карбатнион	—	—	0,010
Карбофос	2,00	—	0,050
Кельтан	1,00	—	—
Которан	—	—	0,300
Купроцин-1	1,00	—	—
Лассо	—	—	0,100
Лебайцид	—	—	0,001
Ленацил	—	1,00	0,200
Линиурон	1,00 <sup>3</sup>	—	—
2М-4Х	—	—	0,04
2М-4ХП	0,40	—	2,000
2М-4ХМ	0,60	—	0,03
Малоран	—	—	0,400
Мезорантл	—	0,90	0,002
Металлхлорид	—	—	0,010
Метазин	—	0,60	0,002
Метатнион	1,00	—	0,006
Метафос	0,10	—	0,002
Метокснхлор	—	1,60	0,005
Митак	—	—	0,050
Монурон	0,30	—	5,000
Мороцид	—	—	0,030
Нитрофор	—	0,20	—
Пирамин	—	0,70	2,000
Пиримор	0,30	—	Не допус- кается
Пликтран	—	0,10	0,001
Полидим	—	—	5,000
Поликарбацин	—	0,60	2,000
Политриазин	0,10; 0,01 <sup>1</sup>	—	—
Полихлоркамфен	0,50	—	—
Полихлорпипинен <sup>3</sup>	[ 0,50	—	0,002



Пестицид	Концентрация в почве, мг/кг		ПДК в воде водоемов, мг/л
	ПДК	ОДК	
Препарат А-1	—	0,50	—
Прометрин	0,50	—	0,002
Пропазин	—	—	0,02
Пропанид	1,50	—	0,100
Рамрод	—	0,20	0,010
Реглон	—	0,20	0,020
Ридеон	—	—	1,200
Ридомил	0,05	—	—
Рипкорд	0,02	—	0,006
Ровраль	—	—	0,01
Ронит	0,80	—	0,02
Сатурн	—	—	0,050
Севин	0,05	—	0,100
Семерон	0,10	—	0,010
Симазин	0,20; 0,01 <sup>1</sup>	—	Не допус- кается
Солан	—	0,60	0,100
Сумицидин	0,02	—	0,015
Сутак	—	0,60	0,100
Суффикс	—	—	1,000
Теноран	—	0,40	—
Тербацил	—	0,40	0,500
Тетрал	—	—	1,000
Тиазон	—	—	0,010
Тиллам	—	0,60	0,010
Тиодан	—	0,10	—
Толунн	—	—	0,050
Томилон	—	—	0,050 (ОБУВ)
Топсин-М	—	0,40	—
Тордон 22 К	—	—	0,100
Трефлан	—	0,10	1,000
Триаллат	—	—	0,030
ТХАН	—	0,20	5,000
ТХМ	—	0,10	0,400
Теноран	1,80	—	—
Фозалон	0,50	—	0,001
Фосфамид	0,30	—	0,030
Фталан	—	0,30	0,040
Фталофос	0,10	—	0,200
Хлор ИФК	—	—	1,000
Хлорат магния	—	1,00	—
Хлорамп	0,05	—	—
Хлорофос	0,50	—	0,01
Хлорэтанол	—	—	0,020
Хостаквик	—	0,20	0,006
Цианокс	—	0,40	0,060
Цидеал	—	0,40	0,015
Цинеб	0,20	—	0,030

Пестицид	Концентрация в почве, мг/кг		ПДК в воде водоемов, мг/л
	ПДК	ОДК	
Эдил	—	—	0,010
Эвисект	—	—	0,010
Эптам	0,90	—	0,05
Этафос	—	0,10	0,0004
Эупарен	—	0,20	0,025
Яллан	—	0,90	0,070
Ацетал	—	—	0,1
Ботран	—	—	0,007
Бутилкаптакс	—	—	0,005
Вернам	—	—	2,0
Волатон	—	—	1,0
Гранозан	—	—	0,0001
Дикват	0,2	—	0,002
Дифенамид	—	—	1,2
Дропп	—	—	2,0
Дуал	—	—	0,02
Ивин	—	—	0,02
Карбин	—	—	0,03
Зенкор	—	—	0,1
Лонтрел	—	—	0,04
Мильтокс	—	—	0,1
Мирал	—	—	0,001
Нитрафен	—	—	0,01
Офунак	—	—	0,002
Паторан	—	—	0,2
Плондрел	—	—	0,03
Ресин	—	—	0,002
Рицид	—	—	0,002
Ромуцид	—	—	0,003
Сапроль	—	—	0,02
Стомп	—	—	0,05
Сумилекс	—	—	0,004
Тачигарен	—	—	0,002
Текто	—	—	0,05
Тилт	—	—	0,15
ТМТД	—	—	1,0
Токутион	—	—	0,01
Торк	—	—	0,005
Трихлорметафос-3	—	—	0,02
Тур	—	—	0,002
Фурадан	—	—	Не допускается

<sup>1</sup> ПДК, рекомендуемая для почв, где предполагается возделывание сельскохозяйственных культур, чувствительных к пестициду: зерновых (ячмень, пшеница, овес, рожь), зерновых бобовых (соя), технических (сахарная свекла, подсолнечник), овощных (огурцы, капуста), кормовых трав (вико-овсяная смесь, люцерна). Наличие остатков в почве не допускается при возделывании табака.

<sup>2</sup> Величина ПДК актеллика 0,1 мг/кг рекомендуется для почв с рН 5,5.

<sup>3</sup> Препарат применять в сельском хозяйстве запрещено.

<sup>4</sup> 0,25 мг/кг аминной соли соответствует 0,1 мг/кг 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусной кислоты), по которой осуществляется контроль содержания в почве.

**Примечание.** Нормативы приведены согласно «Санитарно-гигиеническим нормам предельно допустимых количеств (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) пестицидов в почве» (СанПиН 42-128-4275-87. — М.: Минздрав СССР, 1987) и «Списку химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве на 1986—1990 годы» (М., 1987).

201. ДСД и МДУ содержания пестицидов в пищевых продуктах

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
А-1	Хлопковое масло	Не доп.	0,003
Агелон (атразин + арометрин)	Кукуруза	0,1	—
Акрекс (изофен)	Огурцы, томаты, перец, яблоки, груши, хлопковое масло, цитрусовые (мякоть)	0,05	0,001*
	Хмель (сухой)	0,5*	—
	Малина, смородина, крыжовник	Не доп.	—
	Виноград, сахарная свекла	0,05*	—
Актеллик (пиримифосметил, белофос)	Томаты, огурцы, сахарная свекла	0,2	0,01
	Перец, баклажаны	0,2*	—
	Малина, смородина, крыжовник, земляника	Не доп.	—
	Черноплодная рябина, облепиха	Не доп.	—
	Чай, капуста, брюква, турнепс, виноград, персик	0,5*	—
	Табак, рис	1,0*	—
	Зерно хлебных злаков (в момент обработки)	5,0*	—
	Горох	0,05*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,1*	—
Актрил АС (ноксинил + 2М-4Х)	Зерно хлебных злаков, ячмень, овес	0,05*	—
		Контролировать по 2М-4Х	—
Актрил М (ноксинил + 2М-4ХП)	Зерно хлебных злаков, ячмень, овес	Контролировать по 2М-4ХП	—
Алар (ДЯК)	Яблоки	3,0	0,02
Алахлор (лассо)	Кукуруза, соя	Не доп. *	0,002*
Амбуш (корсар, перметрин, галкорд, висметрин, анометрин-Н)	Рис, яблоки	0,01	0,035
	Томаты, огурцы	0,4	—
	Картофель	0,05	—
	Семена хлопчатника	0,5*	—
	Хлопковое, подсолнечное, соевое масло	0,1*	—
	Горох, сахарная свекла, соя	0,05*	—
	Кукуруза	0,1*	—
	Вишня, виноград, крыжовник, смородина, земляника	0,01*	—
	Семена подсолнечника	1,0*	—
	Капуста, брюква, турнепс	0,4*	—
Аметрин	Цитрусовые (мякоть)	0,1*	0,25
Амйбен (хлорамбен)	Капуста, томаты, виноград, соя, хлопковое масло	0,25	0,1
	Семена хлопчатника	0,25*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,05*	—
Амидм (2,4-Д + ТБА)	Зерно хлебных злаков	Не доп. *	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Анитен С (флуоренол бутлиловый)	Зерно хлебных злаков, ячмень	Контролировать по 2М-4Х	—
Анитен М (флуоренол бутлиловый эфир 2М-4Х)	Зерно хлебных злаков	Контролировать по 2М-4Х	—
Антио (формотрион)	Капуста, сахарная и столовая свекла, яблоки, груши, сливы, вишни, виноград, гранат, чай, хлопковое масло	0,2	0,02
	Семена хлопчатника	0,25*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,04*	—
	Хмель (сухой)	2,0*	—
Арезин (монолнурон)	Картофель	Не доп.	0,003
Арцерид (ридомил + поликарбацин 1:8)	Картофель, лук, сахарная свекла	0,05*	—
	Томаты, огурцы	—	—
	Виноград	0,5	—
	Хмель (сухой)	0,5*	—
	Табак	5,0*	—
		1,0*	—
Атразин (зеапос, олеогезаприм, сайлазин, майазин)	Овощи, фрукты (семечковые), виноград, зерно хлебных злаков, кукуруза	0,1	0,004
	Сорго, кориандр	0,1*	—
	Смородина, крыжовник, малина, молоко	Не доп.	—
	Мясо, яйца	0,02	—
Ацетохлор (ацетал, аценит)	Картофель	Не доп.	0,001
	Кукуруза	0,03	—
	Соя	0,03*	—
Ацетлур (ТХАН + ленацил)	Свекла столовая и сахарная	Контролировать по ТХАН	—
Афуган (пиразафос)	Все пищевые продукты	Не доп.	0,003
Базагран (бенгезон)	Зерно хлебных злаков, рис	0,1	—
	Ячмень, овес, кукуруза, соя, соевое масло, горох (овощной и на зерно)	0,1*	0,002
	Хмель (сухой)	1,0*	—
Базагран М (бенгезон + 2М-4Х)	Зерно хлебных злаков, ячмень, овес	Контролировать по базаграну	—
Базудин (диазинон)	Капуста, лук, картофель, зерно хлебных злаков, кукуруза, семена хлопчатника, хлопковое масло	0,1	0,004
	Морковь, молоко, мясо птицы, яйца, молочные продукты	Не доп.	—
	Мясо (в пересчете на жир)	0,7	—
	Томаты, свекла сахарная и	0,5	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
	столовая, огурцы, табак, мак масличный		
	Хмель (сухой)	1,0*	—
	Брюква, турнепс	0,1*	—
Байлетон (азоцен, триадимефон)	Свекла сахарная, огурцы, томаты, зерно хлебных зла- ков	0,5	0,03
	Дыни, яблоки	0,05	—
	Виноград	0,1	—
	Земляника, смородина	Не доп.	—
Байтекс (фентион, лебайцид, сульфидонос)	Зерно хлебных злаков и бо- бовых, сахарная свекла	0,15	0,0005
	Молоко, молочные продук- ты	Не доп.	—
	Мясо, мясопродукты	0,2	—
Банлен (2М-4Х + + банвел)	Зерно хлебных злаков	0,05	—
Бетанал (фенмеди- фам, пистол)	Свекла сахарная, столовая	0,2	0,06
	Цикорий, цикорий салатный	0,5	—
Бетанал АМ (фен- медифам, десмеди- фам)	Свекла сахарная, столовая	Пищевые про- дукты контро- лировать по бе- таналу	—
Болетин	Свекла сахарная	0,1	—
Блазер (такл)	Соя	0,1*	0,01
БМК (бавистин, карбендазим, фуна- бен, олгин)	Огурцы, яблоки, виноград, земляника, черная смороди- на	Не доп. *	0,01
	Свекла сахарная	0,1*	—
Бордоская жид- кость	Свекла, томаты, огурцы, лук, дыни, арбузы, яблоки, гру- ши, айва, абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни, ви- ноград, цитрусовые, сморо- дина, крыжовник, земляника	5,0	0,17 (по меди)
	Малина	2,0*	—
	Картофель	10,0*	—
	Хмель (сухой)	10,0*	—
Ботран (дихлоран)	Персики	0,1*	0,03
Бромфос (некси- он)	Капуста, фасоль, огурцы, са- лат, горох зеленый, виноград	0,05	0,04
	Персики, вишни, черешни, сливы	0,07	—
	Хмель (сухой)	0,5	—
	Смородина, крыжовник, ма- лина	Не доп.	—
	Яблоки, груши	0,1	—
Бромистый метил	Зерно хлебных злаков (для ввозимых продуктов после 24 ч проветривания)	50,0 (контролиро- вать по неорга-	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
		ническому бро- миду)	
	Продукты помола зерна, предназначенные для кулинарной обработки	10,0	—
	Хлеб и другие готовые к употреблению изделия из зерна хлебных злаков	0,5	—
	Сухофрукты (для ввозимых продуктов через 24 ч после проветривания)	20,0*	—
	Сухофрукты, предназначенные к употреблению	0,5*	—
	Какао-бобы (для ввозимых через 24 ч после проветривания)	50,0*	—
	Какао-продукты	0,5*	—
	Орехи, арахис (для ввозимых)	100 0*	—
	Орехи, арахис (предназначенные для употребления)	0,5*	—
Бронокот (бронопол)	Семена хлопчатника, хлопковое масло	Не доп.	0,002
Валексон (волатон, фоксим)	Зерно хлебных злаков	0,05*	0,001
	Зерно хлебных злаков (после обработки в условиях хранения)	0,6	—
	Кукуруза	0,05	—
	Картофель, морковь, баклажаны, томаты, мясо	0,02	—
	Гурнепс, броква, подсолнечное масло	0,05*	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
	Капуста, сахарная свекла	0,1	—
Вернам (вернолат)	Соя	0,5*	0,015*
	Табак	1,0*	—
Видат (оксамил)	Томаты, огурцы	0,5*	0,03
	Свекла сахарная	0,1*	—
Гардона (тетра-хлорвинфос)	Капуста, яблоки, груши, вишни, еливы	0,8	—
	Виноград, крыжовник, земляника	0,01	—
	Хмель (сухой)	5,0	—
	Семена хлопчатника	0,1	—
	Хлопковое масло	0,1	—
Гезаран 3617 (симазин, метопротрин)	Зерно хлебных злаков, ячмень	1,0	—
Гексахлорбутадиен (ГХБД)	Виноград, виноградное вино и сок	Не доп.	0,001

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг	
Гетерофос	Картофель, кукуруза *, хмель (сухой) *	То же	0,0003	
Гидразид малеиновой кислоты (ГМК, МГ-натрий)	Картофель, свекла сахарная, столовая, лук, чеснок, морковь, томаты, арбузы, табак	8,0	0,03	
Гидрел	Картофель, томаты, огурцы, яблоки, черешня, мандарины, хлопковое масло	0,15	0,003	
Глифосат (раундап, фосулен, утал)	Семена хлопчатника	0,15*	—	
	Плодовые, цитрусовые (мякоть), овощи, картофель, зерновые бобовые, кукуруза	0,3	0,01	
Голтикс (метамитрон)	Виноград	0,1	—	
	Свекла сахарная и столовая	0,1	0,003*	
γ-Изомер ГХЦГ	Картофель, сахарная свекла, горошек зеленый, мак масличный, мясо, яйца	0,1	0,01*	
	Капуста, кукуруза, грибы	0,5	—	
	Яблоки, виноград, молоко	0,05	—	
	Ягоды лесные, зерно хлебных злаков и бобовых	Не доп.	—	
	Молочные продукты (в пересчете на жир)	1,25	—	
	Масло сливочное, жир	0,2	—	
	Мясо морских животных	0,01	—	
	Рыба морская (соленая, копченая)	0,2	—	
	Рыба пресноводная	0,03	—	
	Горчица	0,2*	—	
	Мед, сахар	0,005	—	
	Даконил (хлорталонил)	Картофель	0,1*	0,003
		Хмель (сухой)	1,0*	—
Дактал (тетрал, хлортал-диметил)	Огурцы	0,15*	—	
	Растительные пищевые продукты	Не доп.	0,0005	
Далапон (пропинат)	Картофель, свекла, фрукты, виноград	1,0	0,02	
	Смородина, крыжовник, малина	Не доп.	—	
	Чай	0,2	—	
	Семена хлопчатника	0,2*	—	
	Хлопковое масло	0,1	—	
2,4-Д аминная соль	Все пищевые продукты	Не доп.	0,001*	
2,4-Д бутиловый эфир (бутапон)	То же	То же	0,001*	
2,4-Д дихлорфеноксиуксусная кислота	»	»	—	
2,4-Д малолетучие эфиры	»	»	—	

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
2,4-ДМ	»	»	—
2,4-Д октиловый эфир (октапон)	»	»	0,001*
ДДВФ (хлорвин-фос)	Капуста, яблоки, груши, черешни, вишни, сливы, цитрусовые (мякоть), виноград, крыжовник, чай	0,05	0,004
	Смородина	0,05	—
	Зерно, отруби	0,3	—
	Мука, крупа, молоко, мясо	Не доп.	—
Декстрел	Томаты	1,5	0,08
Деис (дельтаметрин)	Семена хлопчатника	0,1*	0,003
	Хлопковое масло	0,05*	—
	Зерно хлебных злаков, бобовых, кукуруза, яблоки, груши, картофель, томаты*, огурцы, капуста, салат, рис, цитрусовые (мякоть)	0,01	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
	Соевое масло, свекла сахарная, виноград	0,01*	—
	Хмель (сухой)	5,0*	—
	Бананы, какао-бобы	0,05*	—
Диален	Зерно хлебных злаков, кукуруза	Пищевые продукты контролировать по 2,4-Д	—
Диамет Д (2М-4Х + дикамба)	Зерно хлебных злаков	Пищевые продукты контролировать по 2М-4Х	—
Дианат (банвел Д, дикамба)	То же	Не доп	0,004
Диапрен (2М-4ХП + дикамба)	Зерно хлебных злаков	0,25	—
		Контролировать по 2М-4ХП	—
Дибром (налед)	Картофель	0,2	0,009*
	Овощи	0,1	—
	Молоко и продукты его переработки, яйца	Не доп.	—
	Мясо	0,3	—
Дилор	Картофель, виноград, хлопковое масло	0,15	0,02
	Сахарная свекла, томаты, баклажаны, другие овощи	0,2	—
	Семена хлопчатника	0,2*	—
	Мак масличный	0,15*	—
Димилин (дифлубензурон)	Яблоки	0,1*	0,004



Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Дитан М-45 (манкоцеб)	Картофель	0,1	0,005
	Томаты, виноград	0,5	
Дитан-купрумикс (манкоцеб + сульфат или хлорокись меди)	Картофель, томаты, виноград	Контролировать по дитану М-45	—
Дихлоральмочевина	Все пищевые продукты	Не доп.	0,02*
ДНОК (динитро-ортокрезол)	То же	То же	0,003*
Дозанекс (метоксурон, пуривел)	Морковь	»	0,1
	Овощи, зерно хлебных злаков	0,1	
Дравин 755 (бутоксикарбосим)	Хлопковое масло	Не доп.	0,006
	Цитрусовые (мякоть)	0,01	
Дропп (тидiazурон)	Хлопковое масло, семена хлопчатника	Не доп.	0,006
Дурсбан (хлорпифос)	Сахарная свекла, картофель, овощи, фрукты	0,05	0,001
	Зерно хлебных злаков, кукуруза, табак, мясо	0,01	—
	Молоко, молочные продукты, яйца	Не доп.	—
	Хмель (сухой)	1,0*	—
	Семена хлопчатника, хлопковое масло	0,05*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,3*	—
Депра (напропамид, девринол)	Семена подсолнечника	0,15*	0,015
	Масло подсолнечное	0,05*	—
	Томаты	0,1*	—
	Табак	1,0*	—
Дуал (металохлор)	Семена хлопчатника, подсолнечника	0,1*	0,002
	Хлопковое, подсолнечное, соевое масло, свекла столовая	0,02*	—
	Кукуруза, свекла сахарная, соя, бахчевые	0,05*	—
	Табак, хмель (сухой)	1,0*	—
Зеелек (галоксифол)	Картофель	0,01*	—
Зенкор (метрибузин)	Картофель, томаты	0,25	0,004
	Соя	0,25*	—
	Соевое масло	0,1*	—
Ивин	Огурцы, томаты	0,04	—
Изатрин (биоресметрин)	Перец сладкий	0,01*	0,004*
	Смородина	Не доп. *	—
	Огурцы, томаты	0,4	—
	Рыба	0,0015	—
Иллоксан (дихлофопметил)	Зерно пшеницы, ячмень	Не доп.	0,02

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг	
Иодфенфос (С-9491)	Свекла сахарная	0,1	—	
	Капуста, крыжовник	0,5	0,004	
	Смородина, малина	Не доп.	—	
Каптан	Виноград	0,5*	—	
	Овощи, картофель, бахчевые, фрукты (семечковые, косточковые), виноград, малина, смородина, крыжовник, земляника	Не доп.	0,1	
Карагид (тербутетон + тербутилазин)	Семечковые, виноград	0,1	0,001	
	Цитрусовые (мякоть)	0,1*	—	
Каратан (динокап)	Бахчевые, огурцы, яблоки, груши, виноград	1,0	0,08	
	Смородина, крыжовник, земляника	Не доп.	—	
Карбин (барбан)	Овощи, фрукты	0,1	0,02*	
	Зерно хлебных злаков	1,0	—	
Камбилен (2М-4Х + 2М-4ХП-ТБА + дикамба)	Все пищевые продукты	Контролировать по 2М-4ХП и 2М-4Х	—	
	Карбофос (малатион)	Капуста, сахарная свекла, столовая свекла, огурцы, томаты, бахчевые, груши, вишни, черешни, сливы, виноград, чай	0,5	0,02
Яблоки, айва, арахис		1,0*	—	
Цитрусовые (мякоть)		0,2*	—	
Смородина, крыжовник, малина, земляника, манная крупа, продукты животноводства		Не доп.	—	
Зерно хлебных злаков, горох, соя, кукуруза		3,0	—	
Соевое и подсолнечное масло		0,1	—	
Мука		2,0	—	
Семена подсолнечника		0,5*	—	
Табак, махорка, хмель (сухой), грибы, крупа (кроме манной), хлеб		1,0	—	
Горчица, мак масличный		0,1*	—	
Карагид (тербутетон + тербутилазин)		Семечковые, виноград	0,1	—
		Цитрусовые (мякоть)	0,1*	—
Карате (цигалотрин)		Яблоки	0,03*	—
Карбин (барбан)	Овощи, фрукты	0,1	—	
	Сахарная свекла	Не доп. *	—	
	Цитрусовые (мякоть)	Не доп. *	—	
Картоцид	Лимон (весь плод)	0,1	—	

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Каунтер (тербу-фос)	Свекла сахарная	0,01*	0,001
Керб-50 (пропизамид)	То же	0,1*	0,3
Камлозан (этефон)	Цикорий салатный	1,0*	—
	Томаты, огурцы, зерно хлебных злаков	0,5	0,006
Кусагард (аллоксидимедон)	Свекла сахарная и столовая	0,05*	0,3
Которан (флуометурон)	Семена хлопчатника	0,1*	—
	Хлопковое масло	0,1	—
	Ячмень	0,5*	—
Котофор (дипропетрип)	Семена хлопчатника	0,1*	0,002
	Хлопковое масло	Не доп.	—
	Арбуз	0,1	—
Кронетон (этиофенкарб)	Зерно хлебных злаков, рис, хлопковое масло	0,05*	0,1
	Бобовые	0,2*	—
	Свекла сахарная, семена хлопчатника	0,1*	—
	Картофель	0,04	—
	Хмель (сухой)	1,0*	—
Кротенолактон	Зерно пшеницы, кукуруза	0,2	0,003
Купрозан (хомецин)	Свекла сахарная, томаты, арбузы, огурцы, дыни, яблоки, груши, виноград, сливы, персики, абрикосы, смородина, крыжовник, зерновые	5,0	—
	Картофель	10,0*	—
	Малина	2,0*	—
	Хмель (сухой)	10,0	—
КЭИМ	Цитрусовые (мякоть)	Не доп. *	—
Ленацил (вензар, гексилур)	Свекла сахарная и столовая	0,5	0,01
	Земляника	Не доп.	—
Лентагран (пиридат)	Кукуруза	0,05*	0,08*
Лонтрел (клопиралид)	Мясо, мясопродукты	0,3	—
	Молоко, молочные продукты, грибы, ягоды	Не доп.	—
	Зерно хлебных злаков, кукуруза, свекла сахарная	0,1*	—
	Капуста	0,05*	—
Лонтрел 416 С (клопиралид + 2М-4ХП)	Зерно хлебных злаков	Контролировать по 2М-4ХП	—
Малоран (хлоробромурон)	Морковь	Не доп. *	0,01
	Зерно хлебных злаков, кукуруза, соя, соевое масло	0,1*	—
Малоран-специаль (дуал + хлоробромурон)	Кукуруза, соя, соевое масло	0,05*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Медный купорос	Яблоки, груши, абрикосы, сливы, черешни, вишни, персики, смородина, крыжовник	5,0	0,17 (по меди)
Мезоранил (азипротрин)	Овощи	0,2	0,003*
2М-4Х	Зерно хлебных злаков, рис, картофель, подсолнечное масло	0,05	0,008
2М-4ХП (мекопроп)	Горох (овощной)	0,05*	—
2М-4ХМ	Зерно хлебных злаков	0,25	—
Метазин	Зерно хлебных злаков и бобовых	0,1	0,02
Мезокс (метоксифлор)	Картофель	0,05	0,001
Микал (фосэтил алюминия + фолпет)	То же	0,3*	—
Мильго (этиримол)	Виноград	Не доп.	0,0002
Мильтокс-специаль (хлорокись меди + цинеб)	Зерно хлебных злаков	0,1*	0,02
Металлихлорид	Овощи, фрукты, виноград, бахчевые	0,5	—
Метальдегид	Зерно хлебных злаков и бобовых	1,0	—
Метатнон (фенилтротнон, сумитион)	Зерно хлебных злаков	3,5	—
	Овощи, виноград, фрукты, зерно хлебных злаков	0,7	0,006
	Цитрусовые (мякоть)	0,2*	—
	Свекла сахарная, столовая, яблоки, вишни, груши, сливы, хлеб, грибы, цитрусовые (мякоть), табак, подсолнечное масло	0,1	0,003
	Ягоды лесные	Не доп.	—
	Зерно хлебных злаков, рис	1,0	—
	Мука	0,3	—
	Чай	0,5*	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
Метафос (вофатокс)	Все пищевые продукты	Не доп.	0,001
Мирал (изазофос)	Томаты, огурцы, земляника	То же	0,001
Митак (амитрац)	Огурцы, томаты	0,2	0,003
	Хлопковое масло	Не доп.	—
Митран (хлорфенанзон + хлорфенетол)	Яблоки	2,0	0,05
	Цитрусовые (мякоть)	0,1	—
	Семена хлопчатника, хлопковое масло, виноград	0,1*	—
Морестан (хинометопонат)	Фрукты (семечковые), виноград	Не доп.	0,006
Морфонол	Хлопковое масло	Не доп.*	—
Набу (сетоксидим)	Соя, сахарная свекла	0,05*	0,3*

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
	Морковь	0,02*	—
	Капуста	0,03*	—
Неорон (бромпропилат)	Семена хлопчатника	0,02*	0,008
	Хлопковое масло, шрот, мед	0,02	—
Нимрод (бупиримат)	Огурцы, дыни, яблоки	0,1*	0,03
	Черная смородина	Не доп.*	—
Нитрафен	Все пищевые продукты	Не доп.	—
Нитрофен (нитрохлор)	То же	То же	0,006*
Нортрон (этофумезат)	Свекла сахарная, столовая	0,1*	0,1
	Табак	1,0*	—
Нурелл-Д (циперметрин + хлорпирифос)	Хлопковое масло, семена хлопчатника	Контролировать по хлорпирифосу (дурсбану)	—
Омайт (пропаргит)	Семена хлопчатника, хлопковое, соевое масло, соя	0,1*	0,15
	Яблоки, виноград, вишня	0,5*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,3*	—
	Огурцы	0,2*	—
Офунак (пиридофенгион)	Капуста	0,1	0,001
	Свекла сахарная, цитрусовые (мякоть)	0,1*	—
Паарлан (изопропалин)	Табак	1,0*	0,001*
Паторан (метобромурон)	Картофель	0,1*	0,025
	Табак	0,5*	—
Пиримор (пиримикарб)	Хмель (сухой)	1,0*	0,004
	Картофель	Не доп.*	—
	Семена хлопчатника, масло хлопковое, горох	Не доп.	—
	Персики, яблоки	0,05	—
	Огурцы	0,1*	—
Плантвакс (оксикарбоксин)	Зерно пшеницы	0,2*	0,15*
Пликтран (цистан, цигексатин)	Яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть)	Не доп.	0,008
	Соя, соевое масло	0,1*	—
	Семена хлопчатника	0,01*	—
	Хлопковое масло	0,01	—
	Хмель (сухой)	1,0*	—
Плоидрел (диталимфос)	Огурцы	0,1	0,01
	Яблоки	0,5	—
	Зерно хлебных злаков	0,1*	—
	Виноград	0,5*	—
	Черная смородина, земляника	Не доп.*	—
Полихом (поликарбацин + хлорокись меди)	Все пищевые продукты контролировать по поликарбацину		
Поаянкарбацин	Картофель	0,1*	0,05
	Лук, свекла сахарная, тома-	1,0	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Полихлоркамфен (токсафен)	ты, яблоки, груши, вино- град, ягоды, хмель (сухой)		
	Зерно хлебных злаков, рис	0,2*	—
	Табак, махорка	1,0*	—
	Огурцы	0,5*	—
	Свекла сахарная	0,1	0,001
Препарат 242	Картофель, зерно гороха, подсолнечное масло, сахар, зеленый горошек, молоко, мясо, яйца	Не доп.	—
	Зерно для переработки	0,1	—
Примницид (пири- мифосэтил)	Мука	Не доп.	—
	Кукуруза	0,1*	0,008
Примэкстра (гезо- грам, дуал + ат- разин)	То же	Контролировать по дуалу и атразину	—
Пропазин	Зерно хлебных злаков, бобо- вых	0,2	0,001
	Морковь	Не доп.	—
	Кориандр	0,2*	—
Пропанид (ДЦПА, пропанид)	Рис	0,3	0,04
Прометрин (геза- гارد)	Картофель, чеснок, фасоль, чечевица, чина, соя, горох, подсолнечное масло	0,1	0,001
	Морковь, сельдерей, петруш- ка, укроп	Не доп.	—
	Соевое масло, семена под- солнечника, кориандр, тмин	0,1*	—
	Капуста, лук, чеснок, брюк- ва, турнепс	0,2	0,01*
Рамрод (пропа- хлор)	Зерно хлебных злаков и бо- бовых	0,3	—
	Кукуруза	0,3*	—
	Соя	Не доп.	—
Реглон (дикват)	Семена подсолнечника	0,5*	0,008
	Подсолнечное масло	0,1	—
	Мясо	0,01*	—
	Молоко	Не доп.	—
Ридомил (апрон, металаксил)	Томаты	0,5*	0,03
	Лук, свекла столовая, карто- фель	0,05	—
	Свекла сахарная	0,05*	—
	Хмель (сухой)	5,0*	—
	Табак	1,0*	—
	Виноград	0,03*	—
	Огурцы	0,5	—
	Перец, томаты	0,1*	0,001*
Ридеон мид)	Табак	0,15*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Ринкорд (циперметрин, цимбуш)	Капуста	Не доп.	—
	Ягоды	То же	0,003
	Плоды семечковые, цитрусовые (мякоть)	0,01	—
	Семена хлопчатника, хлопковое масло, виноград, картофель, соя, морковь	0,01*	—
	Огурцы, томаты, капуста	0,2*	—
	Соевое масло	0,1*	—
	Кукуруза	0,05*	—
Ровраль (ипродинон)	Рыба	0,0015	—
	Виноград	0,4	0,3
Розалин	Картофель, огурцы, томаты, земляника	Не доп.	—
	Семена хлопчатника, хлопковое масло	То же	—
Ронилан (винклозалин)	Семена подсолнечника, подсолнечное масло	0,5*	0,01
	Томаты	1,0	—
	Огурцы	1,0*	—
	Виноград	3,0*	—
	Земляника	Не доп.	—
Ронит (этсан, циклоат)	Свекла сахарная, столовая	0,3	0,1
Ронстар ПЛ (оксадиазон + пропанил)	Рис	Пищевые продукты контролировать по пропаниду	—
Ртутьсодержащие протравители семян	Все пищевые продукты	Не доп.	—
Ромуцид	Зерно хлебных злаков	0,1*	0,05*
	Огурцы	Не доп. *	—
Сайгор (пиклорам + 2,4-Д)	Кукуруза	Не доп.	0,004
	Пшеница, ячмень	0,01 (контролировать по пиклораму)	—
Сандофак (оксидиксил)	Картофель	0,1*	—
Сапроль (трифориин)	Огурцы	0,1	—
	Яблоки	0,01	—
	Виноград	0,01*	—
Сатурн (тиобенкарб)	Рис	0,3*	0,5*
Севин (карбарил)	Яблоки, кукуруза, семена хлопчатника, мясо, молоко, молочные продукты	Не доп.	0,01
	Хлопковое масло	Не доп.	—
Селекром (профенофос)	Капуста	0,03*	0,002*
	Виноград, яблоки, персики,	0,05*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
	цитрусовые (мякоть), свек- ла сахарная		
	Соя	0,3*	—
	Соевое масло	0,1*	—
Семерон (десмет- рин)	Капуста	0,05	0,1*
	Лук	0,05*	—
Сероуглеродная эмульсия	Зерно	10,0	—
	Мука, крупа	1,0	—
	Хлеб, продукты, пригото- вленные из зерна	0,006	—
Симазин (гезатоп)	Косточковые, семечковые	0,2	0,1
	Цитрусовые (мякоть)	0,05*	—
	Виноград, чай	0,05	—
	Смородина, малина, кры- жовник, земляника	Не доп.	—
	Зерно хлебных злаков, куку- руза	1,0	—
	Картофель, капуста	0,1*	—
Ситрин (симазин + прометрин)	Картофель — контролиро- вать по прометрину	0,1*	—
	Хмель (сухой)	0,1*	—
Солан (пентано- хлор)	Томаты	1,5	0,15*
Стомп (пенокси- лин)	Соя, соевое масло, табак, хмель (сухой), чеснок	0,1*	0,25*
	Семена хлопчатника, хлоп- ковое масло	0,5*	—
	Томаты, капуста, морковь	0,05*	—
Сульфазин	Картофель	0,05*	0,002*
	Горох	0,1*	—
Сумилекс (проци- мидон)	Виноград, огурцы, томаты	0,5*	0,006
	Земляника	Не доп.	—
Сумицидин (фен- валерат, фенвал)	Яблоки, капуста	0,01	0,034
	Виноград, картофель	0,01*	—
	Смородина	Не доп.	—
	Кукуруза, соя, соевое мас- ло, хлопковое масло	0,1*	—
	Хмель (сухой)	5,0*	—
	Семена хлопчатника	0,2*	—
	Рыба	0,0015	—
	Пшеница, ячмень	0,02*	—
Сурпас (верно- лат + антидот)	Соя, кукуруза	0,5*	0,015*
	Соевое масло	0,1*	—
Сутан (антидот + бутиллат)	Кукуруза	0,5*	0,02*
Суффикс БВ (флампропизопро- пил)	Зерно хлебных злаков, яч- мень	0,1*	0,015*
Тачигарен (гиме- ксазол)	Сахарная свекла, рис, горох	Не доп.	—



Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Тедион (тетрадифон)	Овощи, бахчевые, огурцы, яблоки	0,7	0,05*
	Цитрусовые (мякоть), семена хлопчатника	0,2*	—
Текто (тиабендазол)	Виноград, хлопковое масло	0,1	—
	Зерно хлебных злаков	0,2*	0,3
	Томаты	0,1*	—
Теноран (хлорок-сурон)	Картофель	1,0	—
	Морковь	0,02	0,06*
Тербацил (синбар)	Яблоки, груши, цитрусовые (мякоть), персики, абрикосы, сливы, вишни, виноград	0,05	0,01*
Тиазон (дазомет)	Картофель, овощи, рыба	0,5	0,01*
Тиллам (пебулат)	Овощи, свекла сахарная и столовая	0,05	0,001*
Тилт (пропиквазол)	Табак	0,1*	—
	Зерно хлебных злаков	0,1*	0,04*
Тиодан (эндосульфан)	Огурцы, томаты	Не доп.	0,002
	Семена хлопчатника	0,1*	—
ТМТД (тирам)	Хлопковое масло	0,05	—
	Все пищевые продукты	Не доп.	0,005
Токутнон (протнофос)	Семена хлопчатника, хлопковое масло, виноград	0,1*	0,08*
	Капуста	0,05*	—
Толуин	Семена хлопчатника	0,25*	0,015
	Хлопковое масло	0,25	—
	Кукуруза	0,5*	—
Томилон (тетрафлуорон)	Семена хлопчатника	0,1*	0,02
	Хлопковое масло	Не доп.	—
Топсин М (тиофанат-метил)	Огурцы, яблоки, груши, вишни, виноград	0,5	0,08
	Хурма, фейхоа	0,2*	—
	Сахарная свекла, персики, зерно хлебных злаков	1,0	—
	Смородина	Не доп.	—
Топогард (тербутилазин + тербуtrin)	Картофель	0,1*	0,001*
	Зерно хлебных злаков, кукуруза	Не доп.	0,02*
Тотрил (иоксинил)	Ягоды лесные, грибы	0,5	—
	Лук	0,1*	0,04*
Трефлан (трифлуралин, нитран, оли-треф)	Капуста, лук, чеснок, томаты, баклажаны, перец, соя, табак, семена подсолнечника	0,5	0,01*
	Морковь (пучковой зрелости), арбузы	0,25*	—
	Морковь (товарной зрелости)	0,01*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
	Соевое масло, подсолнечное масло	0,1*	—
Триаллат (авадекс БВ)	Зерно хлебных злаков, зерно бобовых	0,05*	0,02*
Трихлорацетат (ТХАН)	Крыжовник, смородина Картофель, капуста, огурцы, свекла сахарная и столовая, лук, морковь, плодовые, зерно хлебных злаков и бобовых, масло подсолнечное	Не доп. 0,01	— —
Трихлорметафос (фенхлорфос)	Семена подсолнечника Молоко, молочные продукты, яйца	0,01* Не доп.	— 0,01
Трихлорметафос-3 (трихлораль)	Мясо, мясные продукты Огурцы, томаты, сахарная свекла, капуста, яблоки, груши, айва, вишни, черешни, сливы, абрикосы, алыча, виноград, грибы	0,3 1,0	— 0,01
	Смородина, крыжовник, лесные ягоды, продукты животноводства	Не доп.	—
	Табак	0,7	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,3*	—
	Зерно хлебных злаков, чай	0,5	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
	Хлопковое масло	0,1	—
Трихотецин	Огурцы	1,0	—
Тубарид (ридомил + хлорокись меди)	Виноград, картофель, лук, табак, хмель	Контролировать по ридомилу	—
Тур (хлорхолинхлорид, хлормекват-хлорид)	Зерно хлебных злаков Томаты, яблоки, груши, виноград	0,1 0,05	0,001 —
Фадеморф (триморфамид)	Яблоки, огурцы Виноград	0,2* 0,1*	0,05* —
Фастак (альфаметрин)	Картофель, пшеница	0,01*	—
Феназон (хлоридазон, пирамин)	Свекла сахарная, столовая	0,01*	0,002
Фенагон	Зерно хлебных злаков, зерно кукурузы	Не доп.	0,001*
Феноксазин (2,4-Д + атразин)	Зерно хлебных злаков, кукурузы	Контролировать по 2,4-Д и атразину	—
Фитобактериомицин	Капуста, фасоль, пшеница, соя	Не доп.	0,008
Фозалон (бензофосфат, золон)	Соевое масло Капуста, семена хлопчатника, рис Картофель	Не доп. 0,2* 0,1	— 0,006 —

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
	Свекла сахарная, баклажаны, томаты, яблоки, груши, персики, абрикосы, вишни, сливы, цитрусовые (мякоть), виноград, грибы, зерно хлебных злаков, бобовых, хлопковое масло, табак, махорка	0,2	—
	Ягоды лесные, продукты животноводства	Не доп.	—
	Хмель (сухой)	2,0*	—
	Соя, соевое масло, мак масличный	0,1*	—
<b>Фостоксин</b> (фосфин, фосфид алюминия)	Сухие овощи, какао-бобы, специи, орехи, арахис, сухие фрукты	0,01*	—
	Сахар, чай	0,01*	—
	Зерно хлебных злаков	0,1	—
<b>Фосфамид</b> (диметоат, рогор, БИ-58)	Капуста, вишни, лесные ягоды, ягоды шелковицы	Не доп.	0,01
	Свекла столовая	0,15	—
	Огурцы, томаты, бахчевые, яблоки, груши, сливы, цитрусовые (мякоть), виноград, маслины, грибы, рис, зерно хлебных злаков и бобовых, табак, махорка	0,4	—
	Картофель, свекла сахарная	0,05*	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
	Масло подсолнечное	0,1	—
	Хмель (сухой)	3,0*	—
<b>Фталан</b> (фолпет)	Картофель, томаты, яблоки, груши, персики, абрикосы, вишни, черешни, сливы, виноград, смородина, крыжовник	Не доп.	—
<b>Фталофос</b> (имидан, фосмет)	Картофель, ягоды лесные	Не доп.	0,02
	Свекла сахарная	0,25	—
	Грибы	0,1	—
<b>Фундазол</b> (бенлат, беномил, узген)	Хлопковое масло (неочищенное), огурцы, томаты, капуста, яблоки, груши, земляника, смородина, виноград, соя, зерно хлебных злаков	Не доп.	0,02
	Сахарная свекла	0,1	—
	Рис	0,5	—
<b>Фурадан</b> (карбофуран)	Свекла сахарная	Не доп.	0,01
	Хмель (сухой)	5,0	—
<b>Фюзилад</b> (флуазифопбутил)	Свекла сахарная	0,2*	0,01*
	Свекла столовая	0,1*	—
	Лук	0,1*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Хлорат магния	Морковь	0,03*	—
	Капуста	0,02*	—
	Картофель, зерно хлебных злаков, рис, виноград	0,4*	—
	Семена хлопчатника, хлопковое масло, соя, соевое масло	0,5*	—
Хлор-ИФК (хлорпрофам)	Лук, морковь, цикорий	0,05	0,02
Хлорокись меди	Картофель, хмель (сухой)	10,0*	0,17 (по меди)
Хлорофос (трихлорфон)	Томаты, огурцы, свекла сахарная, лук	5,0	—
	Яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, вишни, черешни, виноград	5,0*	—
	Зеленные, капуста, огурцы, томаты, бакчевые, картофель, яблоки, груши, абрикосы, сливы, вишни, виноград, рис, зерно хлебных злаков, зерновые бобовые (соя, горох, бобы), кукуруза, масло подсолнечное, горчица	0,1	0,005
	Перец сладкий, соевое масло, семена подсолнечника, семена хлопчатника, хлопковое масло	0,1*	—
	Лук, морковь, баклажаны, кабачки	0,05*	—
	Свекла сахарная	0,05	—
	Ягоды лесные, молоко, мясо-молочные продукты	Не доп.	—
	Грибы	0,2	—
	Огурцы, перец, томаты, баклажаны, бакчевые, яблоки, груши, сливы, вишни, черешни, виноград	1,0	—
	Цитрусовые (мякоть), семена хлопчатника	0,2*	—
Хлорэтанол (диклофол)	Хмель (сухой)	5,0	—
	Масло хлопковое	0,1	—
	Земляника, крыжовник, смородина, малина	Не доп.	—
	Огурцы и томаты	0,1	0,003
	Зерно хлебных злаков, бобовые, яблоки, груши, вишни, персики, виноград, перец	0,1*	—
	Смородина, черноплодная рябина	Не доп.*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,05*	—
Хостаквик (гептенофос)	Огурцы и томаты	0,1	0,003
	Зерно хлебных злаков, бобовые, яблоки, груши, вишни, персики, виноград, перец	0,1*	—
Хостаквик (гептенофос)	Смородина, черноплодная рябина	Не доп.*	—
	Цитрусовые (мякоть)	0,05*	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Цианокс (циано-фос)	Свекла сахарная, капуста, яблоки, виноград	0,1	0,003*
	Цитрусовые (мякоть)	0,05*	—
Цидиал (элсан)	Яблоки, груши, виноград	0,1	0,003
	Вишни, сливы, рис	0,1*	—
Цинеб (перозин)	Цитрусовые (мякоть)	0,05	—
	Картофель	0,1	0,02
	Томаты, свекла сахарная, огурцы, лук, бахчевые, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни, виноград	0,6	—
	Смородина, крыжовник, малина	Не доп.	—
	Зерно хлебных злаков, рис, горох (кроме зеленого)	0,2	—
	Хмель (сухой), табак, роза эфиромасличная	1,0	—
Эвисект (тлоцик-лам)	Картофель	Не доп.	0,006
	Свекла сахарная	0,02	—
Эдил	Соя, картофель, семена подсолнечника	0,02	0,0008
	Соевое масло, подсолнечное масло	0,02*	—
Экамет (этримфос)	Семена хлопчатника, хлопковое масло, яблоки, виноград	0,5*	0,003
	Смородина	Не доп. *	—
	Свекла сахарная	0,01*	—
	Капуста, картофель, семена подсолнечника, масло подсолнечное	0,1*	—
	Горох	0,2*	—
Энтам	Свекла сахарная и столовая, растительное масло (подсолнечное и др.)	0,05	0,01
	Кукуруза	0,05	—
Эрадикан (алирокс, витокс)	Яблоки, цитрусовые (мякоть), персики, капуста, картофель, мясо	0,01	0,0002
	Свекла сахарная	0,02	—
Этафос	Яйца	Не доп.	—
	Виноград	0,01*	—
	Семена хлопчатника, хлопковое и подсолнечное масло	0,02*	—
	Семена подсолнечника	0,1*	—
	Смородина	Не доп. *	—

Пестицид	Пищевой продукт	МДУ, мг/кг	ДСД, мг/кг
Эупарен (дихло-флуанид)	Яблоки, виноград, земляника	Не доп.	—
Ялан (молинат, шаккимол, ордрам)	Рис	0,2	0,01

Примечание. Звездочкой обозначены нормативы, полученные расчетным путем. «Не доп.» означает, что содержание остатков пестицидов в пищевых продуктах не допускается.

202. Среднесуточные количества потребления пищевых продуктов, рекомендуемые для использования при расчете МДУ содержания пестицидов в них

Продукт	Количество, г/сут	Продукт	Количество, г/сут
Хлебные продукты (в пересчете на муку)	380	бахчевые (кабачки, тыква, патиссоны)	100
Крупы и бобовые	50	арбузы	500 (2)*
Овощи и бахчевые, в том числе:	430	Фрукты и ягоды, в том числе:	300
капуста белокочанная	100	виноград	200 (3)*
помидоры	120	цитрусовые	60 (4)*
морковь	50	косточковые	70 (6)*
огурцы	50	ягоды	65 (3)*
свекла	50	орехи	11
лук	40	яблоки	125
прочие овощи	75	груши	80 (3)*
Яйца	53	сухофрукты	12 (6)*
Сахар	120	Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), в том числе:	230
Картофель	470	говядина	85
Рыба и рыбопродукты	70	свинина	60
Масло растительное	40	баранина	55
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), в том числе:	1225	птица	47
молоко цельное	350	колбасы и колчености	60
масло животное, сыр, сметана	25	сало	14
творог	30	субпродукты первой категории и прочее мясо	16

\* Величины среднесуточных количеств установлены с учетом сезонности потребления продукта. В скобках приведена длительность потребления продукта в течение года в месяцах.

**203. Перечень пестицидных препаратов, содержание которых в овощах и фруктах может быть снижено в результате тщательного мытья водой**

Пестицид	Овощи, фрукты
Азинфос-метил Даконил	Груши, яблоки Арбузы, зеленый горох, томаты, сельдерей, цветная капуста
ДДТ Диклоран Каптан Карбарил	Картофель, лук, морковь Виноград, вишни, персики, сельдерей Арбузы, виноград, клубника, персики, яблоки Апельсины, арбузы, бананы, виноград, грейпфруты, кукуруза, персики
Малатион (карбофос) Перметрин Поликарбацин Тиабендазол Фенкаптон Фозалон Фосмет Фосфамид Хлорбензилат Этион	Вишни, огурцы Капуста, томаты, салат Земляника, смородина, яблоки, черешня Бананы, грейпфруты Груши, черная смородина, яблоки Яблоки Груши, сладкий картофель, яблоки Вишни, яблоки Грейпфруты Апельсины, грейпфруты, груши, огурцы

Материал взят из книг: Mott L., Snyder K. Pesticid alert. A guide to pesticides in fruits and vegetables. — San-Francisco: Sierra Club Books, 1988; Остаточное содержание пестицидов в продуктах питания/Под ред. А. И. Штенберга. — М.: Медицина, 1973.

Остаточные количества многих пестицидов в большинстве культур ниже величин, которые могут быть допущены, исходя из их биологической активности, поэтому МДУ в продуктах питания устанавливают на уровне фактического загрязнения.

Министерство здравоохранения СССР утвердило новые санитарно-гигиенические нормы максимально допустимых уровней содержания пестицидов в пищевых продуктах (СанПиН 42-123-4540—87), предельно допустимые концентрации (ПДК) пестицидов в воздухе (ГОСТ 12.1.005—88), воде, почве.

От санитарно-гигиенических норм зависят методические подходы и методологические характеристики способов определения микроколичеств пестицидов. Нижние пределы обнаружения (мг/кг, мг/л, мг/м<sup>3</sup>) методов определения остатков пестицидов не должны превышать МДУ содержания пестицидов в продуктах питания или предельно допустимые концентрации их в воде, воздухе, почве. В соответствии с ГОСТ 12.1.005—88 и ГОСТ 17.0.0.02—79 метод анализа должен обеспечить определение содержания 1/2 ПДК и менее исследуемого вещества в пробе воздуха, в воде водоемов и водостоков, имеющих питьевое и рыбохозяйственное значение.

Термин «в пищевом продукте остаточные количества не допускаются» следует понимать как «не допускается содержание остатков пестицидов выше предела обнаружения официального метода определения».

Содержание некоторых пестицидов на поверхности овощей, фруктов может быть уменьшено после очистки и тщательного мытья (табл. 203).

204. Перечень пестицидов, применение которых запрещено или строго ограничено Министерством здравоохранения СССР

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
<i>Применение запрещено</i>		
Авенж (дифензокват)	Высокая токсичность, кумулятивность	25.02.82 № 123—5/232—23
Алдрии (окталин, соединение 118)	СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество)	02.02.72
Апабазин-сульфат (неоникотин)	СДЯВ	30.03.78
Арсенат кальция	Канцероген, СДЯВ	30.03.78
Арсенат натрия	Канцероген, СДЯВ	30.03.78
Афос (ФС-УМО)	Отдаленная нейротоксичность	21.03.86
Бутифос (мерфос, фолекс, трибутилфосфат)	Эмбриотоксические и тератогенные свойства; способен вызывать острые отравления	21.03.86
Галекрон (хлордимеформ, финдал)	Канцероген	30.03.78
Гептахлор (велзикол), его смеси с гексахлорбензолом и ТМТД	Высокотоксичен, стоек, канцероген	21.03.86
Гранозан М (церезан М)	Высокотоксичен	09.11.81
Меркурбексан	Высококумулятивен	09.11.81 № 123—5/699—23
Меркурбензол	Высококумулятивен	21.03.86
ГХЦГ технический	Стойк, канцероген	21.03.86
ДДБ	Выраженное кожно-резорбтивное местно-раздражающее, эмбриотоксическое и тератогенное действие	21.03.86
ДДТ и препараты на его основе	Стойк, высококумулятивен, канцероген	1970 г.
Деспироль (элеват)	Канцероген	14.05.85
Дильдрии	СДЯВ, выраженное кожно-резорбтивное действие	—
Диурон (дихлорфининдим, кармекс) и препараты на его основе (кербмикс, керб-ультра)	Канцероген, стоек	08.05.87 № 123—9/317—23 1988 г.
Дихлорэтан	СДЯВ, летуч	21.03.86
Интраион (тнотетон, экавит, препарат М-81)	Высокотоксичен	30.03.78
ИФК (агермин, карбагран)	Канцероген	—
Калликсин (тридеморф)	Эмбриотоксическое, тератогенное действие	1977 г.
Кубовые остатки дихлорэтана, хлорвинила, метилхлорида	Препарат непостоянного состава, высокотоксичен, канцероген	21.03.86
Линурон (афалон, асалон, гарнитан, метурон)	Канцероген	21.03.86



Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Манеб (малзат, неспор)	Мутаген, тератоген, канцероген	21.03.86
Метилмеркаптофос	Высокотоксичен	21.03.86
Монолинурион (арезин, метоксимонурион)	Канцероген	26.02.86
Немагон (ДБХП, неб- ром, немафум, фумагон)	Гонадотоксическое действие	№ 123—12/204—23 1988 г. 30.03.78
Никотин-сульфат	СДЯВ	30.03.78
Нитазин	Мутагенное действие	21.03.86
Нитрохлор (нитрофен, ТОК) и препараты на его основе	Эмбриотоксическое, тератоген- ное действие	21.03.86
Октаметил (шрадан, пе- стокс)	СДЯВ	30.09.78
Парижская зелень	Канцероген	30.03.78
Пентахлорнитробензол (ПХНБ, квинтазол, квин- тицен)	Сток, высококумулятивен	21.03.86
Пентахлорфенол (пента- хлор, пенхлорол)	Кожно-резорбтивное, раздража- ющее действие, описаны от- равления работающих	—
Полихлорпиринен (ПХП, стробан, хлорцевал)	Препарат непостоянного состав- а, канцероген, стоек	09.11.81 № 123—5/699—23 Впервые 07.03.78
Рубиган (фенаримол)	Сток, гонадотоксические свой- ства	21.03.86
2,4,5-Т (диноксол, ТХФ)	Тератоген, канцероген, мутаген, содержит примеси диоксинов	1970 г.
Темик (альдикарб)	СДЯВ	21.03.86
Тюфос (паратнон, пара- тион-этил)	>	02.02.72
Труцидор, кильваль (ва- мидотион, вамидоат)	>	30.03.78
Цианплав (черный циан- нид)	>	30.03.78
Цирам (метазин, цимат, церлат, опалат)	Мутаген, канцероген, тератоген	30.03.78
Меркаптофос (деметон, систокс)	СДЯВ	02.12.67
Фенкаптон (фенотал)	Высокотоксичен	30.03.78
Морозиц	Неблагоприятные токсикологи- гигиенические свойства	16.03.87
Картекс М	То же	29.08.88
Керб микс Б	>	29.08.88
Керб ультра	>	29.08.88
Трихлорметафос-3	>	13.03.91
Фентурам	>	13.03.91
Гардона	>	13.03.91
Тедион	>	13.03.91
С-9491	>	13.03.91
Нексион	>	13.03.91

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Полихлоркамфен (ПХК)	»	13.03.91
Гамма-изомер мелкозернистый	»	13.03.90
Гамма-изомер ГХЦГ крупнозернистый	»	13.03.90
Гексахлоран, смесь с фосфоритной мукой	»	13.03.90
Акрекс (изофен)	»	13.03.90

*Сфера применения ограничена*

Афуган (пиразофос, курамил)	Запрещено использование в защищенном грунте в связи с высокой токсичностью, эмбриотоксическим и тератогенным действием	21.03.86
Изатрин (биоресметрин, биобензифуралин хриронфорте)	Запрещен для обработки салата в защищенном грунте в связи с эмбриотоксическим действием и высоким уровнем остаточных количеств	21.03.86
Беномил (бенлат, фундазол, узген), БМК (карбендазим, дерозал, олгин, фунабен)	В связи с наличием канцерогенных, мутагенных, эмбрио- и гонадотоксических свойств запрещено применение в закрытом грунте, на хлопчатнике, плодовых и овощных культурах, сое, виноградной лозе, землянике, смородине, снижены нормы расхода и кратности обработок на зерновых	1987 г.
Биоцин (болетин)	В связи с наличием в составе БМК запрещено расширение сферы применения	1981 г.
Топсин-М (тиофанатметил)	Канцероген, в процессе метаболизма образует БМК. Запрещено расширение сферы применения	1981 г.
ГХБД (перхлордивинил, гексахлорбутадиен)	Высокотоксичен, летуч, кумулятивен. Выраженное кожно-резорбтивное действие, обладает эмбриотоксическими свойствами, загрязняет подземные воды. Разрешено применение на виноградной лозе только в карантинных целях; реализация урожая запрещена	№ 21.3.87

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Гетерофос	СДЯВ, стоек. Запрещено использование на клевере в связи с накоплением в зеленой массе	25.05.84 № 123—5/649—23
ГХЦГ, 12 %-ный дуст	Запрещено применение на капусте, табаке, люцерне, картофеле, виноградной лозе, плодовых культурах	21.03.87
Децис (дельтаметрин, су- перметрин)	Высокотоксичен, стоек. Запрещено применение в защищенном грунте	25.05.84 № 123—5/649—23
ДНОК (динитроортокре- зол, динозал, дитрол)	Высокотоксичен, высококумулятивен, оказывает эмбрио- и гонадотоксическое действие. Запрещено использование в качестве гербицида	21.03.86
Дурсбан (хлорпирифос)	Высокотоксичен, стоек в окружающей среде и к термическим воздействиям. Запрещена обработка складов и прилегающих территорий	25.05.84 № 123—5/649—23
Ди-трапекс	Высокотоксичен, летуч, выраженное кожно-резорбтивное и раздражающее действие, эмбриотоксические свойства. Запрещено использование в открытом грунте (питомники земляники)	29.07.85 № 123—9/686—23
Кампозан (этрел)	Запрещено применение на арбузах	7.05.85 № 123—9/416—23
Митак (амитраз, тактик)	Видовая чувствительность, кумулятивные свойства, репродуктивная токсичность. Запрещено использование в защищенном грунте, на citrusовых, виноградной лозе (кроме маточников)	25.05.82 № 123—5/232—23
Метафос (вофатокс, ме- тилпаратион, дальф)	СДЯВ, резко выражено кожно-резорбтивное действие, оказывает тератогенное и эмбриотоксическое действие, влияет на репродуктивную функцию. Запрещено применение на капусте, патиссонах, арбузах, дынях, кабачках, шалфее мускатном, виноградной лозе (кроме маточников)	21.03.86

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Минеральные масла неф- тяные	Препарат непостоянного состава, содержит ароматические углеводороды, в связи с чем запрещен на моркови, являющейся продуктом детского и диетического питания	21.03.86
Бактороденцид ашмино- костный	Запрещено использование в защищенном грунте в связи с недостаточной изученностью	21.03.86
Нимрод (бупиримат)	Запрещено применение в защищенном грунте в связи с наличием сенсibilизирующих свойств и способностью вызывать аденомы фолликулов щитовидной железы	23.05.84 № 123—5/646—23
Полихлоркамфен (ПХК, камфехлор, токсафен)	Высокотоксичен, стоек, летуч, препарат непостоянного состава, обладает мутагенными и канцерогенными свойствами, описаны отравления людей, использование препарата разрешено только для борьбы с серым долгоносиком на сахарной свекле и защиты семенников многолетних трав	21.03.86
Пирямор (пиримикаб)	Высокотоксичен, оказывает мутагенное и анемизирующее действие, в связи с чем запрещено использование на хлопчатнике, горохе и в защищенном грунте	21.03.86
Рамрод (ацилид, нити- цид, пропахлор)	Летуч, оказывает выраженное мутагенное действие. Запрещено использование на сое	21.03.86
Реглон (дикват)	Оказывает кожно-резорбтивное, раздражающее и катарактогенное действие. Сфера применения ограничена подсолнечником, а также семенными посевами сорго, моркови, капусты, свеклы, люцерны, редиса, шалфея, парами, сенокосами	«Список... на 1986—1990 годы»
Ридеон (дифенамил, энид, ридеон, зарур)	Выраженное мутагенное действие. Запрещено применение на капусте в связи с высоким уровнем остатков в культуре	21.03.86

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Севин (карбарил)	Оказывает гонадо-, эмбриотоксическое, мутагенное действие, влияет на репродуктивную функцию, способен к образованию канцерогенного N-нитрозокарбарила. Стоек. Применение на хлопчатнике разрешено только в период вспышек размножения хлопковой совки	21.03.86
Сумицидин (фенвалерат, феэрио, педрин, белмарк)	Высокотоксичен, кумулятивен, резко выраженные раздражающие свойства, вызывает паразезии и аллергические реакции у работающих, в связи с чем применение в защищенном грунте запрещено	21.03.86
ТМГД (тирам, тиурам)	Оказывает гонадо- и эмбриотоксическое, мутагенное, тератогенное, канцерогенное действие, влияет на репродуктивную функцию, описаны отравления у работающих и рак шейки матки. Обладает аллергенными свойствами. Сфера применения строго ограничена — протравитель семян и посадочного материала	—
Тиодан (эндосульфан, эндосел, гексосульфан, циклодан, тимул)	СДЯВ, кожно-резорбтивное действие резко выражено, описаны отравления у людей. Стоек, загрязняет урожай. Запрещено применение на овощных и плодовых культурах, горохе, бобах, картофеле и расширение сферы применения	25.04.84 № 123—9/2923
Торк (вендекс, феобутатиноксид)	Стоек, загрязняет сельскохозяйственную продукцию. Запрещено применение на яблоне, citrusовых и огурцах защищенного грунта	21.03.86
Фталофос (фосмет, имидаи)	В связи с выраженным тератогенным действием сфера применения ограничена сахарной свеклой и картофелем	
Фосфамид (БИ-58, рогор, диметоат)	Высокотоксичен, оказывает кожно-резорбтивное, канцерогенное, мутагенное, эмбриотоксическое действие, в связи с чем запрещено применение на вишне, капусте и в защищенном грунте	21.03.86

Название препарата (синоним)	Причина принятия решения	Дата принятия решения
Хлорофос, 7 %-ный	Канцероген, запрещена обработка лесополос и лесных опушек	21.03.86
Хлорофос (трихлорфон, диптерекс)	Канцероген. С 1987 г. рекомендовано запретить применение в личных подсобных хозяйствах и в животноводстве	—
Тур (хлормекват, хлоромолихлорид, цекодел)	Выражена видовая чувствительность, влияние на репродуктивную функцию, гонадотоксическое действие. Запрещено использование на семенниках кормовых трав и картофеля	28.04.86 № 123—9/471—23 04.05.87 № 123—9/297—23
Цинеб (аспор, дитан)	Канцероген, мутаген, оказывает эмбрио- и гонадотоксическое действие, образует канцерогенные метаболиты (этилентиомочевина и этилентиураммоносульфид); запрещено применение на зеленом горошке и в защищенном грунте	23.05.84 № 123—5/649—23

## Приложение 6

**РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ**

Погрешность измерения концентраций вредного вещества в пробе складывается из суммы неисключенной систематической (не устраненной из результатов измерения) и случайной погрешностей.

Систематическая погрешность обусловливается погрешностями: приготовления растворов (или смесей с воздухом); прибора; построения градуировочного графика; отбора проб; измерения концентрации вредного вещества.

Источниками погрешности приготовления растворов являются погрешности чистоты реактивов, взвешивания, измерения объемов растворов. Погрешность чистоты реактивов  $\theta_1$  определяется категорией чистоты реактивов, показателем качества и содержанием основного вещества в составе реактива.

Погрешность взвешивания  $\theta_2$  определяется погрешностью аналитических весов. Например, при взвешивании навески 0,050 г на весах типа ВЛА-200 по ГОСТ 13076—69 с погрешностью, равной 0,0001 г (цена деления весов согласно выпускному аттестату), погрешность взвешивания составит, %:  $\theta_2 = 0,0001 \cdot 100 / 0,05$ .

При этом погрешность взвешивания умножают на число взвешиваний, если взвешивание проводили несколько раз.

Погрешность измерения объемов растворов определяется погрешностью химической посуды (применяемых колб, пипеток, цилиндров и т. п.). Например, погрешность измерения объема раствора в мерной колбе  $\theta_3$  вместимостью 25 мл (2-го класса) с погрешностью  $\pm 0,06$  мл согласно ГОСТ 1770—74 составит  $\theta_3 = 0,06 \cdot 100 / 25$ .

Если объем раствора измеряли пипеткой вместимостью 2 мл (2-го класса), погрешность которой равна половине цены деления  $\pm 0,010$  мл, то погрешность измерения объема раствора 1,5 мл составит  $\theta_4 = 0,010 \cdot 100/1,5$ .

Таким образом, погрешность приготовления растворов  $\theta_{пр}$  рассчитывают по формуле

$$\theta_{пр} = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2 + \theta_4^2}.$$

Если для измерения концентраций вредного вещества в воздухе используют не растворы, а смеси вредных веществ с воздухом, то погрешность приготовления градуировочных смесей обуславливается погрешностью дозирующего устройства или динамической установки, определяемой расчетным методом или в сравнении с другим методом, погрешность которого известна. При расчетах используют значение максимальной погрешности приготовления смесей.

Погрешность прибора  $\theta_{п}$  определяют его классом в соответствии с научно-технической документацией на прибор. Погрешность газового хроматографа определяют по экспериментальным данным с применением градуировочных растворов или градуировочных смесей вредных веществ с воздухом.

Погрешность построения градуировочного графика  $\theta_{г}$  рассчитывают, исходя из экспериментальных данных по всему интервалу концентраций в 5—10 точках, проводя по 6 измерений в каждой точке.

Из погрешностей всего интервала концентраций выбирают максимальное значение, которое принимают за погрешность градуировочного графика. Грубые погрешности измерений исключают в соответствии с ГОСТ 11.002—73.

Источниками систематической погрешности этапа отбора проб воздуха являются погрешности измерения объема воздуха, температуры, давления; погрешности проскака и уноса вещества; погрешность влияния сопутствующих веществ; погрешность хранения отобранных проб воздуха.

Погрешность измерения объема отобранного для анализа воздуха  $\theta_{в}$  определяется погрешностью аспирационного устройства в соответствии с документацией.

Погрешность измерения температуры  $\theta_{т}$  рассчитывают, исходя из погрешности (класса) термометра, или определяют, как половину цены деления термометра. Например, при погрешности термометра  $\pm 0,5$  °C и температуре 20 °C  $\theta_{т} = 0,5 \cdot 100/(273+t) = 0,5 \cdot 100/293$ .

Погрешность измерения атмосферного давления  $\theta_{р}$  рассчитывают, исходя из погрешности (класса) барометра, или определяют, как половину цены деления барометра. Например, при погрешности барометра  $\pm 0,065$  кПа и давлении 101,3 кПа  $\theta_{р} = 0,065 \cdot 100/101,3$ .

Погрешность уноса, проскака вещества  $\theta_{ун}$  из поглотительных сосудов, с фильтров и из других устройств определяют экспериментально при соответствующих объемных расходах путем применения дополнительных проб-отборных устройств. Максимальные из найденных в дополнительных устройствах значения концентраций принимают за погрешность уноса  $\theta_{ун}$ .

Погрешность измерения концентраций за счет длительности хранения (вследствие разложения химического вещества, его реакций, сорбции вещества стенками сосудов, шприцев, негерметичных емкостей и др.) отобранной пробы воздуха  $\theta_{хр}$  (в пределах времени, указанного в методике) определяют как разность между концентрацией  $C_0$  при времени хранения  $t=0$  и концентрацией  $C_t$ , найденной при времени хранения  $t$ , допустимым по методике  $\theta_{хр} = (C_0 - C_t) \cdot 100/C_0$ .

Погрешность измерения концентраций за счет влияния сопутствующих веществ  $\theta_{св}$  определяется как разность между концентрацией, найденной без сопутствующих веществ  $C_0$ , и концентрацией  $C_t$  в их присутствии  $\theta_{св} = (C_0 - C_{св}) \cdot 100/C_0$ .

Таким образом, погрешность этапа отбора проб воздуха рассчитывают по формуле

$$\Theta_{отб} = \sqrt{\Theta_v^2 + \Theta_l^2 + \Theta_p^2 + \Theta_{н^2} + \Theta_{хр^2} + \Theta_{ст^2}}$$

Источником систематической погрешности после этапа отбора проб является этап измерения концентраций  $\Theta_{изм}$ . Для отобранных проб  $\Theta_{изм}$  обуславливают: погрешность измерения объема раствора отобранной пробы, доведение до метки в мерной посуде, измерение при помощи цилиндров и т. п.—  $\Theta_5$ ; погрешность проведения предварительных операций по обработке отобранной пробы (фильтрование, кипячение, сжигание, растворение, экстрагирование и т. п.)—  $\Theta_6$ ; погрешность измерения аналитических сигналов (оптическая плотность, высота волны, высота и площадь хроматографических пиков)—  $\Theta_{сигн}$ . Погрешность измерения объема  $\Theta_5$  рассчитывают аналогично  $\Theta_3$  или  $\Theta_4$ . Погрешность проведения предварительных операций по обработке пробы  $\Theta_6$  определяют аналогично  $\Theta_{хр}$ . Погрешности измерения аналитических сигналов  $\Theta_{сигн}$ , например, при измерении оптических плотностей растворов рассчитывают путем оценки среднего квадратического отклонения результатов измерений одного и того же раствора в диапазоне градуировочного графика. Таким образом, систематическую погрешность измерения концентраций  $\Theta_{изм}$  рассчитывают по формуле

$$\Theta_{изм} = \sqrt{\Theta_5^2 + \Theta_6^2 + \Theta_{сигн}^2}$$

Неисключенные остатки систематической погрешности измерений рассчитывают по формуле

$$\Theta_i = \sqrt{\Theta_{пр^2} + \Theta_{ст^2} + \Theta_{г^2} + \Theta_{отб^2} + \Theta_{изм^2}}$$

Границы (без учета знака) суммы неисключенных остатков систематических погрешностей измерений  $\Theta$  рассчитывают с использованием всех ее составляющих по формуле

$$\Theta = K \sqrt{\sum \Theta_i^2}$$

где  $K$  — коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью, равный 1,1, при доверительной вероятности 0,95.

Случайная составляющая погрешности измерения концентраций вредных веществ определяется на основании 5—10 наблюдений (параллельных измерений) при постоянной концентрации вредного вещества в градуировочном растворе или в градуировочной смеси с воздухом. Результаты наблюдений заносят в таблицу (в качестве примера приведена табл. 205).

### 205. Расчет составляющей погрешности измерения

Номер наблюдения $n$	Концентрация вредного вещества, мкг/мг или мг/м <sup>3</sup>	Среднее арифметическое $\bar{C}$	$\Delta C_i = C_i - \bar{C}$	$(\Delta C_i)^2$	$S$
1	11,15	10,74	0,41	0,1681	0,245
2	10,80		0,06	0,0036	
3	10,50		0,24	0,0576	
4	10,60		0,14	0,0196	
5	10,65		0,09	0,0081	

$$\sum_{i=1}^n (\Delta C_i)^2 = 2570$$



Среднее квадратическое отклонение группы результатов наблюдений  $S$  вычисляют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta C_i)^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{0,2570}{(5-1)}} = \sqrt{0,06008} = 0,245$$

Находят относительное среднее квадратическое отклонение результата измерения

$$S_{\bar{C}} = 100S/\sqrt{n}\bar{C} = 0,245 \cdot 100/\sqrt{5} \cdot 10,74 = 24,50/24,05 = 1,01\%$$

где  $n$  — число измерений, указанных в методике (не менее 5), которое определяют, исходя из погрешности результатов измерения.

Значения  $S$  и  $S_{\bar{C}}$  определяют не менее чем в 3—5 точках по всему диапазону концентраций и выбирают для расчета максимальные значения.

Доверительные границы (без учета знака) случайной погрешности результата измерения находят по формуле

$$e = tS_{\bar{C}}$$

где  $t$  — коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной вероятности  $P$  и числа результатов наблюдений находят по таблице справочного приложения ГОСТ 8.207—76.

В методике измерения концентраций вредных веществ в воздухе должны быть отражены требования к случайной составляющей погрешности измерения.

Суммарную погрешность  $\Delta$  результата измерения концентраций вредных веществ рассчитывают на основании данных оценки систематической  $\theta$  и случайной  $S_{\bar{C}}$  составляющих погрешности, определяя отношение  $\theta/S_{\bar{C}}$  согласно ГОСТ 8.207—76.

Если  $\theta/S_{\bar{C}} < 0,8$ , то неисключенными систематическими погрешностями пренебрегают и принимают границу суммарной погрешности, равной случайной, т. е.  $\Delta/S_{\bar{C}}$ .

Если  $\theta/S_{\bar{C}} > 8$ , то пренебрегают случайными погрешностями и принимают границу суммарной погрешности, равной систематической, т. е.  $\Delta = \theta$ .

Если  $8 > \theta/S_{\bar{C}} > 0,8$ , то границу суммарной погрешности результата измерения (без учета знака) находят по формуле

$$\Delta = KS_{\Sigma}$$

где  $K$  — коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешности;  $S_{\Sigma}$  — оценка суммарного квадратического результата измерения, вычисляемая по формуле

$$S_{\Sigma} = \sqrt{\sum (\theta_i)^2/3 + S_{\bar{C}}^2}$$

где  $\sum (\theta_i)^2/3 = (\theta_{\text{пр}})^2/3 + (\theta_{\text{п}})^2/3 + (\theta_{\text{г}})^2/3 + (\theta_{\text{отг}})^2/3 + (\theta_{\text{изм}})^2/3$ .

Коэффициент  $K$  вычисляют по формуле

$$K = (e + \theta) / \{S_{\bar{C}} + \sqrt{\sum (\theta_i)^2/3}\}$$

Суммарную погрешность  $\Delta$  измерения концентраций вредных веществ в воздухе следует рассчитывать по всему интервалу концентраций не менее чем в 3—5 точках.

Результаты измерения концентрации вредного вещества  $C$  в воздухе представляют в форме  $C \pm \Delta$  при определенной величине  $p$  (например,  $2,5 \text{ мг/м}^3 \pm 1,7\%$ , при доверительной вероятности  $p = 0,95$ ).

При числе результатов наблюдений  $h \leq 15$  принадлежность их к нормальному распределению не проверяют.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИНАМИКИ ПЕСТИЦИДОВ		Шифр _____			УКДП-1	
I	Год: 19 _____ Адрес _____	Препарат _____	Почва (тип) _____		Культура _____	
	Лаборатория: _____	_____	_____		_____	
	Вид опыта _____	Изучаемые факторы: 1) доза препарата _____ 7) условия хранения проб _____ 2) форма препарата _____ 8) температура _____ 3) способ внесения _____ 9) влажность _____ 4) тип почвы _____ 10) метаболизм _____ 5) глубина слоя _____ 11) влияние других химических средств _____ 6) вид растительной пробы _____				
	Длительность опыта по годам: а) применение пестицида _____ б) изучение динамики _____					
II	1. Форма препарата в % д.в. в препарате _____					
	2. Способ обработки _____					
	3. Сроки и дозы применения пестицида _____					
		Показатель	Обработки или дозы			
			первая	вторая	третья	четвертая
3.1	Доза, кг/га д.в.					
3.2	Дата обработки					
3.3	Интервал от посева (посадки) культуры до обработки, сут					

3.4	Интервал между предыдущей и настоящей обработкой (для многократных обработок), сут						
3.5	Фаза развития растения в период обработки						
4. Параллельное применение других химических средств _____							
III	1. Сведения об опытном участке _____				УКДП- 2		
	2. Площадь опытного участка _____						
	3. Площадь опытной и учетной делалок _____						
	4. Повторность опыта _____						
	5. Культура, сорт _____						
	6. Предшественник _____						
	7. Схемз севооборота _____						
	8. Глубина пахотного слоя, см _____						
	9. Орошение, норма полива, м <sup>3</sup> /га _____						
	10. Механические обработки почвы _____						
IV	1. Тип, подтип почвы _____						
	2. Гранулометрический состав _____						
	3. Агрохимическая характеристика						
	рН водное солевое	Гумус, %	Плотность, г/см <sup>3</sup>	Кислотность		Сумма поглощенных оснований	Содержание, мг/кг
			гидролитическая	обменная		подвижного P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	подвижного K <sub>2</sub> O
			мг экв. на 100 г почвы				

V	Показатель и вид итогового значе- ния по месяцам и декадам	Значения показателя по месяцам I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Итоговые значения по месяцам				Значения пока- зателя по дека- дам (с указанием месяца и декады)						Итоговые значения по дека- дам							
			I-XII		V-IX															
			т.г.	с.м.	т.г.	с.м.														
	1. Сумма осадков, мм (суммар- ное)																			
	2. Температура воздуха, °С (среднее)																			
	3. Относительная влажность воздуха, % (среднее)																			
	4. Продолжитель- ность солнеч- ного сияния, ч (суммарное)																			
	5. Температура почвы, °С, на глубине (сред- нее) 5 см 20 см																			



## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

---

- Абат 59, 66, 78, 90(2)  
— биосреды 90(2)  
— ГЖХ 66  
— грудное молоко 90(2)  
— систематический ход анализа 90(2)  
— ТСХ 66, 90(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Авадекс БВ (см. Триаллат)  
Азипротрин 54(2)  
— ГЖХ 54(2)  
— молоко 54(2)  
Акрекс 221, 90(2)  
— биосреды 221, 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 221, 90(2)  
Актеллик 59, 66, 78, 91, 74(2), 157(2)  
— воздух рабочей зоны 157(2)  
— ГЖХ 59, 66, 91, 74(2)  
— систематический ход анализа 74(2)  
— томаты 74(2)  
— ТСХ 59, 66, 74(2), 157(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
— чай 91  
Аланат 252  
— вода 252  
— огурцы 252  
— почва 252  
— ТСХ 252  
Алар 108, 159(2)  
— вода 108  
— воздух рабочей зоны 108  
— растительный материал 108  
— свекла 108  
— томаты 108  
— фотометрический метод 159(2)  
— яблоки 108  
Алахлор (см. Лассо)  
Алкилирование 163, 166, 262, 277, 289, 290, 342, 354, 410, 417, 437, 446, 525, 13(2), 40(2), 88(2), 95(2), 187(2), 208(2), 236(2)  
— бутиловым спиртом 342  
— гептафтормасляным ангидридом 289, 290, 410 417, 446  
— диазометаном 163, 294, 347, 13(2), 40(2), 88(2) 187(2)  
— диметилсульфатом 13(2), 95(2)  
— йодистым метилом с диметилсульфоксидом 437  
— пентафторбензилбромидом 166  
— трифторидом бора в метаноле 208(2), 236(2)  
— 3-трифторметокси-2,2,3,3-тетрафторпропионовым ангидридом 417  
— 2,2,2-трихлорэтанолом 354  
— уксусным ангидридом 262, 9(2)  
— этиловым спиртом 277, 342  
Альдикарб 362  
— вода 362  
— ГЖХ 362  
— почва 362  
— растительный материал 362  
— ТСХ 362  
Альдикарб сульфоксид 362

Примечание. Без скобок приведены страницы первого тома, в скобках — второго.

- вода 362
- ГЖХ 362
- почва 362
- растительный материал 362
- ТСХ 362
- Альдикарб сульфид 362**
- вода 362
- ГЖХ 362
- почва 362
- растительный материал 362
- ТСХ 362
- Альдрин 11**
- вода 11
- ГЖХ 11
- ТСХ 11
- Альфамертин (см. Фастак)**
- Амбуш 296, 251(2)**
- вода 296
- воздух рабочей зоны 251(2)
- ГЖХ 296, 251(2)
- почва 296
- растения 296
- ТСХ 296, 251(2)
- см. Перметрин
- Аметрин 54(2), 298(2)**
- воздух рабочей зоны 298(2)
- ГЖХ 54(2), 298(2)
- молоко 54(2)
- ТСХ 298(2)
- Амiben 254**
- почва 254
- ТСХ 254
- 4-амино-1,2,3-триазол (см. АТГ)**
- 4-амино-1,2,4-триазол фосфорно-кислая соль (см. АТГ-Ф)**
- Амифос (см. Амифос)**
- Амитраз (см. Митак)**
- Амифос 59**
- ГЖХ 59
- ТСХ 59
- унифицированный метод 59
- Анема (см. ДД)**
- Анометрин 161(2)**
- воздух рабочей зоны 161
- ГЖХ 161
- ТСХ 161
- Антибиотики 108(2), 137(2), 138(2), 140(2)**
- Антио 59, 66, 78, 90(2)**
- биосреды 90(2)
- ГЖХ 59, 66
- грудное молоко 90(2)
- ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- Аполло 3(2)**
- вода 3(2)
- ГЖХ 4(2)
- плодовые культуры 3(2)
- почва 4(2)
- ТСХ 5(2)
- Апплауд 5(2)**
- вода 6(2)
- ГЖХ 5(2)
- почва 6(2)
- растительный материал 6(2)
- Арезин 410, 420**
- вода 410, 420
- ГЖХ 410
- овощи 420
- почва 410, 420
- ТСХ 420
- Арезина метаболит 410**
- вода 410
- ГЖХ 410
- АСА-1 (см. Фоспинол)**
- Асана (см. Суми-альфа)**
- АТГ 449, 184(2)**
- биологический материал 449
- вода 449
- воздух рабочей зоны 184(2)
- почва 449
- растительный материал 449
- ТСХ 449, 184(2)
- АТГ-ф 449, 184(2)**
- биологический материал 449
- вода 449
- воздух рабочей зоны 184(2)
- почва 449
- растительный материал 449
- ТСХ 449
- Атразин 7(2), 54(2), 57(2), 84(2)**

- вода 57(2), 84(2)
- ГЖХ 54(2), 84(2)
- зеленая масса 7(2)
- зерно кукурузы 7(2), 57(2)
- почва 57(2), 84(2)
- растения 84(2)
- соя 7(2)
- ТСХ 7(2)
- Афос 59
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
  - хромато-ферментный метод 78
- Афуган 59, 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - ГЖХ 59, 66
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
- Ацетал 256
  - вода 256
  - ГЖХ 256
  - зеленая масса кукурузы, сои 256
  - зерно 256
  - картофель 256
  - почва 256
  - ТСХ 256
- Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир 324(2)
  - воздух рабочей зоны 324(2)
  - ТСХ 324(2)
- Ацетоуксусный эфир (см. Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир)
- Ацетохлор (см. Ацетал)
- Ацефат 59
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
  - хромато-ферментный метод 78
  - см. также Ортен
- Ацифлуорофен (см. Блазер)
- Б**
- Базагран 10(2), 12(2)
  - вода 11
  - ГЖХ 11, 12
  - рыба 14
  - ТСХ 14
- эфирные масла 13
- см. также бентазон
- Базудин 59, 86, 91, 94, 74(2), 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - ГЖХ 59, 66, 86, 91, 94
  - грудное молоко 90(2)
  - табак 86, 94
  - систематический ход анализа 74(2)
  - томаты 74(2)
  - ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- Байлетон 453, 460, 100(2), 163(2)
  - виноград 460
  - вода 453, 460
  - ГЖХ 453
  - картофель 453, 460
  - лекарственные растения 453, 460
  - персики 460
  - почва 453, 460
  - пшеница (зерно, зеленая масса) 453, 460, 100(2)
  - сельхозпродукция 453
  - томаты 460
  - ТСХ 453, 460, 100(2), 163(2)
- Байтан 453, 468, 163(2)
  - вода 453, 468
  - воздух рабочей зоны 163(2)
  - ГЖХ 453, 468
  - зерно 468
  - почва 453, 468
  - сельхозпродукция 453
  - ТСХ 453, 468, 163(2)
- Байтан-универсал 468
  - вода 468
  - ГЖХ 468
  - зерно 468
  - почва 468
  - ТСХ 468
- Байтекс 59, 66, 78, 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - ГЖХ 59, 66
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 59, 66, 90(2)
  - унифицированный метод 59



- хромато-ферментный метод 78
- Бактерицидные инсектициды 115(2)
- Бактокумид 108(2)
- Бактороденцид 109(2)
- Бакуловирусы 134(2)
  - воздух рабочей зоны 134
  - иммунофлюоресцентный метод 134
  - см. также Вирус ядерного поли-эдроза
- Банкол 190
  - вода 190
  - картофель 190
  - ТСХ 190
- Барбан (см. Карбин)
- Баррикад (см. Рипкорд)
- Бацилихин (см. Бацитрацин)
- Бациллы цереус 112(2)
- Бациллы сутилис 109(2)
- Бациллы турингиенсис 108(2), 109(2), 111(2)
  - воздух рабочей зоны 111(2)
  - пищевые продукты 111(2)
  - почва 110(2)
  - растения 111(2)
- Бацитрацин 138(2)
  - бумажная хроматография 138(2)
  - воздух рабочей зоны 138(2)
- Бензоксазолон 310(2)
  - воздух рабочей зоны 310(2)
  - ТСХ 310(2)
- Бензоксимат (см. Цитразон)
- Бензомат (см. Цитразон)
- Бензофосфат (см. Фозалон)
- Бенлат 477
  - вино 477
  - вода 477
  - почва 477
  - растительные объекты 477
  - ТСХ 477
  - см. также Беномил
- Беномил 472, 80(2), 97(2), 164(2)
  - вода 472
  - воздух рабочей зоны 164(2)
  - ГЖХ 80(2)
  - плодово-овощные культуры 80(2)
  - почва 472
- полярнографический метод 472
- растения 472
- сахарная свекла 97(2)
- ТСХ 164, 80(2), 97(2)
- хроматофотометрический метод 164(2)
  - см. также Бенлат
- Бенгазон 167(2)
  - воздух рабочей зоны 167(2)
  - ТСХ 167
  - см. также Базагран
- Бетанал 368, 83(2), 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - вода 368, 84(2)
  - ГЖХ 368, 84(2)
  - грудное молоко 90(2)
  - почва 368, 84(2)
  - растения 84(2)
  - сахарная свекла 368
  - ТСХ 90(2)
  - см. также Фенмедифам
- Бетанекс (см. Десмедифам)
- Би-58 (см. Фосфамид)
- Биопрепараты 107, 111
- Биоресметрин 169(2)
  - воздух рабочей зоны 169(2)
  - ТСХ 169(2)
- Биотоксибациллин 115(2)
  - ВЭЖХ 116
  - определение  $\beta$ -экзотоксина 115(2)
- Бип 111
  - воздух рабочей зоны 111(2)
  - пищевые продукты 111(2)
  - почва 111(2)
  - растения 111
- Бирлан 59
  - ГЖХ 59, 66
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
- Бисхлорфентезин (см. Аполло)
- Битоксибациллин 111(2)
  - воздух рабочей зоны 111(2)
  - пищевые продукты 111(2)
  - почва 111(2)
  - растения 111(2)

- Бладекс (см. Симазин)  
 Блазер 223, 171(2)  
 — вода 223  
 — воздух рабочей зоны 171(2)  
 — зеленая масса растений 223  
 — почва 223  
 — соя 223  
 — ТСХ 223, 171(2)  
 Бластцидин 110  
 БМК 438, 440, 472, 477, 80(2), 97(2), 164(2)  
 — вино 477  
 — вода 472, 477  
 — воздух рабочей зоны 164  
 — ГЖХ 80(2)  
 — метаболит токсина М 438  
 — персики 438, 440  
 — плодово-овощные культуры 80(2)  
 — полярографический метод 472  
 — почва 72, 477  
 — растения 472, 477  
 — сахарная свекла 97(2)  
 — ТСХ 438, 440, 477, 80(2), 97(2)  
 — хроматофотометрический метод 164(2)  
 Ботран 192  
 — вода 192  
 — ГЖХ 192  
 — почва 192  
 — растительная продукция 192  
 — ТСХ 192  
 Бромдиоксолол 204(2)  
 — воздух рабочей зоны 204(2)  
 — ГЖХ 204(2)  
 Бромирование 88(2), 213(2), 368  
 Бромоксилин 261  
 — вода 261  
 — ГЖХ 261  
 — почва 261  
 — растительный материал 261  
 Бромпропилат (см. Неорон)  
 Бромфос 59  
 — ГЖХ 59, 66  
 — ТСХ 59, 66  
 — унифицированный метод 59  
 — хромато-ферментный метод 78  
 Бронокот 172  
 — воздух рабочей зоны 172  
 — фотометрический метод 172  
 Бронопол (см. Бронокот)  
 Бупрофезин (см. Апплауд)  
 Бутизан 263  
 — капуста 262  
 — рапс 263  
 — репа 263  
 — ТСХ 263  
 — турнепс 263  
 Бутилат (см. Сутан)  
 Бутилкаптакс 480, 485, 174(2)  
 — вода 480, 485  
 — воздух рабочей зоны 174(2)  
 — ГЖХ 485, 174(2)  
 — почва 485  
 — растительный материал 485  
 — семена хлопка 480  
 — ТСХ 174  
 — фотометрический метод 480  
 — хлопковое масло 480  
 2-Бутилтиобензотриазол (см. Бутил-  
 пактакс)  
 Бутифос 97  
 — ТСХ 97  
 — хлопковая шелуха 97  
 Бутоксон — эфир (см. 2,4-ДМ бутило-  
 вый эфир)  
 Бутонат (см. Трибуфон)  
 Бутразин 177(2)  
 — воздух рабочей зоны 177(2)  
 — ГЖХ 177(2)  
**В**  
 Валексон 59, 90(2)  
 — биосубстраты 90(2)  
 — ГЖХ 59, 66  
 — грудное молоко 59, 66  
 — ТСХ 59, 66  
 — унифицированный метод 59  
 — хромато-ферментный метод 78  
 — см. также Фоксим  
 Варфарин (см. Зоокумарин)  
 Вернам 388, 90(2)  
 — биосубстраты 388, 90(2)  
 — вода 388

- воздух рабочей зоны 388
- ГЖХ 388
- грудное молоко 90(2)
- растительный материал 388
- ТСХ 90(2)
- см. также Вернолат
- Вернолат 288(2)
- воздух рабочей зоны 288(2)
- ТСХ 288(2)
- см. также Вернам
- Версамид стеариновой кислоты 178(2)
- воздух рабочей зоны 178
- ТСХ 178
- Видат 370
- вода 370
- почва 370
- растительный материал 370
- ТСХ 370
- Виджил 487
- вода 487
- ГЖХ 487
- почва 487
- растительный материал 487
- ТСХ 487
- Вириин-АББ 135(2)
- Вириин-ГЯП 122(2), 135(2)
- воздух рабочей зоны 135(2)
- иммунофлюоресцентный метод 122(2), 135(2)
- растения 122(2)
- Вириин-диприон 119(2), 135(2)
- воздух рабочей зоны 135(2)
- иммунофлюоресцентный метод 119(2), 135(2)
- растительные объекты 119(2)
- Вириин — КШ 124(2), 135(2)
- воздух рабочей зоны 135(2)
- иммуноферментный метод 124(2), 135(2)
- растения 124(2)
- Вириин-ЭКС 127(2), 135(2)
- воздух рабочей зоны 127(2)
- иммунофлюоресцентный метод 127(2), 135(2)
- растительные объекты 127(2)
- Вириин-ЭНШ 130(2), 135(2)
- вода 130(2)
- воздух рабочей зоны 130(2)
- иммунофлюоресцентный метод 130(2), 135(2)
- почва 130(2)
- растительные объекты 130(2)
- Вирииноны 108(2), 129(2)
- Вирусные инсектициды 108(2), 127(2), 130(2)
- Вирус ядерного полиэдроза — ВЯП 119(2), 120(2), 122(2), 124(2), 127(2), 130(2)
- Витавакс 16(2)
- вода 18(2)
- зерно 18(2)
- ТСХ 16(2)
- Вофатокс (см. Метифос)
- ВСК (см. Версамид стеариновой кислоты)
- ВЯП вирус ядерного полиэдроза 119(2), 120(2), 112(2), 122(2), 130(2)
- Г**
- Газаран (см. Метопротрин)
- Галоксифоп-этоксизтил (см. Зеллек)
- Гаметана фторбензиловое производное 165—167
- Гардона 59
- ГЖХ 59, 66
- ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- Гауксин 109
- Гебутокс (см. Диносеб)
- Гезагард (см. Прометрин)
- Гезалакс (см. Аметрин)
- Гезаран 298(2)
- воздух рабочей зоны 298(2)
- ГЖХ 298(2)
- ТСХ 298(2)
- Гексатназокс (см. Ниссоран)
- Гексахлорбензол 19, 193(2)
- биосубстраты 19
- воздух рабочей зоны 193(2)
- ГЖХ 19, 193(2)

- Гексахлорпаракилол 189  
Гемазин (см. Пропазин)  
Гемаган (см. ЭФ-34)  
Гептахлор 11  
— вода 11  
— ГЖХ 11  
— ТСХ 11  
Гептенофос (см. Хостаквик)  
Гетерофос 59, 86, 94, 99, 101  
— биосубстраты 99  
— ГЖХ 59, 66, 86, 94, 99, 101  
— лаванда 99  
— молоко 99  
— табак 86, 94  
— ТСХ 59, 66  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
— яйца 99  
Гетерофоса метаболиты 101  
— биоматериал 101  
— ГЖХ 101  
— молоко 101  
— яйца 101  
Гербадокс (см. Стомп)  
Гиббереллин А<sub>3</sub> (см. Гибберсиб)  
Гибберсиб 265  
— баклажаны 265  
— виноград 265  
— горох 265  
— кабачки 265  
— капуста 265  
— картофель 265  
— лук 265  
— огурцы 265  
— хроматофотометрический метод 265  
— фасоль 265  
— чеснок 265  
Гидразид маленновой кислоты 108, 20(2)  
— вода 108  
— растительные объекты 108  
— свекла 108  
— табак 20(2)  
— томаты 108  
— спектрофотометрический метод 108, 20(2)  
Гидрел 108, 111, 160  
— вода 108, 111  
— ГЖХ 111, 160  
— зерно злаков 160  
— огурцы 160  
— свекла 108  
— семена хлопчатника 160  
— спектрофотометрический метод 108  
— томаты 108, 160  
— хлопковое масло 160  
— яблоки 108, 160  
Глини 426, 430, 180(2)  
Гликофен (см. Ровраль)  
— вода 430  
— воздух рабочей зоны 180(2)  
— ВЭЖХ 426  
— ГЖХ 180(2)  
— зерно 426  
— иммуноферментный метод 430  
— полость льна 426  
— почва 430  
— растительные объекты 430  
— семена льна 426  
— ТСХ 180(2)  
Глифосат 182(2)  
— воздух рабочей зоны 182(2)  
— ТСХ 182(2)  
— см. также Раундап  
Глифосин 182(2)  
— воздух рабочей зоны 182(2)  
— ТСХ 182(2)  
Глифосина тетраметилловый эфир 285(2)  
— воздух рабочей зоны 285(2)  
— ТСХ 285  
Глифтор 226  
— органы, ткани животных 226  
— фотометрический метод 226  
Глицин 182(2)  
— воздух рабочей зоны 182  
— ТСХ 182  
ГМДИ 491, 184(2)  
— вода 491  
— воздух рабочей зоны 184  
— почва 491

- растительные объекты 491
- ТСХ 491, 184(2)
- ГМК (см. Гидразид малеиновой кислоты)
- ГМП 491, 184(2)
  - вода 491
  - воздух рабочей зоны 184(2)
  - почва 491
  - растительные объекты 491
  - ТСХ 491, 184(2)
- Гоал 229, 232
  - вода 229
  - ГЖХ 232
  - почва 229, 232
  - растения 229
  - ТСХ 229
  - эфирное масло 232
  - эфиромасличные растения 232
- Голтикс 23(2)
  - вода 23
  - почва 23
  - растения 23
  - ТСХ 23
- Гомелин 108(2), 111(2)
  - воздух рабочей зоны 111(2)
  - пищевые продукты 111(2)
  - почва 111(2)
  - растения 111(2)
- Гормоны 107, 110
- Грибы
  - Ашерсония 109(2)
  - Боверин 109(2)
  - Верциллин 109(2)
    - микроскопические 109(2)
    - энтомопатогенные 109(2)
    - энтомофтора 118(2)
- Гризин 140(2)
  - воздух рабочей зоны 140(2)
  - метод агар-диффузионный 140(2)
- ГХЦГ, сумма изомеров 25, 28, 149(2), 155(2), 193(2)
  - воздух рабочей зоны 193(2)
  - ГЖХ, 25, 193(2)
  - гуза-пая 25
  - изучение динамики 153(2), 155(2)
  - ТСХ 25, 28
- хлопковая шелуха 28
- α-ГХЦГ 11, 19, 30, 38
  - биосубстраты 19, 30
  - вода 11
  - ГЖХ 11, 19, 38
  - грязи илово-сульфидные 38
  - ТСХ 11, 30
- β-ГХЦГ 19, 30
  - биосубстраты 19, 30
  - ГЖХ 19
  - ТСХ 30
- γ-ГХЦГ 30, 38, 197(2)
  - биосубстраты 11, 30
  - вода 11
  - воздух рабочей зоны 197(2)
  - ГЖХ 11, 38, 197(2)
  - грязи илово-сульфидные 38
  - ТСХ 11, 30, 197(2)
- δ-ГХЦГ 19, 30
  - биосубстраты 19, 30
  - ГЖХ 19
  - ТСХ 30
- 2,4-Д 339, 83(2), 94(2), 186(2)
  - вода 83(2)
  - воздух рабочей зоны 186(2)
  - ГЖХ 339, 83(2), 94(2), 186(2)
  - почва 339, 83(2)
  - производные 94(2)
  - растения 83(2)
  - ТСХ 94
- 2,4-Д аминная соль 339
  - ГЖХ 339
  - почва 339

## Д

- ДАЕР (см. Амифос)
- ДАК (см. Дактал)
- Даконил 268
  - вода 268
  - ГЖХ 268
  - почва 268
  - растительные продукты 268
  - ТСХ 268
- Дактал 271, 189(2)
  - воздух рабочей зоны 189(2)
  - ГЖХ 271, 189(2)

- эфирные масла 271
- Далалон 273, 276
- виноград 273
- вода 273
- ГЖХ 276
- морковь 273
- почва 273
- семена хлопка 273
- ТСХ 273
- эфирные масла 276
- Даминозид (см. Алар)
- Данитол 301, 192(2), 254(2)
- вода 301
- воздух рабочей зоны 192(2), 254(2)
- ГЖХ 301, 192(2), 254(2)
- почва 301
- растения 301
- ТСХ 301, 254
- Даурелдан (см. Релдан)
- ДД 42, 44
- вода 42
- ГЖХ 42, 44
- почва 44
- ДДБ 44
- ГЖХ 44
- почва 44
- ДДВФ 59, 123, 74(2), 90(2), 153(2)
- биосубстраты 90(2)
- ГЖХ 59, 66, 123, 74(2)
- изучение динамики 74(2)
- молоко 90(2)
- томаты (систематический ход анализа) 74(2)
- ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- ДДД 11, 25, 28, 193(2)
- вода 11
- воздух рабочей зоны 193(2)
- ГЖХ 11, 25, 193(2)
- гуза-пая 25
- ТСХ 11, 25, 28
- шелуха хлопка 28
- 2,4-ДП (см. 2,4-Дихлорфеноксипропионовая кислота)
- ДДТ 11, 25, 28, 38, 193(2)
- вода 11
- воздух рабочей зоны 193(2)
- ГЖХ 11, 25, 38, 193(2)
- грязи илово-сульфидные 38
- гуза-пая 25
- ТСХ 11, 25, 28
- шелуха хлопка 28
- ДДЭ 11, 19, 25, 28, 38, 193(2)
- биосубстраты 19
- вода 11
- воздух рабочей зоны 193(2)
- ГЖХ 11, 19, 25, 38, 193(2)
- гуза-пая 25
- ТСХ 11, 25, 28
- шелуха хлопка 28
- Девринол 278, 281
- ГЖХ 278
- почва 278
- растения 278
- семена подсолнечника 281
- ТСХ 281
- эфирные масла 278
- Декаметрин (см. Децис)
- Декстрамин 195(2)
- воздух рабочей зоны 195(2)
- ТСХ 195(2)
- Декстрел 111
- вода 111
- ГЖХ 111
- почва 111
- растения 111
- Дельтаметрин (см. Децис)
- Дельтанит (см. Промет)
- Дендробациллин 108(2)
- Десмедифам 400
- вода 400
- ТСХ 400
- Десметрин 54(2), 57(2)
- вода 57(2)
- ГЖХ 54(2), 57(2)
- зерно кукурузы 57(2)
- молоко 54(2)
- почва 57(2)
- Децис 296, 301, 251(2)
- вода 296, 301

- воздух рабочей зоны 251(2)
- ГЖХ 296, 301, 251(2)
- почва 296, 301
- растения 296, 301
- ТСХ 296, 301, 252(2)
- Диазинон 117, 197(2)
- биосубстраты 117
- воздух рабочей зоны 97(2)
- ГЖХ 117, 197(2)
- ТСХ 117, 197
- см. также Базудин
- Диазометан 62, 294, 347, 13(2), 86(2)
- получение из:
- гидразингидрата и метанола 13(2), 86(2)
- нитрозометилмочевины 162, 294, 347
- Дибром 59, 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- ГЖХ 59, 66
- грудное молоко 90(2)
- ТСХ 59, 66, 90(2)
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- Дигидрел 108, 111, 160
- вода 108, 111
- ГЖХ 111, 160
- зерно злаков 160
- растения 108, 111
- семена хлопчатника 160
- свекла 108
- спектрофотометрический метод 108
- томаты 108, 160
- хлопковое масло 160
- яблоки 160
- Дигидрогептахлор (см. Дилор)
- Дикамба 83(2)
- вода 83(2)
- ГЖХ 83(2)
- почва 83(2)
- растения 83(2)
- Дикват 24(2), 26(2), 28(2)
- вода 26(2)
- молоко 28(2)
- рыба 26(2)
- семена подсолнечника 24(2)
- ТСХ 24(2), 26(2)
- фотометрический метод 28(2)
- Дикрезил 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- грудное молоко 90(2)
- ТСХ 90(2)
- Дикотекс (см. 2М-4Х)
- Дикурап 410, 420, 444
- вода 410, 420, 444
- ГЖХ 410, 444
- овощи 420
- почва 410, 420, 444
- растительный материал 410, 420
- ТСХ 420
- Дилор 46
- мед 46
- ТСХ 46
- Диметилтетрахлортерефталат (см. Дактал)
- О,О-Диметилфосфат 265
- Диметилфосфит 203
- воздух рабочей зоны 203
- ТСХ 203
- Димилин (см. Дифлубензурон)
- Динамика остатков пестицидов 143(2), 148(2)
- почва 148
- растения 148
- Динитрофенолов производные 89(2)
- биосубстраты 89(2)
- грудное молоко 89(2)
- Диносеб 221, 235, 241, 90(2), 217(2)
- биосубстраты 221, 90(2)
- виноград 235
- вода 235
- воздух рабочей зоны 217(2)
- грудное молоко 90(2)
- груши 235
- огурцы 235
- перец 235
- почва 235
- сахарная свекла 235
- ТСХ 221, 235, 90(2), 217(2)
- хлопковое масло 241
- цитрусовые 235

- яблоки 235
- Диметоат (см. Фосфамид)
- Дипел 111(2)
- воздух рабочей зоны 111
- пищевые продукты 111
- почва 111
- растения 111
- Диптерекс (см. Хлорофос)
- Диталимфос (см. Плондрел)
- Дитиокарбаматы 373
- ГЖХ парофазная 373
- растительный материал 373
- Диурон 410, 420
- вода 410, 420
- ГЖХ 410
- овощи 420
- почва 410, 420
- растительный материал 410, 420
- ТСХ 420
- Дифеноксурон (см. Фалоран)
- Дифлюбензурон 430, 434
- баклажаны 430
- вода 434
- ГЖХ 430, 434
- капуста 430
- картофель 434
- клубника 434
- лесная растительность 434
- почва 434
- ТСХ 430
- Дифос (см. Абат)
- Дихлобутразол (см. Виджил)
- Дихлоран (см. Ботран)
- 3,4-Дихлоранилин 86(2)
- Дихлормалениновый ангидрид 318(2)
- 3,6-Дихлорпиколиновой кислоты метиловый эфир 39(2), 40(2), 41(2)
- 2,4-Дихлорфеноксипропионовая кислота 207(2)
- воздух рабочей зоны 207(2)
- ГЖХ 207(2)
- Дихлофоп-метил (см. Иллоксан)
- Дихлорфос (см. ДДВФ)
- Дициклин (см. Сумилекс)
- 2,4-ДМ 344
- вода 344
- ГЖХ 344
- почва 344
- 2,4-ДМ бутиловый эфир 344
- вода 344
- ГЖХ 344
- почва 344
- ДМП (см. Пикс)
- Дозанекс 410, 420, 209(2)
- вода 410, 420
- воздух рабочей зоны 209(2)
- ГЖХ 410
- овощи 420
- почва 410, 420
- растительный материал 410
- ТСХ 420, 209(2)
- Дропп 494, 497, 499, 212(2)
- виноград 497
- вода 499
- воздух рабочей зоны 212(2)
- волокна хлопка 494, 499
- ГЖХ 499, 212(2)
- почва 494, 499
- семена хлопка 497, 499
- ТСХ 494, 497
- 2,4-ДХФ 30
- биосубстраты 30
- ТСХ 30
- ДХФК (см. Дактал)
- Дэпра (см. Девринол)
- Дуал 313
- вода 313
- почва 313
- растения 313
- ТСХ 313
- Дурсбан 59
- ГЖХ 59, 66
- ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78

### 3

- Зеллек 214(2)
- воздух рабочей зоны 214(2)
- ТСХ 214(2)
- Зенкор 298
- воздух рабочей зоны 298



— ГЖХ 298  
— ТСХ 298  
Золон (см. Фозалон)  
Зоокумарин 89(2), 90(2), 215(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— воздух рабочей зоны 215(2)  
— ГЖХ 90(2)  
— ТСХ 90(2) 215(2)

## И

ИБФ (см. Ридид П)  
Ивин 314  
Игран 298(2)  
— ГЖХ 298(2)  
— воздух рабочей зоны 298(2)  
— ТСХ (298(2))  
Изагрин (см. Биоресметрин)  
Изил 109  
Изопропалин (см. Паарлан)  
Изопропиолан (см. Тотрил)  
Изофен 235, 241, 217(2)  
— виноград 235  
— вода 235  
— воздух рабочей зоны 217(2)  
— ГЖХ 235  
— груши 235  
— огурцы 235  
— перец 235  
— почва 235  
— сахарная свекла 235  
— томаты 235  
— ТСХ 235  
— хлопковое масло 241  
— цитрусовые 235  
— яблоки 235  
— см. также Акрекс  
Изофос 3, 59  
— ГЖХ 59, 66  
— унифицированный метод 59  
Иллоксан 219(2)  
— воздух рабочей зоны 219(2)  
— ГЖХ 219(2)  
Имидан (см. Фталофос)  
Имлакт 163(2)  
— воздух рабочей зоны 163(2)  
— ТСХ 163(2)

Инсектин 108(2), 111(2)  
— воздух рабочей зоны 111(2)  
— воздух рабочей зоны 111(2)  
— пищевые продукты 111(2)  
— почва 111(2)  
— растения 111(2)  
Интраион (см. М-81)

## Й

Йодофос 59  
— ГЖХ 59, 66  
— унифицированный метод 59  
Йодфенфос (см. Йодофос)  
Импродион (см. Ровраль)  
ИФК 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 90(2)  
Йоксинил (см. Тотрил)

## К

Кампозан 111, 221(2)  
— вода 111  
— воздух рабочей зоны 221(2)  
— ГЖХ 111, 221(2)  
— почва 111  
— растительный материал 111  
— см. также Этрел  
Карагард 232(2)  
— воздух рабочей зоны 232(2)  
— ГЖХ 232(2)  
Каратан 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 90(2)  
Карате 301, 254(2)  
— вода 301  
— воздух рабочей зоны 254(2)  
— ГЖХ 301, 254(2)  
— почва 301  
— растения 301  
— ТСХ 301, 254(2)  
Карбаминовой кислоты производные  
89(2), 301(2)  
— биосубстраты 89(2)

- грудное молоко 89(2)
- ТСХ 89(2)
- 1-Карбамил-3[5]-метилпиразол 222(2)
- воздух рабочей зоны 222(2)
- ТСХ 222(2)
- см. также КМП
- Карбендазим (см. БМК)
- Карбин 377, 90(2)
- биосубстраты 377, 90(2)
- грудное молоко 90(2)
- спектрофотометрический метод 377
- ТСХ 90(2)
- Карбоксин (см. Витавакс)
- Карбофос 59, 86, 126, 74(2), 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- грудное молоко 90(2)
- ГЖХ 59, 66, 86, 126
- табак 86
- томаты, систематический ход анализа 74(2)
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- ТСХ 59, 66, 90(2)
- чай 126
- воздух рабочей зоны 224(2)
- Карбофуран 97(2), 224(2)
- сахарная свекла 97(2)
- ТСХ 97(2), 224(2)
- см. также Фурадан
- Картоцид 501
- биосубстраты 501
- вода 501
- жом 501
- картофель 501
- лук 501
- меласса 501
- огурцы 501
- сахар 501
- свекла 501
- томаты 501
- ТСХ 501
- цитрусовые 501
- яблоки 501
- Кельтан 1, 69(2), 74(2)
- вода 11
- ГЖХ 11
- томаты, систематический ход анализа 1
- ТСХ 11
- Китагин (см. Ридид П)
- Кломазон (см. Комманд)
- КМП 506
- биосубстраты 506
- вода 506
- почва 506
- растения 506
- ТСХ 506
- Комманд 49
- бобовые 49
- ГЖХ 49
- ТСХ 49
- Контроль за остатками пестицидов 143, 144
- выборочный 144
- сплошной 144
- стационарный 144
- текущий 144
- Корал 59, 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- ГЖХ 59, 66
- грудное молоко 90(2)
- ТСХ 59, 66, 90(2)
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный 78
- Корбель 30(2)
- вода 30(2)
- почва 30(2)
- пшеница 30(2)
- ТСХ 30(2)
- Кормогризин-5 (см. Гризин)
- Кормогризин-10 (см. Гризин)
- Корсар (см. Амбуш)
- Которан 410, 420, 444
- вода 410, 420
- ГЖХ 410, 444
- овощи 420
- почва 410, 420, 444
- растительный материал 410, 420
- Котофор 32(2)
- биосубстраты 32(2)

- вода 32(2)
- почва 32(2)
- растительные продукты питания 32(2)
- семена хлопчатника 32(2)
- ТСХ 32(2)
- спектрофотометрический метод 32(2)

#### Краснодар-1 244

- вода 244
- зерно 244
- перец 244
- почва 244
- томаты 244
- ТСХ 244

#### Кронетон 226(2)

- воздух рабочей зоны 226(2)
- ТСХ 226(2)

#### Кротоксифос (см. Циодрин)

#### Кротоволактон 509

- ГЖХ 509
- зерно кукурузы 509

#### Куракрон (см. Селекрон)

#### Куратер (см. Карбофуран)

### Л

#### Лаптран (см. Плондрел)

#### Лассо 283, 313, 228(2)

- вода 313
- зеленая масса кукурузы 283
- воздух рабочей зоны 228(2)
- почва 313
- рапсовое масло 283

#### — растения 313

#### — ТСХ 283, 313, 228

#### Лебайцид (см. Байтекс)

#### Ленацил 197(2)

- воздух рабочей зоны 197(2)
- ТСХ 197(2)

#### Лентагран 37(2)

- вода 37(2)
- кукуруза 37(2)

#### — почва 37(2)

#### — ТСХ 37(2)

#### Лергон (см. Дифлубензурон)

#### Линурон 410, 420, 84(2)

#### — вода 410, 420, 84(2)

#### — ГЖХ 410, 84(2)

#### — овощи 420

#### — почва 410, 420, 84(2)

#### — растения 410, 420, 84(2)

#### Линурона метаболиты 410

#### — вода 410

#### — ГЖХ 420

#### Лепидоцид 108(2), 111(2), 113(2), 115(2)

#### — воздух рабочей зоны 111(2)

#### — иммунофлюоресцентный метод 113(2)

#### — пищевые продукты 111(2)

#### — почва 111(2)

#### — растения 111(2), 113(2)

#### Лиронинон (см. Фалоран)

#### Лонтрел 39(2)

#### — вода 39(2)

#### — почва 39(2)

#### — растения 39(2)

#### — ТСХ 39(2)

### М

#### М-81 59

#### — унифицированный метод 59

#### Маврик 285, 230(2)

#### — вода 285

#### — воздух рабочей зоны 230

#### — ГЖХ 230(2)

#### — овощи 285

#### — ТСХ 285, 230(2)

#### — фрукты 285

#### Малатнон (см. Карбофос)

#### Маликс (см. Тиодан)

#### Малоран 410, 420

#### — вода 410, 420

#### — ГЖХ 410

#### — овощи 420

#### — почва 410, 420

#### — растительный материал 410, 420

#### — ТСХ 420

#### Малорана метаболит 410

#### — вода 410

#### — ГЖХ 410

#### Мезоранил 57(2), 298(2)

- вода 57(2)
- воздух рабочей зоны 398(2)
- ГЖХ 57(2), 298(2)
- зерно кукурузы 57(2)
- почва 57(2)
- ТСХ 298(2)
- Мекопроп (см. 2М-4ХП)
- Менид 288
  - вода 288
  - ГЖХ 288
- Мепикват-хлорид (см. Пикс)
- Мергкаптоин (см. Карбофос)
- Метазахлор (см. Бутизан)
- Метазин 57(2), 89(2), 90(2), 233(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - вода 57(2)
  - воздух рабочей зоны 233(2)
  - ГЖХ 57(2), 233(2)
  - зерно кукурузы 57(2)
  - молоко грудное 90(2)
- Металлаксил (см. Ридомил)
- Мегамифос 59
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
- Метамитрон (см. Голтикс)
- Метафос 59, 86, 129, 136, 90(2), 100(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - ГЖХ 59, 66, 86, 129, 136
  - грудное молоко 90(2)
  - сухие овощи и плоды 129
  - почва 136
  - растения пшеницы 100(2)
  - ТСХ 59, 66, 129, 100(2)
  - унифицированный метод 59
  - хромато-ферментный метод 78
- Метацид (см. Метафос)
- Метилнитрофос 59, 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - ГЖХ 59, 66
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 59, 66, 90(2)
  - унифицированный метод 59
  - хромато-ферментный метод 78
- 3[5]-Метилпиразол (МП) 222(2)
  - воздух рабочей зоны 222(2)
  - ТСХ 222(2)
- Метилтиофонат (см. Топсин-М)
- Метобромурон (см. Паторан)
- Метоксикарагард (см. Карагард)
- Метоксихлор 53, 193(2)
  - вода 53
  - воздух рабочей зоны 193(2)
  - ГЖХ 53, 193(2)
  - картофель 53
- Метоксурон (см. Дозанекс)
- Метолахлор (см. Дуал)
- Метопротрин 57(2)
  - вода 57(2)
  - ГЖХ 57(2)
  - зерно кукурузы 57(2)
  - почва 57(2)
- Метрибузин (см. Зенкор)
- Миколфидин 109(2), 118(2)
  - воздух рабочей зоны 118(2)
  - метод световой микроскопии 118(2)
- Мильбекс 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 90(2)
- Мистрал (см. Корбель)
- Митак 236(2)
  - воздух рабочей зоны 236(2)
  - ГЖХ 236(2)
  - ТСХ 236(2)
- Митран 55
  - вода 55
  - ГЖХ 55
  - капуста 55
  - яблоки 55
- Молинат 288(2)
  - воздух рабочей зоны 288(2)
  - ТСХ 288(2)
  - см. также Ялан
- Монолинурон (см. Арезин)
- Монурон 410, 420
  - вода 410, 420
  - ГЖХ 410
  - овощи 420
  - почва 410, 420
  - растения 410, 420

— ТСХ 420  
Морфовол 238(2)  
— воздух рабочей зоны 238(2)  
— ТСХ 238(2)  
МП — метаболит КМП 506  
— биосубстраты 506  
— вода 506  
— почва 506  
— растения 506  
— ТСХ 506  
2М-4Х 349, 352, 234(2)  
— вода 349, 352  
— воздух рабочей зоны 234(2)  
— ГЖХ 352, 234(2)  
— почва 349, 352  
— продукты питания 349, 352  
— растения 349, 352  
— ТСХ 352, 234(2)  
2М-4ХМ 352, 234(2)  
— вода 352  
— воздух рабочей зоны 234  
— ГЖХ 352, 234(2)  
— почва 352  
— растения 352  
2М-4ХП 234(2)  
— воздух рабочей зоны 234(2)  
— ГЖХ 234(2)

## Н

НА-73 (см. Ниссорон)  
Набу 247, 250, 239(2)  
— вода 247  
— воздух рабочей зоны 239(2)  
— ГЖХ 250  
— зеленые листья 247  
— капуста 247  
— морковь 250  
— почва 247  
— соя 247  
— ТСХ 247, 239(2)  
Налед (см. Дибром)  
Напропамид (см. Девринол)  
Нафталам (см. Алапап)  
Негувон (см. Хлорофос)  
Неорон 241(2)  
— воздух рабочей зоны 241(2)

— ТСХ 241(2)  
Ниссоран 511, 244(2)  
— виноград 511  
— вода 511  
— воздух рабочей зоны 244(2)  
— ГЖХ 511  
— почва 511  
— растительный материал 511  
— ТСХ 511, 244(2)  
Нитрапирин 42(2)  
— биосубстраты 42(2)  
— вода 42(2)  
— почва 42(2)  
— ТСХ 42(2)  
Нитрозометилмочевина, получение  
161, 294, 346, 40, 187  
НФ-44 (см. Топсин-М)

## О

Оксадиазон (см. Ронстар)  
3-Оксиметил-6-хлорбензоксазолон,  
310(2)  
— воздух рабочей зоны 310(2)  
— ТСХ 310(2)  
Олово 173  
— вода 173  
— почва 173  
— растения 173  
— спектрофотометрический метод 173  
Оксамил (см. Видат)  
Оксифлуорфен (см. Гоал)  
Оксихлорид меди (см. Хлорокись ме-  
ди)  
Омайт 447  
— мед 447  
— ТСХ 447  
Ордрам (см. Молинат, Ялан)  
Ортен 248(2)  
— воздух рабочей зоны 248(2)  
— ТСХ 248(2)

## П

Паарлан 195  
— ГЖХ 195  
— почва 195  
— табак 195

- табачный дым 195
- Панорам 290
- ГЖХ 290
- зерно 290
- почва 290
- Паратион-метил (см. Метафос)
- Паторан 410, 420
- вода 410, 420
- ГЖХ 410
- овощи 420
- почва 410, 420
- растения 410, 420
- ТСХ 420
- Паторана метаболит 410
- вода 410
- ГЖХ 410
- Пахтон 262(2)
- воздух рабочей зоны 262(2)
- ТСХ 262(2)
- Пебулат (см. Тиллам)
- Пеноксалин (см. Стомп)
- Пентадин 293
- ГЖХ 293
- зеленая масса люпина, редиса 293
- семена люпина, редиса 293
- Пентафторбензилбромид, получение 166
- Пентафторбензиловый спирт 165
- Пермасект (см. Амбуш)
- Перметрин (см. Амбуш)
- Перметрин (см. Анометрин-Н)
- Перопал 171
- ТСХ 171
- яблоки 171
- Петрал (см. Релдан)
- Пиклорам 47
- вода 47
- ГЖХ 47
- зерно 47
- почва 47
- растения 47
- Пикс 50(2), 250(2)
- вода 50(2)
- воздух рабочей зоны 250(2)
- фотометрический метод 50(2), 250(2)
- хлопковое масло 50(2)
- Пиразон 197(2)
- воздух рабочей зоны 197(2)
- ГЖХ 197(2)
- см. также Пирамин
- Пирамин 84
- вода 84
- ГЖХ 84
- почва 84
- растения 84
- Пиридат (см. Лентагран)
- Пиридафентион (см. Офунак)
- Пиримифос-метил (см. Актеллик)
- Пиримифос-этил (см. Пиримицид)
- Пиримицид 59
- унифицированный метод 59
- Пликтран 173, 179, 183
- биосубстраты 179
- вода 173
- почва 173
- растения 173, 183
- ТСХ 173, 179, 183
- Пликтрана метаболиты 173, 179
- Плондрел 59, 138, 258(2)
- вода 138
- воздух рабочей зоны 258(2)
- огурцы 13
- почва 138
- ТСХ 138, 258(2)
- Полидим 309
- вода 309
- зерно 309
- почва 309
- ТСХ 309
- Полихлорированные дифенилы 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- грудное молоко 90(2)
- Полихлорированные фенолы 30
- биосубстраты 30
- ТСХ 30
- Полихлорпипинен 153(2)
- изучение динамики 153
- Препарат КОМБИ 97(2)
- сахарная свекла 97(2)
- ТСХ 97(2)

Препарат 93 (см. ДД)  
Приматол М 57:  
— вода 57  
— ГЖХ 57  
— зерно кукурузы 57  
— почва 57  
Приматол П (см. Пропазин)  
Примицид 157(2)  
— воздух рабочей зоны 157  
— ТСХ 157  
Продиамин 256  
— воздух рабочей зоны 256  
— ТСХ 256  
Промет 381  
— вода 381  
— почва 381  
— растения 381  
— ТСХ 381  
Прометрин 54(2), 57(2), 84(2),  
101(2)  
— вода 57(2), 84(2)  
— ГЖХ 54(2), 84(2), 101(2)  
— зерно кукурузы 57(2)  
— мята перечная 101(2)  
— молоко 54(2)  
— почва 57(2), 84(2), 101(2)  
— эфирное масло 101(2)  
Пропазин 54(2), 57(2)  
— вода 57(2)  
— ГЖХ 54(2), 57(2)  
— зерно кукурузы 57(2)  
— молоко 54(2)  
— почва 57  
Пропанид 288, 153(2)  
— вода 288  
— ГЖХ 288  
— изучение динамики 153  
— метаболит 153  
Пропанис (см. Пропанид)  
Пропахлор (см. Рамрод)  
Пропроназол (см. Тилт)  
Противос 260(2)  
— воздух рабочей зоны 260(2)  
— ГЖХ 260(2)  
— ТСХ 260(2)  
Проул (см. Стомп)

Профенофос (см. Селекрон)  
Профос (см. Этопрофос)  
Процимидон (см. Сумилекс)  
Псевдомонады 109(2)

## Р

Рамрод 313  
— вода 313  
— почва 313  
— растения 313  
— ТСХ 313  
Раундап 199  
— вода 199  
— ТСХ 199  
Реактив Грисса — Илосвая 173(2)  
Реактив Паули 223(2)  
Реглон (см. Дикват)  
Рейсер 515, 263(2)  
— вода 515  
— воздух рабочей зоны 263(2)  
— почва 515  
— растения 515  
— ТСХ 515, 263(2)  
Релдан 59, 141, 265(2)  
— вода 141  
— воздух рабочей зоны 265(2)  
— ГЖХ 59, 66, 141, 265(2)  
— зерно 141  
— ТСХ 265(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Ресин 52(2)  
— ботва свеклы 52(2)  
— вода 52(2)  
— корнеплоды свеклы 52(2)  
— ТСХ 52(2)  
Ридомил 316, 268(2)  
— биосубстраты 316  
— виноград 316  
— виноградный сок 316  
— вода 316  
— воздух рабочей зоны 268(2)  
— ГЖХ 316, 268(2)  
— картофель 316  
— лук 316  
— огурцы 316

— почва 316  
— сахарная свекла 316  
— табак 316  
— табачный дым 316  
— ТСХ 316  
Рипкорд 296, 251(2)  
— вода 296  
— воздух рабочей зоны 251(2)  
— ГЖХ 296, 251(2)  
— почва 296  
— растения 296  
— ТСХ 296, 251(2)  
см. также Цимбуш, Циперметрин  
Рицид 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 90(2)  
Рицид П 59, 144  
— вода 144  
— ГЖХ 59, 66, 144  
— почва 144  
— рис 144  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Ровраль 518, 270(2)  
— биосубстраты 521  
— виноград 518  
— виноградный сок 518  
— вино 518  
— вода 518  
— воздух рабочей зоны 270(2)  
— ГЖХ 525  
— картофель 518  
— почва 518, 525  
— растения 525  
— томаты 518  
— ТСХ 518, 270(2)  
Рогор (см. Фосфамид)  
Ронит 383, 388, 90(2), 288(2)  
— биосубстраты 383, 388, 90(2)  
— вода 388  
— воздух рабочей зоны 288(2)  
— ГЖХ 383, 388  
— грудное молоко 288(2)  
— растения 388  
— ТСХ 383, 90(2), 288(2)

Ромита метаболиты 383  
— биосубстраты 383  
— ГЖХ 383  
— ТСХ 383  
Роннел (см. Трихлорметафос)  
Ронстар 527  
— ГЖХ 527  
— почва 527  
— растения 527  
— эфирные масла 527

## С

Сайфос 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 90(2)  
САН-155 (см. Эвисект)  
Санкап (см. Когофор, Пахтон)  
Сапрол (см. Трифорин)  
Севин 80(2), 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— ГЖХ 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— овощи 80(2)  
— фрукты 80(2)  
— ТСХ 80(2)  
Селекрон 59, 272(2)  
— воздух рабочей зоны 272(2)  
— ГЖХ 272(2)  
— ТСХ 59, 66  
— унифицированный метод 59, 66  
— хромато-ферментный метод 78  
Семерон 57(2), 298(2)  
— вода 57(2)  
— воздух рабочей зоны 298(2)  
— ГЖХ 57(2), 298(2)  
— зерно кукурузы 57(2)  
— почва 57(2)  
— ТСХ 298(2)  
— см. Десметрин  
н-Серве (см. Нитрапирин)  
Сетоксидим (см. Набу)  
Сикарол 290  
— ГЖХ 290  
— зерно 290  
— почва 290



- Симазин 54(2), 57(2), 84(2), 149(2)  
 — вода 57(2), 84(2)  
 — ГЖХ 54(2), 57(2), 84(2)  
 — зерно кукурузы 57(2)  
 — молоко 54(2)  
 — почва 57(2), 84(2)  
 — растения 84(2)
- Симм-Триазины** 54(2), 57(2), 89(2), 94(2), 298(2)  
 — биосубстраты 89(2)  
 — воздух рабочей зоны 298(2)  
 — ГЖХ 89(2), 94(2), 298(2)  
 — грудное молоко 89(2)  
 — пищевые рационы 94(2)  
 — ТСХ 86(2), 94(2)
- Синбар (см. Тербацил)
- Синтетические пиретронды** 296, 301, 307, 80(2), 251(2), 254(2)  
 — биосубстраты 307  
 — вода 296, 301  
 — воздух рабочей зоны 251(2), 254(2)  
 — ГЖХ 296, 301, 307, 80(2), 251(2), 254(2)  
 — плодово-овощные культуры 80(2)  
 — почва 296, 301  
 — растения 296, 301  
 — ТСХ 96, 301, 80(2), 251(2), 254(2)
- Ситразон (см. Цитразон)
- Сонален** 208, 210, 277(2)  
 — вода 208  
 — воздух рабочей зоны 277(2)  
 — ГЖХ 208, 210, 274(2)  
 — зеленая масса сои 208  
 — масло подсолнечное, рапса, кле-  
 шевины 210  
 — почва 208  
 — ТСХ 208
- Старане** 62(2), 275(2)  
 — вода 62(2)  
 — воздух рабочей зоны 275(2)  
 — зерно 62(2)  
 — почва 62(2)  
 — ТСХ 62(2), 275(2)
- Стомп** 202, 205, 276(2)
- воздух рабочей зоны 276(2)  
 — ГЖХ 202, 205  
 — ЖХ 276(2)  
 — табак 202  
 — эфирные масла 205  
 — эфиромасличные культуры 205
- Сульфазин** 232(2)  
 — воздух рабочей зоны 232(2)  
 — ГЖХ 232(2)
- Суми-альфа** 328, 281(2)  
 — вода 328  
 — воздух рабочей зоны 281(2)  
 — ГЖХ 328, 281(2)  
 — овощи 328  
 — плодовые 328  
 — ТСХ 328  
 — см. Фенвалерат, активный изомер
- Сумилекс** 531, 536, 278(2)  
 — биосубстраты 531, 536  
 — вода 531  
 — воздух рабочей зоны 278(2)  
 — ГЖХ 536, 278(2)  
 — почва 531  
 — семена подсолнечника 531  
 — ТСХ 531, 278(2)
- Сумицидин** 296, 251(2)  
 — вода 296  
 — воздух рабочей зоны 251(2)  
 — ГЖХ 296, 251(2)  
 — почва 296  
 — растения 296  
 — ТСХ 296, 251(2)
- Супона** (см. бирлан)
- Сутан** 388, 90(2), 288(2)  
 — биосубстраты 388, 90(2)  
 — вода 388  
 — воздух рабочей зоны 388, 288(2)  
 — ГЖХ 388  
 — растения 388  
 — ТСХ 90(2), 288(2)

## Т

- Талан** (см. Акрекс, Изофен)
- Тачигарен** 538  
 — почва 538  
 — ТСХ 538

- Текто (см. Тиабендазол)  
 Темефос (см. Абат)  
 Темик (см. Альдикарб)  
 Теноран 410, 420  
 — вода 410, 420  
 — ГЖХ 410  
 — овощи 420  
 — почва 410, 420  
 — растения 410, 420  
 — ТСХ 420  
 Тенхайд (см. Пликтран)  
 Тербацил 64(2), 101(2), 283(2)  
 — вино 64(2)  
 — виноград 64(2)  
 — вода 64(2)  
 — воздух рабочей зоны 283(2)  
 — ГЖХ 64(2), 101(2), 283(2)  
 — мята перечная 101(2)  
 — ТСХ 283(2)  
 — фрукты 64(2)  
 — эфирные масла 101(2)  
 Тербутриазин (см. Приматол-М)  
 Тербутрин 54(2)  
 — ГЖХ 54(2)  
 — молоко 54(2)  
 — см. также Игран  
 Тетразин (см. Симазин)  
 Тетрал (см. Дактал)  
 Тетрафлаурон (см. Томилон)  
 Тиабендазол 541  
 — апельсины 511  
 — вода 511  
 — капуста 511  
 — картофель 511  
 — лимоны 511  
 — лук 511  
 — морковь 511  
 — овощи 511  
 — почва 511  
 — пшеница 511  
 — рис 511  
 — свекла 511  
 — томаты 511  
 — ТСХ 511  
 — фрукты 511  
 Тидиазурон (см. Дропп)  
 Тиллам 388, 84(2), 90(2), 288(2)  
 — биосубстраты 388, 90(2)  
 — вода 388, 84(2)  
 — воздух рабочей зоны 388, 288(2)  
 — ГЖХ 388, 84(2)  
 — грудное молоко 90(2)  
 — растения 388, 84(2)  
 — почва 84(2)  
 — ТСХ 90(2), 288(2)  
 Тилт 545, 547, 100(2)  
 — вода 545  
 — ГЖХ 545, 547  
 — зерно 547  
 — почва 545, 547  
 — пшеница 100(2)  
 — растения 545  
 — ТСХ 100(2)  
 Тиодан 287(2)  
 — воздух рабочей зоны 287(2)  
 — ГЖХ 287(2)  
 Тиодансульфат 287(2)  
 — врз 287(2)  
 ГЖХ 287(2)  
 Тиокарбаминовые кислоты 388,  
 180(2), 288(2), 301(2)  
 — биосубстраты 388  
 — воздух рабочей зоны 388, 288(2)  
 — растения 388  
 — ТСХ 288(2)  
 Тиоциклам (см. Эвисект)  
 ТМДИ 491, 184(2)  
 — вода 491  
 — воздух рабочей зоны 184(2)  
 — почва 491  
 — растения 491  
 — ТСХ 491, 184(2)  
 ТМТД 393, 97(2)  
 — вода 393  
 — воздух рабочей зоны 292(2)  
 — зерновые культуры 393  
 — растения 393  
 — растения сахарной свеклы 97(2)  
 — ТСХ 393, 97(2), 292(2)  
 Тиометон (см. М-81)  
 Тирам (см. ТМТД)  
 Токсины 108(2), 111(2)

- Токутион 260(2) (см. Протифос)
- Толуин 293(2)
- воздух рабочей зоны 293(2)
  - ГЖХ 293(2)
- Томилон 410, 274(2), 294(2)
- вода 410
  - воздух рабочей зоны 294(2)
  - ГЖХ 410, 294(2)
  - почва 410
  - растения 410
  - ТСХ 294(2)
- Топаз 550
- вода 550
  - ГЖХ 550
  - почва 550
- сельскохозяйственные культуры
- 550
  - ТСХ 550
- ТОРК 185, 296(2)
- вода 185
  - воздух рабочей зоны 296(2)
  - почва 185
  - ТСХ 185, 296(2)
- ТОРК метаболиты 185
- Топсин-М 438, 440, 442
- ГЖХ 442
  - персики 438, 440, 442
  - ТСХ 438, 440
  - фейхоа 438, 440, 442
  - хурма 438, 442
  - яблоки 438
- Тордон (см. Пиклорам)
- Тотрил 330
- лук 330
  - ТСХ 330
- Трефлан 212, 214, 215, 84(2)
- вода 212, 218, 84(2)
  - ГЖХ 215, 218, 84(2), 101(2)
  - капуста 212
  - мята перечная 101(2)
  - перец 214
  - полирографический метод 214
  - почва 212, 215, 218, 84(2), 101(2)
  - растения 84(2)
  - спектрофотометрический метод 212
- табак 215
  - табачный дым 215
  - томаты 212
  - эфирное масло 101
- Трехбромистый фосфор 165, 166
- Триадименол (см. Байтан)
- Триадимефон (см. Байлетон)
- Триаллен 300(2)
- воздух рабочей зоны 300(2)
  - ГЖХ 300(2)
- Триаллат 395, 90(2)
- биосубстраты 90(2)
  - вода 395
  - ГЖХ 395, 398
  - грудное молоко 90(2)
  - зерно пшеницы 395
  - мак 398
  - почва 395
  - ТСХ 90(2)
- Триамелон 302(2)
- воздух рабочей зоны 302(2)
  - ТСХ 302(2)
  - фотометрический метод 302(2)
- 2,4,6-Триброманилин 86(2)
- 2,4-6-Трибром-3-метиланилин 86(2)
- Трибуфон 59
- унифицированный метод 59
- Триморфамид 305(2)
- воздух рабочей зоны 305(2)
  - ГЖХ 305(2)
  - ТСХ 305(2)
  - см. также Фадеморф
- Трипропилфосфат 169
- Трифлурамин (см. Трефлан)
- Трифмин (см. Трифумин)
- Трифوران (см. Триморфамид, Фадеморф)
- Трифурин 68(2)
- вода 68(2)
  - огурцы 68(2)
  - почва 68(2)
  - ТСХ 68(2)
  - яблоки 68(2)
- Трифумин 552, 308(2)
- вода 552
  - воздух рабочей зоны 308(2)

- зерно 552
- овощи 552
- почва 552
- ТСХ 552, 308(2)
- фрукты 552
- Трихлорметафос 59
  - унифицированный метод 59
- Трихлорметафос-3 59, 126, 148, 74(2), 90(2)
  - биосубстраты 148, 90(2)
  - ГЖХ 59, 66, 126, 148
  - грудное молоко 90(2)
  - томаты, систематический ход анализа 74(2)
  - ТСХ 59, 66, 90(2)
  - унифицированный метод 59
  - чай 126
  - хромато-ферментный 78
- Трихлорфон (см. Хлорофос)
- 3,5,6-Трихлор-2-пиридинол 265
  - воздух рабочей зоны 265
  - ТСХ 265
- Трихоцетин 110(2), 134(2)
  - воздух рабочей зоны 134(2)
  - ТСХ 134(2)
- Тропотокс (см. 2М-4ХМ)
- ТХА (трихлорацетат натрия) 94(2)
  - ГЖХ 94
  - пищевые рационы 94(2)
- 2,4,5-ТХФ 30
  - биосубстраты 30
  - ТСХ 30
- 2,3,4,6-ТХФ 30
  - биосубстраты 30
  - ТСХ 30
- у**
- Узген (см. Бенлат, Беномил)
- Ф**
- Фадеморф 71(2)
  - вишня 71(2)
  - вода 71(2)
  - ГЖХ 71(2)
  - огурцы 71(2)
  - смородина 71(2)
- ТСХ 71(2)
- яблоки 71(2)
- см. также Триморфамид
- Фалоран 410, 420
  - вода 410, 420
  - ГЖХ 410
  - овощи 420
  - почва 410, 420
  - раст. мат. 410, 420
  - ТСХ 420
- ФАМ (см. Триамелон)
- Фастак 301, 254(2)
  - вода 301
  - воздух рабочей зоны 254(2)
  - ГЖХ 301, 254(2)
  - почва 301
  - растения 301
  - ТСХ 301, 254(2)
- Фенбутигина оксид (см. ТОРК)
- Фенвалерат (см. Суми-альфа, Суми-цидин)
- Фенвалерата активный рацемический изомер (см. Суми-альфа)
- Фенилмочевинные гербициды 410, 420
  - вода 410, 420
  - ГЖХ 410
  - овощи 420
  - почва 410, 420
  - раст. мат. 410, 420
  - ТСХ 420
- Фенитрооксон 59
  - ТСХ 59, 66
  - унифицированный метод 59
  - хромато-ферментный метод 78
- Фенкаптон 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 90(2)
- Фенитроксон 90(2)
  - биосубстраты 90(2)
  - грудное молоко 90(2)
  - ТСХ 90(2)
- Фенмедифам 368, 197(2)
  - вода 368, 400
  - воздух рабочей зоны 197(2)

- ГЖХ 368
- почва 368
- сахарная свекла 368
- ТСХ 400, 197(2)
- Фенилтротон (см. Метилнитрофос)
- Фенмедифам (см. Бетанал)
- Фенотат (см. Цидеал)
- Фенпропатрин (см. Динитол)
- Фенпропилморф (см. Корбель)
- Фентин (см. Байтекс)
- Фенурон 410, 420
- вода 410, 420
- ГЖХ 410, 420
- овощи 420, 444
- почва 410, 420, 444
- раст. мат. 410, 420
- ТСХ 420
- Фенфурам (см. Панорам)
- Фенхлорфос (см. Трихлорметафос)
- Феромоны 107(2), 110(2)
- Ферракс (см. Имлакт)
- Фитобактериомицины 110(2)
- Фитон (см. Картоцинд)
- Фитофаги 107(2)
- Флувалинат (см. Маврик)
- Флуроксилпир (см. Старане)
- Флурохлоридои (см. Рейсер)
- Флутриафон (см. Имлакт)
- Флуцитринат (см. Циболит)
- Флюроксилпир (см. Старане)
- Фозалон 59, 74(2), 170(2)
- биосубстраты 90(2)
- воздух рабочей зоны 310(2)
- ГЖХ 59, 66
- грудное молоко 90(2)
- томаты, систематический ход анализа 74(2)
- ТСХ 59, 66, 90(2), 310(2)
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный метод 78
- Фоксим 313(2)
- воздух рабочей зоны 312(2)
- ГЖХ 312(2)
- см. также Валексон
- Формотин (см. Антио)
- Фосмет (см. Фталофос)
- Фоспинол 314(2)
- воздух рабочей зоны 314(2)
- ТСХ 314(2)
- Фостин (см. Карбофос)
- Фосфамид 59, 86, 117, 129, 136, 90(2), 197(2)
- биосубстраты 117, 90(2)
- ГЖХ 59, 66, 86, 117, 129, 136, 197(2)
- грудное молоко 90(2)
- почва 136
- сухие овощи и плоды 129
- табак 86
- томаты, систематический ход анализа 74(2)
- ТСХ 59, 66, 117, 129, 90(2), 197(2)
- хромато-ферментный метод 78
- Фосфорорганические пестициды 12(2), 54(2)
- 58(2), 74(2), 89(2), 94(2), 100(2), 147(2), 150(2), 161(2), 177(2), 182(2)
- биосубстраты 89(2)
- ГЖХ 74, 80(2), 89(2), 94(2)
- отбор проб 147(2), 150(2)
- пищевые рационы 94(2)
- плодово-овощные культуры 80(2)
- томаты, систематический ход анализа 74(2), 89(2)
- ТСХ 74(2), 94(2)
- Фталофос 59, 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- ГЖХ 59, 66
- грудное молоко 90(2)
- ТСХ 59, 66
- унифицированный метод 59
- хромато-ферментный 78
- Фталофоса кислородный аналог 90(2)
- грудное молоко 90(2)
- биосубстраты 90(2)
- ТСХ 90(2)
- Фторметурон (см. Которан)
- Фудзиван 332
- вода 332
- ТСХ 332

Фунгинес (см. Трифорин)  
Фундазол (см. Беномил, Бендлат)  
Фурадан 402  
— вода 402  
— почва 402  
— растения 402  
— ТСХ 402  
— см. также Карбофуран  
Фурадан-300 (см. КОМБИ)  
Фуратнокарб (см. Промет)  
Фюзилад 306  
— соя 360  
— ТСХ 360

## Х

ХГИ 491, 184(2)  
— вода 491  
— воздух рабочей зоны 184(2)  
— почва 491  
— растения 491  
— ТСХ 184(2)  
Хлорамбен (см. Амибен)  
Хлорамп 42(2) (см. Пикораль)  
Хлорбензол о, м, п. 204(2)  
— воздух рабочей зоны 204  
— ГЖХ 204  
Хлорвинфос (см. ДДВФ)  
Хлор-ИФК 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 90(2)  
Хлоркарагарт 232(2) (см. Карагарт)  
3-Хлор-4-метоксанилин 209(2)  
— воздух рабочей зоны 209(2)  
— ТСХ 209(2)  
3-хлор-4-метоксинитробензол 209(2)  
— воздух рабочей зоны 209  
— ТСХ 209  
Хлоробромурон (см. Малоран)  
Хлороксурон (см. Теноран)  
Хлорорганические пестициды 11, 19,  
7(2), 12(2), 42(2), 54(2), 74(2),  
89(2), 94(2), 148(2), 150(2), 161(2),  
171(2), 177(2), 187(2), 189(2),  
221(2), 238(2), 242(2), 265(2),  
278(2), 280(2), 287(2), 318(2)

— биосубстраты 19, 89(2)  
— вода 11  
— ГЖХ 11, 19, 89(2), 94(2)  
— грудное молоко 19, 89(2)  
— отбор проб 147(2), 150(2)  
— пищевые рационы 94(2)  
— томаты, систематический ход ана-  
лиза 74(2)  
— ТСХ 11, 74(2), 94(2)  
ХОП 25  
— ГЖХ 35  
— гуза-пая 25  
— ТСХ 25  
— хлопковая шелуха 25  
Хлороталонил (см. Даконил)  
Хлоротолурон (см. Дикуран)  
Хлорофос 59, 129, 150, 69(2), 74(2),  
90(2), 153(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— ГЖХ 59, 66, 129  
— грудное молоко 98(2)  
— изучение динамики 153(2)  
— картофель 150  
— сухие овощи и плоды 129  
— томаты, систематический ход ана-  
лиза 74(2)  
— ТСХ 59, 66, 129, 150, 90(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Хлорпиралид (см. Лонтрел)  
Хлорпирифос (см. Дурсбан)  
Хлорпирифос-метил 265(2) (см. Рел-  
дан)  
Хлорсульферон 426  
— вода 430  
— ВЭЖХ 426  
— иммуноферментный метод 430  
— зерно 426  
— солома льна 426  
— почва 430  
— растения 430  
— семена льна 426  
— солома 426  
Хлортал-диметил (см. Дактал)  
Хлортетрациклин 110(2)  
Хлорат магния 480

— вода 480  
— семена хлопка 480  
— ТСХ 480  
— хлопковое масло 480  
6-Хлорпиколиновая кислота, метаболит нитрапирина 42(2), 45(2), 46(2)  
Хостаквик 59, 153, 316(2)  
— биосубстраты 153  
— вода 153  
— воздух рабочей зоны 316(2)  
— ГЖХ 59, 66, 153  
— овощи 153  
— почва 153  
— томаты, систематический ход анализа 74(2)  
— ТСХ 59, 66, 153, 316(2)  
— унифицированный метод 59  
— фрукты 153  
— хромато-ферментный метод 78  
Хроматографические пластины с целлюлозой, приготовление 200  
4-ХФ 30  
— биосубстраты 30  
— ТСХ 30

## Ц

ЦГА 71818 (см. Топаз)  
Цианокс 59, 156, 90(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— мед 156  
— ТСХ 59, 66, 156, 90(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Цианофос (см. Цианокс)  
Циболит 301, 254(2)  
— вода 301  
— воздух рабочей зоны 254(2)  
— ГЖХ 301, 254(2)  
— почва 301  
— растения 301  
— ТСХ 301, 254(2)  
Цигалотрин (см. Карате)  
Циклестин (см. Пликтран)  
Цидиал 59, 90(2)  
— биосубстраты 90(2)

— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 59, 66, 90(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Циклоат (см. Ронит)  
Цимбуш (см. Рипкорд)  
Цимид 317(2)  
— воздух рабочей зоны 317(2)  
— ТСХ 317(2)  
Цинеб 406  
— сушеные овощи, плоды 406  
— фотометрический метод 406  
Циодрин 59, 90(2), 319(2)  
— биосубстраты 90(2)  
— воздух рабочей зоны 319(2)  
— ГЖХ 319(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— ТСХ 59, 66, 90(2), 319(2)  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
Цитразон 334  
— ТСХ 334  
— цитрусовые 334

## Ш

Штаммы псевдомонад 109(2)

## Э

Эвисект 321(2)  
— воздух рабочей зоны 321(2)  
— ГЖХ 321(2)  
Экамет 59  
— унифицированный метод 59  
Экзотоксин 108(2), 109(2)  
 $\beta$ -экзотоксин 111(2), 115(2), 117(2)  
Эктибан (см. Амбуш)  
Эндосульфан (см. Тиодан)  
Эндотоксины 108(2)  
Энтобактерин 108(2)  
Энтомофаги 107(2)  
Энтомофторин 109(2), 118(2)  
— воздух рабочей зоны 118(2)  
— световая микроскопия 118(2)  
Эптам 388, 84(2), 90(2), 197(2), 288(2)  
— биосубстраты 388, 90(2)

— вода 388, 84(2)  
— воздух рабочей зоны 388, 197(2), 288(2)  
— ГЖХ 388, 84(2)  
— грудное молоко 90(2)  
— почва 84(2)  
— растения 388, 84(2)  
— ТСХ 90(2), 197(2), 288(2)  
ЭПТК (см. Элтам)  
Эсфенвалерат (см. Суми-альфа)  
Этафлюралин (см. Сонален)  
Этафос 59, 86, 101, 158  
— биосубстраты 101  
— ГЖХ 59, 66, 86, 101, 158  
— метаболиты 101  
— молоко 101, 158  
— мясопродукты 158  
— табак 86  
— ТСХ 59, 66  
— унифицированный метод 59  
— хромато-ферментный метод 78  
— яйца 101  
Этефон (см. Кампозон)  
Этикон 59  
— унифицированный метод 59  
Этион (см. Этикон)  
Этиофенкарб 226(2) (см. Кронетон)  
Этоксиллин 336, 323(2)  
— вода 336  
— воздух рабочей зоны 323(2)  
— ГЖХ 336, 323(2)  
— почва 336  
— растения 336  
N-β-Этоксиптилхлорацетанилид (см. Этоксиллин)

Этонпрофос 59  
— унифицированный метод 59  
Этолпроп (см. Этопрофос)  
Этрел 160  
— ГЖХ 160  
— зерно злаков 160  
— огурцы 160  
— семена хлопчатника 160  
— томаты 160  
— хлопковое масло 160  
— яблоки 160  
— см. также Кампозан  
Этринфос (см. Экамет)  
ЭФ-34 165  
— ГЖХ 165  
— зерно 165  
ЭФ-165, 167, 169  
— ГЖХ 167, 169  
— зерно 167  
— подсолнечное масло 169  
Эфогам (см. ЭФ-165)

## Ю

Ювенильные гормоны 110(2)

## Я

Ялан 388, 90(2)  
— биосубстраты 388, 90(2)  
— вода 388  
— воздух рабочей зоны 388  
— ГЖХ 388  
— грудное молоко 90(2)  
— растения 388  
— см. также Молинат



## **СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ**

---

- АрмНИИЗР — Армянский научно-исследовательский институт защиты растений (г. Ереван)
- БелНИИЗР — Белорусский научно-исследовательский институт защиты растений (г. Прилуки Минской обл.)
- БелНИСГИ — Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт (г. Минск)
- ВИЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений (г. Пушкин Ленинградской обл.)
- ВИЛР — Всесоюзный институт лекарственных растений (г. Москва)
- ВИТИМ — Всесоюзный институт табака и махорки НПО «Табак» (г. Краснодар)
- ВИЭВ — Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии (г. Москва)
- ВНИВО — Всесоюзный научный институт по охране вод (г. Харьков)
- ВНИИбакпрепарат — Всесоюзный научно-исследовательский институт микробиологических средств защиты растений и бактериальных препаратов (г. Москва)
- ВНИИБМЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт биологических методов защиты растений (г. Кишинев)
- ВНИИВС — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии (г. Москва)
- ВНИИВЭА — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии (г. Тюмень)
- ВНИИГИНТОКС — Всесоюзный научно-исследовательский институт гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс (г. Киев)
- ВНИИЖ — Всесоюзный научно-исследовательский институт жиров (г. Ленинград)
- ВНИИЗР — Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (пос. Рамонь Воронежской обл.)
- ВНИИОТСХ — Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране труда в сельском хозяйстве (г. Орел)
- ВНИИПП — Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (г. Москва)
- ВНИИССОК — Всесоюзный научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур (г. Москва)
- ВНИИФ — Всесоюзный научно-исследовательский институт фитопатологии (Голицино Московской обл.)
- ВНИИХЛесхоз — Всесоюзный научно-исследовательский институт химизации лесного хозяйства (г. Ивантеевка Московской обл.)
- ВНИИХСЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (г. Москва)

ВНИИХТИМП — Всесоюзный научно-исследовательский химико-технологический институт медицинско-микробиологической промышленности  
 ВНИИЭМК — Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромасличных культур НПО «Эфирмасло» (г. Симферополь)  
 ВНИТИГ — Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений (г. Уфа)  
 ВНИФС — Всесоюзная научно-исследовательская филлоксерная станция (г. Одесса)  
 ГрузНИИГТиПЗ — Грузинский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний им. Н. И. Махвиладзе (г. Тбилиси)  
 ГрузНИИЗР — Грузинский научно-исследовательский институт защиты растений (г. Тбилиси)  
 ИКХиХВ АН УССР — Институт коллоидной химии и химии воды АН УССР (г. Киев)  
 ИОХ АН СССР — Институт органической химии АН СССР (г. Москва)  
 ИПФ АН СССР — Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР (г. Пушкино Московской обл.)  
 ИФР АН УССР — Институт физиологии растений и генетики АН УССР (г. Киев)  
 ИХ АН МССР — Институт химии АН ССР Молдовы (г. Кишинев)  
 ИХ АН УзССР — Институт химии АН Узбекской ССР  
 ИХРВ — Институт химии растительных веществ АН Узбекской ССР  
 ИХ УНЦ АН СССР — Институт химии Уральского научного центра АН СССР (г. Свердловск)  
 КГИУВ — Киевский государственный институт усовершенствования врачей  
 КНИИГТиПЗ — Киевский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний  
 КНИИЭИБ — Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского МЗ УССР  
 КНИИЭМП — Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и паразитологии МЗ УССР  
 ЛитНИИЭМБГ — Литовский научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены (г. Вильнюс)  
 ЛМИ — Львовский медицинский институт  
 ЛТЭИ — Львовский торгово-экономический институт  
 МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  
 МНИЛ — Межфакультетская научно-исследовательская лаборатория МГУ им. Белозерского (г. Москва)  
 НИИГСЦ — Научно-исследовательский институт горного садоводства и цветоводства (г. Сочи)  
 НИИСХ Юго-Востока — научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока (г. Саратов)  
 НИИЭИГ — Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены  
 НИОХ СО АН СССР — Новосибирский институт органической химии Сибирского отделения АН СССР  
 НПО «Масложирпром» — Научно-производственное объединение масложировой промышленности (г. Ленинград)  
 НПО «Тайфун» — Институт экспериментальной метеорологии (г. Обнинск)  
 Отдел ТОС ИХ БНЦ УрО АН СССР — Отдел тонкого органического синтеза Института химии Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР (г. Уфа)  
 СредазНИКПищепром — Среднеазиатский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт пищевой промышленности  
 ТашГУ — Ташкентский государственный университет  
 ТашНИИМСХ — Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства  
 ТашМИ — Ташкентский медицинский институт

ТСХА — Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева  
УзНИВИ — Узбекский научно-исследовательский ветеринарный институт  
им. К. И. Скрябина  
УзНИИСГиПЗ — Узбекский научно-исследовательский институт санитарии,  
гигиены и профзаболеваний (г. Ташкент)  
УкрНИИЗР — Украинский научно-исследовательский институт защиты расте-  
ний (г. Киев)  
УкрНИИЭВ — Украинский научно-исследовательский институт эксперимен-  
тальной ветеринарии (г. Харьков)  
УСХА — Украинская сельскохозяйственная академия (г. Киев)  
ЦИНАО — Центральный институт агрохимического обслуживания сельского  
хозяйства (г. Москва)

<b>Глава 11. Шестичленные гетероциклические соединения . . . . .</b>	<b>3</b>
Методические указания по определению аполло в воде, почве, плодовых культурах методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии . . . . .	3
Методические указания по определению апплауда в растительном материале (томаты, огурцы, плоды и зеленая масса), в почве, воде методом газожидкостной хроматографии . . . . .	5
Методические указания по определению атразина в зерне и зеленой массе кукурузы и сои методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии . . . . .	7
Методические указания по определению базаграна в воде методом газожидкостной хроматографии . . . . .	10
Методические указания по определению базаграна в эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии . . . . .	12
Методические указания по определению базаграна в рыбе методом тонкослойной хроматографии . . . . .	14
Методические указания по определению витавакса в зерне и воде методом тонкослойной хроматографии . . . . .	16
Методические указания по определению гидразида малеиновой кислоты в табаке фотометрическим методом . . . . .	20
Методические указания по определению голтикса в воде, почве и растениях методом тонкослойной хроматографии . . . . .	23
Методические указания по определению диквата в семенах подсолнечника методом тонкослойной хроматографии . . . . .	24
Методические указания по определению диквата в рыбе и воде методом тонкослойной хроматографии . . . . .	26
Методические указания по определению диквата в воде, молоке фотометрическим методом . . . . .	28
Методические указания по определению корбеля в воде, почве и растениях пшеницы методом тонкослойной хроматографии . . . . .	30
Методические указания по определению котофора в воде, почве, семенах хлопчатника, продуктах питания растительного происхождения и биологическом материале методом тонкослойной хроматографии и УФ-спектроскопии . . . . .	32
Временные методические указания по определению лентаграна в кукурузе, почве и воде методом тонкослойной хроматографии . . . . .	37

Методические указания по определению лонтрела в воде, почве и растениях методом газожидкостной хроматографии . . . . .	39
Методические указания по определению нитрапирина и его метаболита 6-хлорпиколиновой кислоты в воде, почве и биологическом материале методом тонкослойной хроматографии . . . . .	42
Методические указания по определению пиклорама в воде, почве, зерне и растительном материале газохроматографическим методом . . . . .	47
Методические указания по определению пикса в воде и хлопковом масле экстракционно-фотометрическим методом . . . . .	50
Методические указания по определению ресина в воде, корнеплодах и ботве свеклы методом тонкослойной хроматографии . . . . .	52
Унифицированная методика определения <i>симм</i> -триазинов в молоке методом газожидкостной хроматографии . . . . .	54
Методические указания по определению <i>симм</i> -триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М) в зерне кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии . . . . .	57
Методические указания по определению старане <sub>200</sub> в воде, почве, зерне методом тонкослойной хроматографии . . . . .	62
Методические указания по определению тербацила в продуктах растительного происхождения, вине, виноградном соке, почве, воде хроматографическими методами . . . . .	64
Методические указания по определению трифторина в растительной продукции (яблоки, огурцы), почве, воде методом тонкослойной хроматографии . . . . .	68
Методические указания по определению фадеморфа в вишне, огурцах, смородине, яблоках, воде хроматографическими методами . . . . .	71
<b>Глава 12. Систематический ход определения смесей пестицидов в одной пробе . . . . .</b>	<b>74</b>
Методические указания по определению в одной пробе фосфорорганических и хлорорганических пестицидов, применяемых на томатах, хроматографическими методами . . . . .	74
Методические указания по определению синтетических пиретроидов, фосфорорганических пестицидов, севина и беномила при совместном присутствии в плодово-овощных культурах . . . . .	80
Методические указания по систематическому газохроматографическому определению микроколичеств гербицидов различной химической природы при совместном присутствии в пробах воды, почвы и растениях . . . . .	83
Методические указания по систематическому ходу анализа биологических сред на содержание пестицидов различной химической природы . . . . .	89
Унифицированный метод определения остатков пестицидов при их совместном присутствии в пищевых рационах . . . . .	94
Методические указания по определению смеси карбофурана с беномилом и ТМТД (препарат КОМБИ) в растениях сахарной свеклы методом тонкослойной хроматографии . . . . .	97

Методические указания по определению смеси метафоса, байлетона и тилта в растениях пшеницы методом тонкослойной хроматографии . . . . .	100
Методические указания по совместному определению прометрина, бацила и трефлана в одной пробе почвы, эфирного масла и эфиромасличного сырья мяты перечной методом газожидкостной хроматографии . . . . .	101
Концентрирование экстрактов пестицидов с применением каплеуловителя . . . . .	106
<b>Глава 13. Биологический метод защиты растений . . . . .</b>	<b>107</b>
Методические указания по унифицированному методу микробиологического определения в объектах окружающей среды биологических инсектицидных препаратов на основе кристаллоспорообразующих бактерий вида <i>Бацилла турингензис</i> . . . . .	111
Методические указания по определению лепидоцида на обработанных им растениях иммунофлюоресцентным методом . . . . .	113
Методические указания по определению $\beta$ -экзотоксина в препаратах битоксибациллина . . . . .	115
Методические указания по измерению концентрации покоящихся спор энтомофторовых грибов ( <i>микоафидина</i> , <i>энтомофторина</i> ) методом световой микроскопии в воздухе рабочей зоны . . . . .	118
Методические указания по определению остаточных количеств препарата <i>вирин-диприон</i> на растительных объектах иммунофлюоресцентным методом . . . . .	119
Методические указания по определению гранул вируса гранулеза яблонной плодовой гнили на растительных объектах иммунофлюоресцентным методом . . . . .	122
Методические указания по определению остаточных количеств биопрепарата <i>вирин-КШ</i> на растительных объектах иммунофлюоресцентным методом . . . . .	124
Методические указания по определению остаточных количеств биопрепарата <i>вирин-ЭКС</i> на растительных объектах иммунофлюоресцентным методом . . . . .	127
Методические указания по определению полиэдров вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда в воде, почве, на растительных объектах и в воздухе иммунофлюоресцентным методом . . . . .	130
Методические указания по унифицированному методу иммунофлюоресцентного выявления бакуловирусов в воздухе рабочей зоны . . . . .	134
Методические указания на метод определения трихотецина в воздухе . . . . .	137
Методические указания по определению бацитрацина в воздухе рабочей зоны методом бумажной хроматографии . . . . .	138
Методические указания по определению гризина в воздухе методом диффузии в агар . . . . .	140
<b>Глава 14. Методические указания по контролю уровней и изучению динамики содержания пестицидов в почве и растениях . . . . .</b>	<b>143</b>

Контроль за содержанием остатков пестицидов в почве и растениях	143
Изучение динамики содержания остатков пестицидов в почве и растениях . . . . .	148
<b>Глава 15. Методические указания по определению пестицидов в воздухе . . . . .</b>	<b>157</b>
Методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии	157
Методические указания по измерению концентраций алара в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом . . . . .	159
Методические указания по измерению концентраций анометрина-Н в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	161
Методические указания по измерению концентраций байтана, байлетона, импакта в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	163
Методические указания по хроматографическому и хроматоспектрофотометрическому измерению концентраций беномила и БМК в воздухе рабочей зоны . . . . .	164
Методические указания по измерению концентраций бентазона в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	167
Методические указания по измерению концентраций биоресметрина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	169
Методические указания по измерению концентраций блазера (ацифлуорофена) в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии	171
Методические указания по измерению концентраций бронокота в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом . . . . .	172
Методические указания по измерению концентраций бутилкаптакса в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	174
Методические указания по измерению концентраций бутразина в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии . . . . .	177
Методические указания по измерению концентраций версамида стеариновой кислоты (ВСК) в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	178
Методические указания по измерению концентраций глина в воздухе рабочей зоны методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии . . . . .	180
Методические указания по измерению концентраций глифосата, глифосина и глицина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	182
Методические указания по измерению концентраций ГМП, ТМДИ, ГМДИ, ХГИ, АТГ, АТГ-ф в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	184
Методические указания по измерению концентраций 2,4-Д в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	186
Методические указания по измерению концентраций дактала в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	189

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций данитола в воздухе рабочей зоны . . . . .	192
Методические указания по измерению концентраций ДДТ и его производных, гексахлорбензола, изомеров ГХЦГ и метоксихлора в воздухе методом газожидкостной хроматографии . . . . .	193
Методические указания по измерению концентраций декстримина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	195
Методические указания по измерению концентраций диазинона, эптама, гамма-изомера ГХЦГ, фенмедифама, ленацила, фосфамида и пиразона при их совместном присутствии в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	197
Методические указания по измерению концентраций диметилфосфата в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	203
Методические указания по измерению концентраций дихлорбензолов и бромдиоксолана в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии . . . . .	204
Методические указания по измерению концентраций 2,4-дихлорфеноксипропионовой кислоты в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	207
Методические указания по измерению концентраций дозанкса, 3-хлор-1-метоксиналилина, 3-хлор-4-метоксинитробензола в воздухе рабочей зоны хроматографическим методом . . . . .	209
Методические указания по измерению концентраций дроппа в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	212
Методические указания по измерению концентраций зеллека в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	214
Методические указания по измерению концентраций зоокумарина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	215
Методические указания по измерению концентраций изофена и диносеба в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	217
Методические указания по измерению концентраций иллоксана в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	219
Методические указания по измерению концентраций кампозана в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	221
Методические указания по измерению концентраций 1-карбамоил-3(5)-метилпиразола и 3(5)-метилпиразола в воздухе при их совместном присутствии методом тонкослойной хроматографии . . . . .	222
Методические указания по измерению концентраций карбофурана в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	224
Методические указания по измерению концентраций кронетона в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	226
Методические указания по измерению концентраций лассо в воздухе рабочей зоны хроматографическим методом . . . . .	228
Методические указания по хроматографическому измерению концентраций маврика в воздухе рабочей зоны . . . . .	230



Методические указания по измерению концентраций метамина, сульфазина и компонентов гербицидной смеси карагарда в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	232
Методические указания по измерению концентраций 2М-4Х, 2М-4ХП и 2М-4ХМ в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом	234
Методические указания по измерению концентраций митака в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	236
Методические указания по измерению концентраций морфонола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	238
Методические указания по измерению концентраций набу в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	239
Методические указания по измерению концентраций неорона в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	241
Методические указания по измерению концентраций ниссорана в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	244
Методические указания по измерению концентраций офунака в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	245
Методические указания по хроматографическому измерению концентраций ортена в воздухе рабочей зоны . . . . .	248
Методические указания по измерению концентраций пикса в воздухе рабочей зоны экстракционно-фотометрическим методом . . . . .	250
Методические указания по измерению концентраций синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	251
Методические указания по хроматографическому измерению концентраций новых синтетических пиретроидов (данитол, фастак, циболт, карате) в воздухе рабочей зоны . . . . .	254
Методические указания по измерению концентраций продиаммина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	256
Методические указания по измерению концентраций плондрела в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	258
Методические указания по измерению концентраций протиофоса в воздухе методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии . . . . .	260
Методические указания по измерению концентраций пахтона в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	262
Методические указания по измерению концентраций рейсера в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	263
Методические указания по измерению концентраций релдана и продукта его гидролиза 3,5,6-трихлор-2-пиридинола в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	265
Методические указания по измерению концентраций ридомила в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии . . . . .	268
Методические указания по измерению концентрации ровраля в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	270
Методические указания по измерению концентраций селекрона в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	272

Методические указания по измерению концентраций соналена в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	274
Методические указания по измерению концентраций старана в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	275
Методические указания по измерению концентраций стомпа в воздухе рабочей зоны методом жидкостной хроматографии . . . . .	276
Методические указания по измерению концентраций сумилекса в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	278
Определение методом ГЖХ . . . . .	278
Определение методом ТСХ . . . . .	279
Методические указания по измерению концентраций суми-альфа в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	281
Методические указания по измерению концентраций тербацила в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	283
Методические указания по измерению концентраций тетраметилового эфира глифосина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	285
Методические указания по измерению концентраций тиодана и его метаболита тиодансульфата в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	287
Методические указания по измерению концентраций тнокарбаминновых пестицидов в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	288
Методические указания по измерению концентраций ТМТД в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	292
Методические указания по измерению концентраций толунна в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .	293
Методические указания по измерению концентраций томилона в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	294
Методические указания по измерению концентраций торка в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	296
Методические указания по измерению концентраций сим-триазинов (аметрин, мезорацил, семерон, гезаран, зенкор, игран) в воздухе рабочей зоны методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии . . . . .	298
Методические указания по измерению концентраций триаллата в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии . . . . .	300
Методические указания по методам измерения концентраций триамелона в воздухе рабочей зоны . . . . .	302
Методические указания по измерению концентраций триморфамида в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами . . . . .	305
Методические указания по измерению концентраций трифумина и его метаболитов в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .	308
Методические указания по измерению концентраций фозалона и полупродуктов его производства бензоксазона и 3-оксиметил-6-хлорбен-	

<b>воксалонон в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .</b>	<b>310</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций фоксима в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .</b>	<b>312</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций фоспинола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .</b>	<b>314</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций хостаквика в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .</b>	<b>316</b>
<b>Методические указания по хроматографическому измерению концентраций цвида в воздухе рабочей зоны . . . . .</b>	<b>317</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций диодрина в воздухе рабочей зоны методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии . . . . .</b>	<b>319</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций эвисекта в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .</b>	<b>321</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций этоксилина в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом . . . . .</b>	<b>323</b>
<b>Методические указания по измерению концентраций этилового эфира ацетоуксусной кислоты в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии . . . . .</b>	<b>324</b>
<b>Приложения . . . . .</b>	<b>326</b>
<i>Приложение 1. Нормативно-техническая документация на реактивы и материалы . . . . .</i>	<i>326</i>
<i>Приложение 2. Нормативно-техническая документация на посуду лабораторную . . . . .</i>	<i>329</i>
<i>Приложение 3. Нормативно-техническая документация на приборы и аппаратуру . . . . .</i>	<i>329</i>
<i>Приложение 4. Санитарно-гигиенические нормы содержания пестицидов в продуктах питания, воздухе, воде и почве . . . . .</i>	<i>330</i>
<i>Приложение 5. Перечень пестицидов, применение которых запрещено или строго ограничено Министерством здравоохранения СССР . . . . .</i>	<i>363</i>
<i>Приложение 6. Расчет погрешности измерения концентраций . . . . .</i>	<i>369</i>
<i>Приложение 7. Учетная карточка динамики пестицидов . . . . .</i>	<i>373</i>
<b>Предметный указатель . . . . .</b>	<b>377</b>
<b>Список сокращенных названий научных учреждений, встречающихся в справочнике . . . . .</b>	<b>404</b>

Справочное издание

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ  
ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ,  
КОРМАХ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ**

Справочник. Том 2

Составители:

Клисенко Марта Архиповна,  
Калинина Альбина Акимовна,  
Новикова Кира Федоровна,  
Хохлова Галина Алексеевна

Зав. редакцией **А. С. Максимова**

Художественный редактор **А. И. Бершачевская**

Технический редактор **В. А. Боброва**

Корректор **Г. В. Абатурова**

**ИБ № 7725**

Сдано в набор 27.12.90. Подписано к печати 05.11.91.  
Формат 60×88<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн. Гарнитура Ли-  
тературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,48.  
Усл. кр.-отт. 25,48. Уч.-изд. л. 37,52. Изд. № 103.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 758. Цена 15 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени ВО «Агро-  
промиздат», 107807, ГСП-6, Москва, Б-78, ул. Са-  
довая-Славская, 18.

Московская типография № 11 Министерства печати  
и массовой информации РСФСР.  
113105, Москва, Нагатинская ул., д. 1.