

СПРАВОЧНИК

МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИКРОКОЛИЧЕСТВ
ПЕСТИЦИДОВ
В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ,
КОРМАХ
И ВНЕШНЕЙ
СРЕДЕ

Том 1

СПРАВОЧНИК

МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИКРОКОЛИЧЕСТВ
ПЕСТИЦИДОВ
В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ,
КОРМАХ
И ВНЕШНЕЙ
СРЕДЕ

В ДВУХ ТОМАХ

Том 1



МОСКВА, ВО «КОЛОС»,
1992

ББК 41.4

М54

УДК 631.58 (035)

Составители: М. А. Клисунко, А. А. Калинина, К. Ф. Новикова, Г. А. Хохолькова

Редакторы: А. А. Белоусова, Е. М. Козина

M54 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. – Т. 1/Сост. Клисунко М. А., Калинина А. А., Новикова К. Ф. и др. – М.: Колос, 1992. – 567 с.: ил.

ISBN 5-10-002343-0

В первый том справочника включены официально утвержденные методики определения галогенсодержащих углеводородов; органических соединений фосфора и олова; аминов и солей четвертичных аммониевых оснований; кетонов, спиртов, нитрофенолов, простых эфиров; алифатических, алициклических, ароматических кислот и их производных; арилоксиалканкарбоновых кислот и их производных; производных карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовой кислот; производных мочевины, тиомочевины и сернистой кислоты; пятичленных гетероциклических соединений.

4105020000-058

М ————— 18-92
035(01)-92

ББК 41.4

ISBN 5-10-002343-0 (т. 1)
ISBN 5-10-002772-X

© М. А. Клисунко, А. А. Калинина,
К. Ф. Новикова, Г. А. Хохолькова,
составление, 1992

СОКРАЩЕНИЯ

ГЖХ – газожидкостная хроматография

д.в. – действующее вещество

ДПР – детектор постоянной скорости рекомбинации

ДСД – допустимая суточная доза

ДЭЗ – детектор электронно-захватный

МДУ – максимально допустимый уровень

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПИД – пламенно-ионизационный детектор

ПФД – пламенно-фотометрический детектор

СФ – спектрофотометрический

ТИД – термо-ионный детектор

т.кип. – температура кипения

т.пл. – температура плавления

ТХХ – тонкослойная хроматография

ТХХЭ – хроматоэнзимная тонкослойная хроматография

УФ – ультрафиолетовый

ФОП – фосфорогенные пестициды

ХОИ – хлорогенные инсектициды

ХОП – хлорогенные пестициды

х.ч. – химически чистый

ч. – чистый

ч.д.а. – чистый для анализа

ПРЕДИСЛОВИЕ

Экологические последствия использования пестицидов, их неблагоприятное влияние на здоровье населения хорошо известны. Одно из мероприятий, направленных на обеспечение безопасного применения этих веществ, – контроль за содержанием остаточных количеств препаратов в сельскохозяйственной продукции, продуктах питания, кормах, внешней среде. В соответствии с законодательными актами в нашей стране контроль за содержанием пестицидов возложен на контрольно-токсикологические лаборатории станций защиты растений, отделы токсикологии проектно-изыскательских станций химизации сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологические станции, лаборатории.

Систематически выпускаются справочные издания по методам определения микроколичеств пестицидов. В настоящем выпуске обобщены рекомендации отечественных специалистов по определению остаточных количеств пестицидов в различных средах, апробированные и одобрены группой экспертов и имеющие законодательный характер. Всё методические указания утверждены органами санитарно-эпидемиологической службы. Перед назнанием каждой методики приведены дата утверждения и номер. В отличие от предыдущих выпусков (1977 и 1983 гг.) в книгу включены унифицированные методики определения отдельных групп препаратов, рекомендованных специалистами, сотрудничающими в области агропромышленного комплекса по проблеме «Гигиена и токсикология пестицидов, изучение возможных отрицательных последствий применения пестицидов и их профилактика».

Методики предназначены для контроля за остаточными количествами пестицидов в экспортируемой продукции, но могут быть использованы также для контроля качества отечественной продукции. Методические указания сгруппированы по классам определяемых соединений, а внутри каждого подраздела для удобства пользования пестициды расположены по алфавиту. Такая форма изложения позволяет сделать обобщения по методам определения важнейших классов пестицидных препаратов. Методы определения биологических средств защиты растений выделены в специальный раздел во втором томе.

В сборник включены методики определения в продуктах питания, кормах, сельскохозяйственной продукции, воде, почве, воздухе, биологическом материале пестицидов различного химического строения в одной пробе, методики определения групп препаратов, близких по строению, методики определения в одной пробе смесей препаратов, используемых в интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, а также методики определения отдельных препаратов.

Методические указания включают краткую характеристику физико-химических свойств препарата, описание принципа метода определения, перечень необходимых реактивов и приборов, детальное изложение техники определения и способа расчета результатов анализа. Государственные стандарты на химические реагенты, аппаратуру и приборы периодически изменяются в связи с истечением срока годности, поэтому описание текущей нормативно-технической документации на реагенты и приборы вынесено в Приложение.

Предусмотрено, что при использовании всех методик пробы отбирают в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов», утвержденными 21.08.79 № 2051-79.

При определении остаточных количеств пестицидов необходимо руководствоваться Правилами устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) системы здравоохранения, № 2455-81 от 20.10.81.

В связи с важностью получения сопоставимых данных об остаточных количествах пестицидов для решения вопросов о возможности и путях реализации продукции растениеводства по назначению во втором томе приведены методические указания по контролю уровней и изучению динамики содержания пестицидов в почве и растениях, а также перечень утвержденных санитарно-гигиенических норм максимально допустимых уровней содержания пестицидов в пищевых продуктах (МДУ) и предельно допустимые концентрации пестицидов (ПДК) в почве и воде.

Книга предназначена для работников лабораторий, занимающихся контролем остаточных количеств пестицидов. Она полезна агрономам, врачам, биологам, химикам и другим специалистам, занятым защитой растений, охраной окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия пестицидов на население.

Утверждено 10.10.79

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ)

Настоящие методические указания распространяются на методики определения содержания пестицидов в продуктах питания, воде, почве, кормах, биологическом материале, воздухе.

Указания устанавливают единые требования к построению, содержанию, изложению нормативных документов (аттестатов, технических условий, методических указаний) на методики определения содержания пестицидов в продуктах питания, кормах и объектах внешней среды,

требования к приборам, реактивам, к подготовке и проведению анализа, обработке результатов, метрологическому обеспечению.

Общие положения. Нормативные документы на методики определения содержания пестицидов в пищевых продуктах, кормах и объектах природной среды должны соответствовать современным требованиям нормативно-технической документации, принятым в нашей стране и международных организациях.

В документы нужно включать современные методы, проверенные в экспериментальных и производственных условиях, имеющие метрологическое обеспечение. Следует предусматривать использование приборов, прошедших государственные испытания, внесенных в Государственный реестр и выпускаемых серийно, а также приборов, требования к которым установлены в Государственных стандартах и нормативно-технической документации. Целесообразно предусматривать приборы с регистрацией показаний в форме, пригодной для статистической обработки, в том числе с выходом на вычислительные устройства.

В методики определения содержания пестицидов в пищевых продуктах, кормах и объектах окружающей среды необходимо включать аналогичные по точности дублирующие методики для повышения достоверности идентификации и для того, чтобы можно было использовать имеющиеся приборы.

В методики следует включать требования по обеспечению безопасности труда и производственной санитарии.

Срок действия временных нормативных документов устанавливается до утверждения гигиенических регламентов.

Единые требования к методикам. Нормативный документ должен содержать вводную часть и следующие разделы: «Краткая характеристика препарата», «Принцип метода», «Метрологическая характеристика метода», «Избирательность метода», «Реактивы и растворы», «Приборы и посуда», «Подготовка к определению», «Ход анализа», «Обработка результатов анализа», «Требования безопасности».

В заглавии должны найти отражение наименование пестицида, объекты анализа и принцип метода определения (например, «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в почве хроматографическим методом»).

Вводная часть должна отражать назначение и область применения методики (или методик). Она должна содержать: характеристику действующего вещества (или действующих веществ); общепринятое название (Сомоп пате) и название по Госту; химическое название; структурную и эмпирическую формулы, молекулярную массу; синонимы или торговые названия; физические и химические свойства – цвет, запах, температуру кипения, упругость паров, стабильность, растворимость в воде и основных органических растворителях, коэффициенты распределения (если они известны); допустимую суточную дозу, максимально допустимые уровни и предельно допустимые концентрации; особые токсические свойства (возможность образования метаболитов с большей токсичностью и их характеристика); область применения пестицида; группу пестицида и перечисление культур, на которых его применяют (например, послевсходовый гербицид на посевах картофеля).

Раздел «Принцип метода» должен отражать принцип, на котором основана методика, с указанием основных параметров определения и

возможности определения основных токсических метаболитов (например: «Методика основана на хроматографировании ДДТ и его метаболитов ДДД и ДДЕ в тонком слое силикагеля в системе гексан – ацетон после экстракции из увлажненной почвы смесью растворителей н-гексан – ацетон и очистки экстракта концентрированной серной кислотой»).

Если действующее начало определяется в сумме с его токсическими метаболитами, следует их перечислить.

Раздел «Метрологическая характеристика метода» должен отражать следующие параметры: диапазон определяемых концентраций; предел обнаружения в мкг; предел обнаружения в мг/кг, мг/л или мг/м³ (пределы обнаружения, кроме оговоренных специально случаев, не должны превышать МДУ или ПДК); среднее значение определения стандартных количеств пестицидов в пробе в % (для установления процента определения на различных культурах следует проводить анализ типичных представителей, а в случае узкой области применения пестицида – на тех культурах, для которых предназначены пестициды; число параллельных определений (*n*) не должно быть менее 5); стандартное отклонение; относительное стандартное отклонение; доверительный интервал среднего (при *p* = 0,95 и *n* = 5).

Среднее значение определения стандартных количеств и доверительный интервал среднего приводятся для трех концентраций: равной МДУ; равной удвоенному пределу обнаружения; равной половине МДУ (ПДК), если она выше предела обнаружения или, если МДУ (ПДК) не установлены, для трех концентраций в определенном диапазоне концентраций.

В разделе «Избирательность метода» характеризуют избирательность метода в присутствии пестицидов, близких по химическому строению и области применения. Если имеются мешающие определению примеси, дают (по возможности) их описание и указывают концентрацию, с которой начинает сказываться их влияние.

Раздел «Реактивы и растворы» должен содержать перечень применяемых реактивов и материалов с указанием степени их чистоты в соответствии с существующими стандартами, научно-технической документацией, а также растворов с указанием сроков хранения и необходимого количества.

В методиках газохроматографического определения остаточных количеств пестицидов должны быть указаны типы хроматографа и детектора и его селективность; материал, длина и диаметр хроматографической колонки.

В методиках по определению остатков пестицидов методом тонкослойной хроматографии должны быть указаны размеры пластинок, толщина слоя, марка сорбента и его зернение.

В методиках по определению остатков пестицидов оптическими методами должны быть указаны тип прибора, тип и размеры кювет и тип катодной лампы (атомно-абсорбционная спектрофотометрия).

Раздел «Подготовка к определению» должен содержать требования ко всем подготовительным работам, предшествующим определению остаточного количества пестицидов: приготовлению стандартных, градуировочных и других растворов с указанием сроков их хранения; очистке растворителей; приготовлению хроматографических пластинок и наса-

док; кондиционированию хроматографических колонок; построению градуировочных графиков.

При использовании способов очистки растворителей, отличающихся от общепринятых, должно быть дано подробное описание.

Раздел должен содержать требования к установке и подготовке всех средств определения в соответствии со стандартами и научно-технической документацией, с учетом требований безопасности.

Установление зависимости аналитического сигнала от содержания определяемого вещества, построение градуировочного графика необходимо проводить в соответствии со стандартами и Научно-технической документацией на приборы.

Раздел «Ход анализа» должен содержать конкретные, подробные сведения о порядке выполнения всех операций по определению содержания остаточных количеств пестицидов в отобранных пробах пищевых продуктов, кормах, воде, почве.

Раздел должен содержать следующие подразделы: «Озоление, гидролиз пробы» (в случае необходимости), «Экстракция и очистка экстрактов» и др.

В методиках определения микроколичеств пестицидов методом газовой хроматографии следует приводить условия хроматографирования, а именно: необходимые газы и скорости их потока (мл/мин); температура термостата колонки, детектора, испарителя (°C); вводимые в испаритель объемы упаренных экстрактов; время удерживания – абсолютное и относительное (среднее из трех определений); способ построения градуировочного графика; линейный динамический диапазон детектирования; способ количественного определения.

В методиках определения остаточных количеств пестицидов хроматографией в тонком слое нужно приводить способы приготовления хроматографических пластинок: условия нанесения пробы на пластинку; условия хроматографирования; вид хроматографической камеры; подвижная фаза; способ и степень насыщения парами подвижного растворителя; длина пробега растворителя; проявляющий реагент; способ обработки хроматограмм (нагревание, облучение УФ-светом и т.п.); величина *n* (среднее из 5 определений); способ количественного определения. При использованииdensитометра приводятся его основные параметры.

При фотоколориметрическом и спектрофотометрическом определениях способ приготовления градуировочных растворов должен быть представлен в виде таблицы и указана длина волны, при которой измеряется оптическая плотность градуировочных растворов.

Для повышения надежности идентификации пестицидов методика должна включать альтернативные способы очистки экстракта. Методика газохроматографического определения остаточных количеств пестицидов должна включать анализ не менее чем на двух хроматографических колонках, заполненных неподвижными фазами различной полярности. Методика определения остаточных количеств пестицидов методом тонкослойной хроматографии должна включать, как правило, альтернативные условия хроматографирования (разные сорбенты, проявляющие реагенты, не менее двух подвижных растворителей).

Раздел «Обработка результатов анализа» должен содержать сведения по обработке полученных данных и расчетные формулы. Содержание

остатков пестицидов в анализируемой пробе вычисляют как среднее из двух-трех параллельных определений. Результаты определения остаточных количеств пестицидов по действующему началу суммируют с результатом определения токсичных метаболитов в пересчете на исходное действующее вещество.

Содержание токсичных метаболитов в анализируемом субстрате определяют раздельно от исходного действующего вещества в том случае, если для них утверждены максимально допустимые уровни остаточных количеств.

Раздел «Требования безопасности» должен содержать специальные правила безопасности при выполнении операций определения содержания остаточных количеств и соответствовать «Правилам устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава СССР» № 2455-81 от 20.10.81.

В методических указаниях должны содержаться сведения об авторе или авторских коллективах, принимавших участие в разработке методики (фамилия, и., о., место работы).

Если в разработке методики принимало участие несколько авторских коллективов, то их нумерация приводится в тексте методики в соответствующих разделах арабскими цифрами, а ссылки даются в скобках.

Если какая-либо часть методики утверждалась ранее, то следует указать номер утверждения и дату.

Для разработки методики определения микроколичеств пестицидов следует использовать типичные для анализируемых субстратов объекты:

Семечковые фрукты	Яблоки
Косточковые плоды	Сливы, вишни, персики
Ягоды	Черная смородина
Мягкие плоды	Клубника
Капуста	Белокочанная капуста
Листовые овощи	Шпинат, салат
Корнеплоды	Морковь
Плодовые овощи	Томаты
Тыквенные	Огурцы
Бобовые	Горох
Зерновые	Пшеница, кукуруза
Кормовые растения	Фураж, кормовые концентраты
Продукты переработки масличного сырья	Жмыхи, шроты, фосфатидные концентраты, лузга
Растительные масла	Подсолнечное масло
Специальные культуры	Определяются в соответствии с областью применения
Продукты животного происхождения	Жир, печень, мышечная ткань (мясо), яйца, молоко
Почва	С большим и малым содержанием гумуса
Вода	Питьевая вода
Воздух	Воздух рабочей зоны и атмосферный

При разработке методических указаний по определению остаточных количеств пестицидов, применяемых на небольшом числе культур, среднее значение определения устанавливают для каждой культуры. Широкое применение пестицидов на различных культурах предполагает установление среднего значения определения для наиболее типичных объектов, которые выбирают в соответствии с присущим содержанием в них растительных восков и масел, животных жиров, гумуса, пигментов и других коэкстрактивных веществ. В соответствии с этим методические указания практически могут быть использованы для анализа других объектов из субстратов указанного вида.

**УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЙЛЕТОНА,
БАЙТАНА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВОДЕ
И ПОЧВЕ МЕТОДАМИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ И ТОНКОСЛОЙНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ***

Краткая характеристика препаратов представлена в таблице 112. ДСД байлстона 0,03 мг/кг. В огурцах, томатах МДУ 0,5 мг/кг, яблоках – 0,05, винограде – 0,1 мг/кг. В землянике и смородине остаточные количества байлстона не допускаются.

112. Краткая характеристика препаратов

Торговое название	Общепринятое название	Химическое название	Брутто формула (молекулярная масса)	T.пл., °C	Растворимость при 20 °C, г/л
Байлтон	Триадимесфон	3,3-Диметил-1-(III-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2	$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$ (293,8)	82,3	В воде – 0,26, толуоле – 400, циклогексаноне – 600
Байтан	Триадименол	3,3-Диметил-1-(III-1,2,3-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2	$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$ (295,8)	112	В воде – 0,12, толуоле – 40, циклогексаноне – 400

Принцип метода. Метод основан на извлечении байлстона и байтана из воды хлороформом, а из овощей, фруктов, зерна и почвы с большим содержанием гумуса – смесью гексана с ацетоном (4 : 1), очистке экстракта перераспределением фунгицидов в хлороформ, а затем на колонке с оксидом алюминия и определении тонкослойной или газожидкостной хроматографией с ТИД или ДЭЗ. Из почвы с низким содержанием гумуса препараты извлекают смесью ацетона с раствором хлорида кальция и после вымораживания фунгициды перераспределяют в гексан и определяют методами ГЖХ или ТСХ.

* Настоящая методика рекомендуется наряду с официальными методами определения остаточных количеств. Унифицированная методика подготовлена специалистами СССР на основе национальной методики, разработанной авторским коллектиком ВИИИХСЗР, ВНИИГИИТОКС, ВИЗР, АриИИИЗР.

Метрологическая характеристика метода. Метрологические данные представлены в таблицах 113, 114.

Реактивы и растворы. Ацетон х.ч. и-Гексан х.ч. Хлороформ х.ч. Этилацетат х.ч. Четыреххлористый углерод. Хлорид кальция ч.д.а., 0,05 н. раствор. Хлорид натрия ч.д.а. Сульфат натрия безводный ч.д.а. Оксид алюминия II степени активности по Брокману,нейтральный.

Стандартные растворы триадимесфона и триадименола в ацетоне с содержанием 1000; 100 и 10 мкг/мл. Стабильны при хранении в холодильнике в течение 6 мес.

Все растворители должны быть свежеперегнанными.

Для газожидкостной хроматографии: носитель хроматон N-супер (0,16–0,20 мм); хроматон N-AW-DMCS и HMDS (0,20–0,25 мм); хроматон N-AW (0,125–0,160 мм). Стационарные фазы SE-30, XE-60, карбовакс 20 М. Газообразный азот особой чистоты или гелий в баллоне. Водород из баллона или получаемый из генератора

113. Метрологическая характеристика определения байтана методом газожидкостной хроматографии (предел обнаружения 3 нг)

Анализируемая проба	Диапазон измеряемых концентраций, мг/кг или мг/л	Среднее значение определения при $n = 15$, %
Картофель	0,02–0,4	84,9
Фрукты (яблоки, виноград и др.)	0,02–0,6	80,6
Овощи (огурцы, помидоры, перцы)	0,02–0,6	86,8
Зерно	0,1–3,0	75,4
Почва	0,2–5,0	85,1
Вода	0,001–0,02	90,4

Продолжение

Анализируемая проба	Стандартное отклонение при $n = 15$, %	Доверительный интервал среднего определения при $p = 0,95$, $n = 5$, %
Картофель	±8,2	±10,1
Фрукты (яблоки, виноград и др.)	±6,9	±8,5
Овощи (огурцы, помидоры, перцы)	±9,8	±12,2
Зерно	±4,3	±5,4
Почва	±6,7	±8,3
Вода	±7,4	±9,2

114. Метрологическая характеристика метода определения байлетона

Анализируемая проба	Диапазон измеряемых концентраций, мг/кг или мг/л	Предел обнаружения, нг (ГЖХ), мкг (ТСХ)	Среднее значение определения при $n = 15$, %	Стандартное отклонение при $n = 15$, %	Доверительный интервал среднего определения при $p = 0,95$, $n = 5$, %

Метод газожидкостной хроматографии

Картофель	0,01–0,34	2	81,5	$\pm 6,4$	$81,5 \pm 7,9$
Яблоки	0,01–0,34	2	92,3	$\pm 7,9$	$92,3 \pm 9,8$
Цитрусовые	0,01–0,34	2	84,0	$\pm 9,0$	$84,0 \pm 11,1$
Зерно	0,05–1,7	2	90,0	$\pm 7,4$	$90,0 \pm 9,2$
Зеленая раститель- ная масса	0,1–3,4	2	81,7	$\pm 5,8$	$81,7 \pm 7,2$
Почва	0,05–1,7	2	91,6	$\pm 7,7$	$91,6 \pm 9,5$
Вода	0,002–0,0034	2	89,3	$\pm 6,2$	$89,3 \pm 7,7$

Метод тонкослойной хроматографии

Картофель	0,04–0,16	2	79	± 3	79 ± 4
Яблоки	0,02–0,16	1	81	± 8	81 ± 10
Цитрусовые	0,06–0,16	3	91	± 10	91 ± 12
Зерно	0,3–1,6	3	85	± 10	85 ± 12
Почва	0,2–1,6	2	88	± 8	88 ± 10
Вода	0,002–0,016	1	91	± 7	91 ± 9
Лекарст- венные растения	0,01–0,1	0,5	86	± 5	86 ± 6

водорода. Воздух из баллона или нагнетаемый компрессором. Для тонкослойной хроматографии: ацетон ч.д.а. и-Гексан ч.д.а. Бензол ч.д.а. Этилацетат ч.д.а. Толуол ч.д.а. Хлороформ ч.д.а. Изооктан ч.д.а. Уксусная кислота ч.д.а. Нитрат серебра ч.д.а. Бромфениловый синий ч.д.а. Аммиак. Лимонная кислота, 1%-ный раствор. Проявляющий реагент (приготовление). Перед применением смешать в равных объемах 0,4%-ный ацетоновый раствор бромфенилового синего с 2%-ным водным раствором азотно-кислого серебра. Раствор хранят в темной склянке.

Приборы и посуда. Для экстракции и очистки экстракта. Мерная посуда I класса точности. Ротационный вакуумный испаритель. Аппарат для встряхивания. Почвенное сито. Колонки хроматографические стеклянные с краном и оттянутым носиком длиной 10 см, внутренним диаметром 1 см. Воронки делительные на 1000 и 100 мл. Колбы: круглодонные на 500 и 50 мл; плоскодонные на

250 и 100 мл; грушевидные на 50 мл. Для газожидкостной хроматографии. Газожидкостный хроматограф с ТИД и ДЭЗ. Колонки хроматографические стеклянные длиной 150, 110 и 100 см, внутренним диаметром 3 мм. Микрошприц на 10 мкл. Для тонкослойной хроматографии. Хроматографическая камера с пришлифованной крышкой. Пульверизатор. Микрошприц на 100 мкл. Стеклянные пластинки «Силуфол» размером 20 × 20 см. Термостат. Градуированные пробирки с пришлифованными пробками.

Стеклянная посуда перед использованием тщательно моется хромовой смесью (5%-ный раствор бихромата калия в концентрированной серной кислоте), затем многократно промывается сначала водопроводной, а затем дистиллированной водой.

Отбор проб и подготовка их к анализу. Пробы сельскохозяйственной продукции, воды и почвы хранят в холодильнике не более 5 дней. Каждую пробу воды отбирают в стеклянную бутылку с притертой пробкой вместимостью не меньше 1 л. Для анализа картофеля, огурцов, томатов, персиков, яблок, цитрусовых из отдельных клубней или плодов средней пробы ножом вырезают сектора толщиной 2–3 мм и измельчают их. Для анализа винограда отбирают по 2–3 ягоды от каждой грозди и также измельчают ножом. Подготавливают по 3–5 параллельных навесок анализируемых образцов массой 50 г. Зеленую массу растений измельчают ножом на полоски длиной 0,5–0,7 см и подготавливают навески массой 5 г. Зерно измельчают на кофейной мельнице до консистенции муки грубого помола и отбирают навеску массой 10 г. Почву просеивают через почвенное сито и отбирают навески массой 10–20 г.

Ход анализа. Экстракция и очистка экстрактов. Навеску анализируемой пробы из картофеля, огурцов, томатов, яблок, цитрусовых, персиков, винограда (50 г) помещают в плоскодонную колбу вместимостью 500 мл, заливают 100 мл этилацетата и проводят экстракцию триадимесона и триадименола с помощью механического встряхивания в течение 20 мин. Экстракт фильтруют в круглодонную колбу вместимостью 500 мл. Еще дважды повторяют операцию тем же количеством растворителя. Этилацетат из экстракта с помощью ротационного вакуумного испарителя удаляют полностью. Остаток количественно, при помощи 25 мл ацетона, переносят в делительную воронку на 200 мл, добавляют 50 мл дистиллированной воды, 0,5 чайной ложки хлорида натрия и 20 мл хлороформа. Делительную воронку закрывают стеклянной пробкой и ее содержимое энергично встряхивают. После разделения слоев нижний хлороформный слой переносят в коническую колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяют еще 2 раза тем же количеством хлороформа. Объединенный хлороформный экстракт сушат над безводным сульфатом натрия (10–15 г), фильтруют через бумажный фильтр в круглодонную колбу вместимостью 100 мл и отгоняют растворитель досуха при помощи роторного испарителя. К сухому остатку добавляют 2–3 мл четыреххлористого углерода и проводят очистку на колонке с оксидом алюминия.

Хроматографическую колонку готовят следующим образом. В стеклянную хроматографическую колонку помещают ватный тампон, затем суспензию оксида алюминия в четыреххлористом углероде (при открытом кране). Когда сорбент заполнит всю колонку, избытку растворителя дают стечь, оставляя маленький слой (0,2–0,3 см) на поверхности

оксида алюминия. Кран закрывают. Колонка готова к работе. Полученный раствор переносят в колонку, стенки колбы обмывают несколько раз небольшими порциями четыреххлористого углерода, общим объемом 2 мл, и также переносят на колонку. Открывают кран колонки, дают раствору полностью впитаться в сорбент. Колонку промывают 10 мл смеси четыреххлористый углерод – бензол – гексан (1 : 1 : 1) со скоростью 1 кап/с. Равномерность потока растворителя обеспечивается вакуумом, регулируемым водоструйным насосом. Поменяв приемную колбу на грушевидную, вместимостью 20 мл, элюируют с колонки триадимсфон и триадименол 25 мл этилацетата. С помощью ротационного вакуумного испарителя из грушевидной колбы полностью отгоняют растворитель. К сухому остатку пипеткой добавляют 0,5 мл ацетона. Колбочку закрывают пробкой на щлифе и стенки колбы тщательно обмывают растворителем. Определение триадимефона и триадименола в полученной пробе проводят методом ГЖХ или ТСХ.

Навеску размолотого на кофейной мельнице зерна (10 г) помещают в плоскодонную колбу вместимостью 250 мл и трижды проводят экстракцию триадимефона и триадименола этилацетатом порциями по 50 мл при помощи механического встряхивания колбы в течение 30 мин. Все остальные операции проводят, как описано для экстракции из картофеля.

К 20 г почвы с малым содержанием гумуса, помещенной в коническую колбу, добавляют 50 мл смеси ацетона с 0,05 н. водным раствором хлорида кальция (1 : 1) и экстрагируют триадимсфон с помощью механического встряхивания колбы в течение 1 ч. Колбу с экстрактом помещают в морозильную камеру бытового холодильника на 1 ч. Затем экстракт фильтруют через вату в делительную воронку. Фунгициды экстрагируют из фильтрата трижды гексаном порциями по 20–25 мл. Гексановые фракции фильтруют через слой безводного сульфата натрия в грушевидную колбу на 100 мл. Из колбочки с помощью ротационного вакуумного испарителя полностью отгоняют растворитель. К сухому остатку пипеткой добавляют 1–2 мл гексана. Далее проводят определение методом ГЖХ.

К 10 г почвы с большим содержанием гумуса, растертой в фарфоровой ступке, добавляют 2 мл дистиллированной воды. Экстракцию триадимефона и триадименола проводят трижды смесью гексан – ацетон (4 : 1) порциями по 50 мл при механическом встряхивании колбы в течение 30 мин. Все дальнейшие операции проводят, как описано выше для экстракции из картофеля.

Воду (500 мл) помещают в делительную воронку на 1 л, добавляют 1 чайную ложку хлорида натрия и 50 мл хлороформа. Смесь в течение нескольких минут энергично встряхивают. После разделения слоев нижний хлороформный слой сливают в плоскодонную колбу на 250 мл. Экстракцию триадимсфона и триадименола проводят еще 2 раза тем же количеством хлороформа. Объединенный хлороформный экстракт сушат над безводным сульфатом натрия (10 г). Раствор сливают через бумажный фильтр в круглодонную колбу вместимостью 250 мл. Сульфат натрия промывают небольшими порциями хлороформа (10–12 мл) и сливают фильтрат в круглодонную колбу. Из объединенного раствора с помощью ротационного вакуумного испарителя полностью отгоняют растворитель. К сухому остатку пипеткой добавляют 2–3 мл четыреххлористого угле-

рода и проводят очистку на колонке с оксидом алюминия и все последующие операции, как описано выше для экстракции из картофеля.

Методы аналитического определения. Метод ГЖХ. В хроматограф вводят 1–3 мкл полученного раствора.

Условия хроматографирования. Хроматограф «Цвет-106» с ТИД и ДЭЗ.

Насадки колонок: I колонка – 3% SE-30 на хроматоне N-супер (0,20–0,26 мм); II колонка – 5% SE-30 на хроматоне N-AW (0,125–0,160 мм); III колонка – 5% XE-60 на хроматоне N-AW-DMCS (0,20–0,25 мм); IV колонка – 3% карбовакса 20 М на хроматоне N-AW-HMDS (0,20–0,25 мм). Конкретные параметры работы устанавливаются в зависимости от применяемого прибора. Ниже представлены условия хроматографирования на приборе «Цвет-106» с ТИД и ДЭЗ на различных колонках (табл. 115).

115. Условия хроматографирования

Параметры	ТИД, 3% SE-30	ДЭЗ, 5% SE-30	ТИД, 5% ХЕ-60	ТИД, 5% карбовакса 20 М
Длина и внутренний диаметр колонки, см × мм	150 × 3	100 × 3	110 × 3	110 × 3
Рабочая шкала электрометра, А	$2 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-10}$
Скорость протяжки ленты самописца, мм/ч	240	240	240	240
Скорость потока азота, мл/мин	60	43	30	75
Скорость потока водорода, мл/мин	15	–	13–14	13–14
Скорость потока воздуха, мл/мин	400	–	400	400
Температура, °С:				
колонки	220	220	220	190
испарителя	220	240	230	200
детектора	–	250	–	–
Объем вводимой пробы, мм	3	1–2	3	3
Время удерживания триадимефона	2 мин 37 с	2 мин	35 мин 35 с	1 мин 55 с
То же триади-менола	3 мин 25 с	–	5 мин 50 с	4 мин 43 с
Линейный диапазон определения, нг:				
триадимефона	1–40	0,5–10	2–50	1–30
триадименола	2–80	–	3–70	3–70

Количественное определение проводят методом соотношения со стандартом по высоте пика при работе на ТИД и методом абсолютной калибровки по градуировочному графику при работе на ДЭЗ.

Для определения остаточных количеств пестицидов методом ТСХ ацетоновый раствор концентрируют на горячей водяной бане до объема 0,05 мл. Оставшуюся каплю количественно, при помощи стеклянного капилляра, наносят на пластинку «Силуфол». Справа и слева от рабочей пробы стеклянным капилляром наносят серию стандартов препаратов с содержанием 1; 2; 3; 4; ...; 8 мкг, которые готовят следующим образом. Из стандартного раствора триадимесфона и триадименола с содержанием 10 мкг/мл в пробирки с оттянутым носиком пипеткой вносят последовательно 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; ...; 0,8 мл и концентрируют растворы на горячей водяной бане до объема 0,05 мл. Сконцентрированные стандарты наносят на пластинку аналогично рабочей пробе. Пластинку помещают в хроматографическую камеру и развивают хроматограмму в системе растворителей бензол – этилацетат (3 : 1), гексан – ацетон (4 : 1). После окончания хроматографирования пластинку сушат на воздухе, а затем опрыскивают из пульверизатора проявляющим реагентом до появления синего фона на пластинке, после чего опрыскивают пластинку 1%-ным раствором лимонной кислоты. Триадимесфон и триадименол проявляются на пластинке в виде синих пятен на лимонно-желтом фоне с R_f $0,12 \pm 0,03$ и $0,78 \pm 0,09$ в первой системе растворителей, R_f $0,28 \pm 0,05$ и $0,56 \pm 0,05$ – во второй. Пятна стабильны в течение 5–7 мин. Линейность определения сохраняется в пределах 1–8 мкг. При более высокой концентрации хроматографируют аликовитную часть раствора.

Обработка результатов анализа. Газохроматографическое определение. При работе на ТИД содержание триадимесфона и триадименола в анализируемой пробе (X , мг/кг или мг/л) вычисляют по формуле

$$X = \frac{C_{ct} H_{np} V_2}{H_{ct} V_1 P},$$

где C_{ct} – количество стандарта, введенного в хроматограф, нг; H_{np} , H_{ct} – высоты пиков соответственно рабочей пробы и стандарта, мм; V_2 – общий объем рабочего раствора, мл; V_1 – объем аликовиты, вводимой в хроматограф, мкл; P – навеска или объем анализируемого образца, г или мл.

При работе на ДЭЗ расчет результатов определения проводят по формуле

$$X = \frac{AV_2}{V_1 P},$$

где A – количество триадимесфона, найденное в хроматографической пробе по градуировочному графику, нг.

Если при введении в хроматограф получаются слишком большие пики или происходит «зашкаливание», к рабочему раствору пипеткой добавляют известное количество ацетона и анализируют более разбавленный раствор.

Определение методом тонкослойной хроматографии. Количество триадимефона и триадименол в пробе определяют путем сравнения площади и интенсивности окраски пятен рабочей пробы и серии стандартов. При большом содержании триадимефона на пластинку наносят аликвотную часть раствора из 0,5 мл рабочей пробы. Содержание триадимефона в анализируемой пробе (X , мг/кг или мг/л) вычисляют по формуле

$$X = \frac{AV_2}{V_1P} ,$$

где A – количество триадимефона, найденное в хроматографируемой пробе, мкг; V_2 – общий объем раствора, из которого отбирают аликвоту для хроматографирования, мл; V_1 – объем аликвоты, нанесенной на хроматографическую пластинку, мл (при нанесении всей пробы $V_1 = V_2$); P – навеска или объем анализируемой пробы, г или мл.

Требования безопасности. Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при работе с органическими растворителями и токсическими веществами.

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения	3
Предисловие	4
Единые требования к методикам определения содержания остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (методические указания)	5
Гла в а 1. Галогенсодержащие углеводороды	11
Методические указания по определению хлорорганических пестицидов (γ -изомера ГХЦГ, α -изомера ГХЦГ, гептакхлора, альдрина, кельтана, ДДЭ, ДДД, ДДТ) при совместном присутствии в воде хроматографическими методами	11
Методические указания по избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в биологических средах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке)	19
Методические указания по определению хлорорганических инсектицидов в гуза-пае и хлопковой шелухе хроматографическими методами	25
Методика определения ГХЦГ, ДДТ и метаболитов в гуза-пае	25
Методика определения γ -ГХЦГ и ДДТ в хлопковой шелухе методом тонкослойной хроматографии	28
Методические указания по идентификации γ -ГХЦГ, его изомеров (α -, β - и δ -ГХЦГ) и метаболитов (полихлорированных фенолов) в биологических жидкостях (крови), органах, тканях и субклеточных фракциях печени теплокровных животных методом тонкослойной хроматографии	30
Методические указания по определению ГХЦГ и ДДТ в илово-сульфидных лечебных грязях газожидкостной хроматографией	38
Методические указания по определению ДД в воде методом газожидкостной хроматографии	42
Методические указания по определению ДД и ДДБ в почве методом газовой хроматографии	44
Методические указания по определению дилора в меде методом тонкослойной хроматографии	46
Методические указания по определению комманды в бобовых хроматографическими методами	49
Методические указания по определению метоксихлора в воде, ботве и клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии	53
Методические указания по определению митрана в воде, яблоках и капусте газохроматографическим методом	55

Г л а в а 2. Органические соединения фосфора	59
Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами	59
Методика определения фосфорорганических пестицидов методами ГЖХ и ТСХ	66
Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов хроматоферментным методом	78
Методические указания по определению фосфорорганических пестицидов (базудин, гетерофос, карбофос, метафос, фосфамид, этафос) в табаке методом газожидкостной хроматографии	86
Методические указания по определению актедлика и базудина в чае методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	91
Методические указания по определению базудина и гетерофоса в почве и табаке методом газожидкостной хроматографии	94
Методические указания по определению дефолианта хлопчатника бутифоса в хлопковой шелухе методом тонкослойной хроматографии	97
Методические указания по определению гетерофоса в растениях лаванды методом газожидкостной хроматографии	99
Методические указания по определению гетерофоса, этафоса и их метаболитов в биологическом материале, молоке, яйцах методом газожидкостной хроматографии	101
Методические указания по определению алара, ГМК-На, гидрела, дигидрела в воде, растительном материале (томаты, яблоки, свекла) спектрофотометрическим методом	108
Методические указания по определению гидрела, дигидрела, дексстремала, кампозана М в воде, почве, растительном материале методом газовой хроматографии	111
Методические указания по определению диазинона и фосфамида в биологических средах методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	117
Методические указания по определению ДДВФ в молоке, органах и тканях животных методом газожидкостной хроматографии	123
Методические указания по определению карбофоса и трихлорметафоса-3 в чае методом газожидкостной хроматографии	126
Методические указания по определению метафоса, фосфамида и хлорофоса в сушених овощах и плодах (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, слива) методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	129
Методические указания по определению метафоса и фосфамида в почве методом газожидкостной хроматографии	136
Методические указания по определению плондрела в почве, воде, огурцах и яблоках методом тонкослойной хроматографии	138
Методические указания по определению фосфорорганического пестицида релдана в зерне и воде методом газожидкостной хроматографии	141
Методические указания по определению рицида-П в рисе, воде и почве методом газожидкостной хроматографии	144
Методические указания по определению трихлорметафоса-3 и его метаболитов в биологическом материале методом газожидкостной хроматографии	148

Методические указания по определению хлорофоса в картофеле методом тонкослойной хроматографии	150
Методические указания по определению хостаквика в овоцах, фруктах, биологическом материале, почве и воде методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	153
Методические указания по определению цианокса в меде методом тонкослойной хроматографии	156
Методические указания по определению этафоса в молоке и мясопродуктах методом газожидкостной хроматографии	158
Методические указания по определению этрела и его производных (гидрела, дигидрела) в яблоках, огурцах, томатах, зерне злаков, семенах хлопчатника и хлопковом масле методом газожидкостной хроматографии	160
Методические указания по определению препарата ЭФ-34 (гаметана) в зерне методом газожидкостной хроматографии	165
Методические указания по определению препарата ЭФ-165 (эфогама) в зерне методом газожидкостной хроматографии	167
Методические указания по определению препарата ЭФ-165 (эфогама) в подсолнечном масле методом газожидкостной хроматографии	169
Г л а в а 3. Органические соединения олова	171
Методические указания по определению перопала в яблоках и почве методом тонкослойной хроматографии	171
Методические указания по определению действующего вещества препарата пликтран и его метаболитов (оксида дициклогексилолова, циклогексилоловянной кислоты) в воде, почве и растительном материале методом тонкослойной хроматографии и олова в тех же средах спектрофотометрическим методом	173
Методические указания по определению пликтрана и его метаболитов (дициклогексилоловооксида, циклогексилоловянной кислоты) в биосубстратах методом тонкослойной хроматографии	179
Методические указания по определению пликтрана в растениях и почве методом тонкослойной хроматографии	183
Методические указания по определению действующего вещества препарата торк и его метаболита в воде, почве и растительном материале методом тонкослойной хроматографии	185
Г л а в а 4. Амины и соли четвертичных аммониевых оснований	190
Методические указания по определению банколя в клубнях картофеля и воде методом тонкослойной хроматографии	190
Методические указания по определению ботрана в почве, воде, растительной продукции методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	192
Методические указания по определению паарлана в почве, табаке и табачном дыме методом газожидкостной хроматографии	195
Методические указания по определению раундапа в воде методом тонкослойной хроматографии	199
Методические указания по определению стомпа в табаке методом газожидкостной хроматографии	202
Методические указания по определению стомпа в эфиромасличных растениях и эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	205

Методические указания по определению соналена в воде, почве и зеленой массе сои хроматографическими методами	208
Методические указания по определению соналена в маслах подсолнечника, рапса и клещевины методом газожидкостной хроматографии	210
Методические указания по определению трефлана в воде, почве, томатах и капусте методом УФ-спектрофотометрии с использованием тонкослойной хроматографии	212
Методические указания по определению трефлана в сладком перце методом осциллографической полярографии	214
Методические указания по определению трефлана в почве, табаке и табачном дыме методом газожидкостной хроматографии	215
Методические указания по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	218
Г л а в а 5. Кетоны, спирты, нитрофенолы, простые эфиры	221
Методические указания по определению акрекса, диносеба в крови и моче методом тонкослойной хроматографии	221
Методические указания по определению блазера в воде, почве, сое и зеленых листьях методом тонкослойной хроматографии	223
Методические указания по определению глифтора в органах и тканях животных фотометрическим методом	226
Методические указания по определению гоала в воде, почве и растительных объектах методом тонкослойной хроматографии	229
Методические указания по определению гоала в почве, эфиромасличных растениях и эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	232
Методические указания по определению изофена и его метаболита диносеба в сельскохозяйственной продукции (огурцы, томаты, апельсины, яблоки, груши, сахарная свекла), в воде и почве хроматографическими методами	235
Методические указания по определению изофена и его метаболита диносеба в хлопковом масле методом тонкослойной хроматографии	241
Методические указания по определению препарата Краснодар-1 в перце сладком, томатах, зерне, воде, почве методом тонкослойной хроматографии	244
Методические указания по определению набу в воде, почве, капусте, сое и зеленых листьях методом тонкослойной хроматографии	247
Методические указания по определению набу в моркови методом газожидкостной хроматографии	250
Г л а в а 6. Алифатические, ациклические, ароматические кислоты и их производные	252
Методические указания по определению алланапа в воде, почве и огурцах методом тонкослойной хроматографии	252
Методические указания по определению амибена в почве методом тонкослойной хроматографии	254
Методические указания по определению ацетала в воде, почве, картофеле, зерне, зеленой массе кукурузы и сои методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	256
Методические указания по определению бромоксинила в воде, почве и растительном материале методом газожидкостной хроматографии	261

Методические указания по определению бутизана С в белокочанной капусте, репе, турнепсе и рапсе методом тонкослойной хроматографии	263
Методические указания по определению гибберсиба в луке, чесноке, картофеле, огурцах, кабачках, баклажанах, капусте, горохе, фасоли, винограде методом тонкослойной хроматографии	265
Методические указания по определению даконила в растительной продукции, почве и воде методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	268
Методические указания по определению дактала в эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	271
Методические указания по определению далапона в воде, почве, моркови, винограде и семенах хлопчатника методом тонкослойной хроматографии	273
Методические указания по определению далапона в эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	276
Методические указания по определению девринола в почве, растениях и эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	278
Методические указания по определению девринола в семенах подсолнечника методом тонкослойной хроматографии	281
Методические указания по определению лассо в почве, зеленой массе кукурузы и рапсовом масле методом тонкослойной хроматографии	283
Методические указания по определению маврика в воде, плодовых и овощных культурах методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	285
Методические указания по определению менида и пропанида в воде методом газожидкостной хроматографии	288
Методические указания по определению панорама и сикарола в воде, почве и зерне методом газожидкостной хроматографии	290
Методические указания по определению пентадина в семенах и зеленой массе люпина, редиса методом газожидкостной хроматографии	293
Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	296
Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами	301
Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, цимбуш) в биологическом материале методом газожидкостной хроматографии	307
Методические указания по определению полидима в зерне, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	309
Методические указания по определению рамрода, лассо и дуала в воде, почве и растительных пробах методом тонкослойной хроматографии	313
Методические указания по определению ридомила в картофеле, сахарной свекле, огурцах, томатах, луке, винограде, виноградном соке, табаке, табачном дыме, воде, почве и биоматериале методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	316
Методические указания по определению суми-альфа в воде, плодовых и овощных культурах хроматографическими методами	328
Методические указания по определению тотрила в луке зеленом и репчатом методом тонкослойной хроматографии	330

Методические указания по определению фудзивана в воде методом тонкослойной хроматографии	332
Методические указания по определению цитразона в цитрусовых методом тонкослойной хроматографии	334
Методические указания по определению этоксилина в воде, почве и растительном материале методом газожидкостной хроматографии	336
Г л а в а 7. Арилоксиалканкарбоновые кислоты и их производные	339
Методические указания по определению 2,4-Д и аминной соли 2,4-Д в почве методом газожидкостной хроматографии	339
Методические указания по определению 2,4-ДМ и бутилового эфира 2,4-ДМ в воде и почве методом газожидкостной хроматографии	344
Методические указания по определению 4-хлор-2-метилфеноксусной кислоты (2М-4Х) в воде, почве, растительном масле и продуктах питания методом тонкослойной хроматографии	349
Методические указания по определению 2М-4Х, 2М-4ХМ, 2М-4ХП в воде, почве и растительном материале методом газожидкостной хроматографии	352
Методические указания по определению фюзилада в семенах и листьях сои методом тонкослойной хроматографии	360
Г л а в а 8. Производные карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовой кислот	362
Методические указания по определению альдикарба и его основных метаболитов (сульфоксида и сульфона) в воде, почве и растительном материале методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	362
Методические указания по определению бетанала (фенмединамина) в воде, почве, сахарной свекле методом газожидкостной хроматографии	368
Методические указания по определению видата в растительной продукции, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	370
Методические указания по определению дитиокарбаматов в растительном материале парофазным газохроматографическим методом	373
Методические указания по определению карбина и хлор-ИФК в биологических средах спектрофотометрическим методом и методом тонкослойной хроматографии	377
Методические указания по определению промета в растениях, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	381
Методические указания по определению ронита и его метаболитов в биологических средах методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии	383
Методические указания по определению гербицидов – производных тиокарбаминовой кислоты (вернам, ронит, сутан, тиллам, элтам, ялан) в воде, растительном материале, биосубстратах и воздухе газохроматографическим методом	388
Методические указания по определению ТМТД и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии	393
Методические указания по определению триаллата в воде, почве и зерне пшеницы методом газожидкостной хроматографии	395
Методические указания по определению триаллата в маке масличном методом газожидкостной хроматографии	398

Методические указания по определению фенмединама и десмединама в воде природных водоемов методом тонкослойной хроматографии	400
Методические указания по определению фурадана в растениях, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	402
Методические указания по определению цинеба в сушених овощах и плодах фотометрическим методом по сироуглероду	406
Г л а в а 9. Производные мочевины, тиомочевины и сернистой кислоты	410
Методические указания по определению фенилмочевинных гербицидов (фенурон, которан, томилон, монурон, диурон, дикурон, дозанекс, теноран, фалоран, арезин, линурон, паторан, малоран) в воде, почве, растительном материале, овощах и по определению гербицидов (арезин, линурон, паторан, малоран) и их метаболитов – ароматических аминов – в воде при совместном присутствии методом газожидкостной хроматографии	410
Методические указания по определению фенилмочевинных гербицидов (фенурон, которан, монурон, диурон, дикурон, дозанекс, теноран, фалоран, арезин, линурон, паторан, малоран) в воде, почве, растительной массе, овощах методом тонкослойной хроматографии	420
Методические указания по определению остатков глина (хлорсульфурана) в зерне и соломе зерновых колосовых культур, в семенах и поло-ве льна-долгунца методом высокоеффективной жидкостной хроматографии	426
Методические указания по определению глина (хлорсульфурана) в поч-ве, воде и растительном материале методом иммуноферментного ана-лиза	430
Методические указания по определению дифлубензуриона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами	434
Методические указания по определению топсина-М в яблоках, перси-ках, фейхоа и хурме методом тонкослойной хроматографии	438
Методические указания по определению топсина-М и БМК при совмест-ном присутствии в персиках, фейхоа и хурме методом тонкослойной хроматографии	440
Методические указания по определению топсина-М в персиках, фейхоа, хурме и зеленои растительности методом газожидкостной хромато-графии	442
Методические указания по ускоренному определению фенурона, которана, дикурона в воде и почве методом газожидкостной хроматографии	444
Методические указания по определению остаточных количеств омайта в меде методом тонкослойной хроматографии	447
Г л а в а 10. Пятичленные гетероциклические соединения	449
Методические указания по определению АТГ и АТГ-Ф в воде, почве растительном и биологическом материале методом тонкослойной хро-матографии	449
Унифицированная методика определения байлетона, байтана в сельско-хозяйственной продукции, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	453

Методические указания по определению байлетона в картофеле, огурцах, томатах, яблоках, персиках, винограде, цитрусовых (лимонах, апельсинах, мандаринах), зерне, зеленой массе растений, сырье лекарственных культур, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	460
Методические указания по определению байтана и байтана-универсала в зерне, почве и воде хроматографическими методами	468
Методические указания по определению беномила и БМК в растениях, почве и воде природных водоемов полярографическим методом	472
Методические указания по определению БМК и бензата по БМК в растительных объектах, вине, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	477
Методические указания по определению дефолиантов хлопчатника: бутилкаптакса и хлората магния в воде, семенах хлопчатника и продуктах их промышленной переработки	480
Методические указания по определению бутилкаптакса в почве, воде и растительном материале методом газожидкостной хроматографии	485
Методические указания по определению виджила в растительном материале, почве и воде методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	487
Методические указания по определению ГМП, ТМДИ, ГМДИ, ГХИ в воде, почве, растительном материале методом тонкослойной хроматографии	491
Методические указания по определению дефолианта дроппа в волокнах, листьях и почве методом тонкослойной хроматографии	494
Методические указания по определению дроппа в семенах хлопчатника и винограде методом тонкослойной хроматографии	497
Методические указания по определению дроппа в воде, почве, семенах хлопчатника, волокна, хлопковом масле, шроте методом газожидкостной хроматографии	499
Методические указания по определению картоцида (фитона) в картофеле, свекле, огурцах, томатах, яблоках, цитрусовых, луке, жоме, мелассе, сахаре, воде и биологическом материале методом тонкослойной хроматографии	501
Методические указания по определению КМП и его метаболита МП в воде, почве, растительном и биологическом материале методом тонкослойной хроматографии	506
Методические указания по определению кротонолактона в зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	509
Методические указания по определению нискорана в воде, почве, растительном материале (зеленая масса и плоды винограда, яблоки) методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	511
Методические указания по определению рейсерса в воде, почве и растительных объектах методом тонкослойной хроматографии	515
Методические указания по определению ровраля в воде, почве, томатах, картофеле, винограде, виноградном соке и вине методом тонкослойной хроматографии	518
Методические указания по определению ровраля в биосубстратах методом тонкослойной хроматографии	521
Методические указания по определению ровраля в растительном материале, почве, воде методом газожидкостной хроматографии	525

Методические указания по определению ронстара в почве, растениях и эфирных маслах методом газожидкостной хроматографии	527
Методические указания по определению сумилекса в воде, почве, семенах подсолнечника и биосредах методом тонкослойной хроматографии	531
Методические указания по определению сумилекса в биологических средах методом газожидкостной хроматографии	536
Методические указания по определению тачигарена в почве методом тонкослойной хроматографии	538
Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии	541
Методические указания по определению тилта в растениях, почве и воде методом газожидкостной хроматографии	545
Методические указания по определению тилта в почве и зерне методом газожидкостной хроматографии	547
Методические указания по определению топаза в сельскохозяйственных культурах, почве и воде методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	550
Методические указания по определению трифумина и его метаболитов в овощах, фруктах, зерне, почве и воде методом тонкослойной хроматографии	552

Справочное издание

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ
И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ**

Справочник. Том 1

**Составители: Клисенко Марта Архиповна, Калинина Альбина Акимовна,
Новикова Кира Федоровна, Хохолькова Галина Алексеевна**

**Зав. редакцией А.С. Максимова
Художественный редактор А.И. Бершачевская
Технический редактор Н.И. Зиновьева
Корректор Л. А. Котова**

ИБ № 7381

**Сдано в набор 27.12.90. Подписано к печати 05.11.91. Формат
60 × 88¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Гарнитура Литературная. Печать офсет-
ная. Усл. печ. л. 34,79. Усл. кр.-отт. 34,79. Уч.-изд. л. 42,21.
Изд. № 103. Тираж 5000 экз. Заказ № 731.**

**Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Колос», 107807,
ГСП-6, Москва, Б-78, ул. Садовая-Спасская, 18.**

**Московская типография № 11 Министерства информации и печати РСФСР.
113105, Москва, Нагатинская ул., 1.**