

ГОСТ Р 50207—92  
(ИСО 3496—78)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

# МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

## Метод определения *L* (—)-оксипролина

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод определения *L* (–)-оксипролина

Meat and meat products.  
Determination of *L* (–)-hydroxyproline content

ГОСТ Р  
50207—92

(ИСО 3496—78)

ОКС 67.120.10  
ОКСТУ 9209

Дата введения 1994—01—01

## 1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли *L* (–)-оксипролина в мясе и мясных продуктах.

## 2 Ссылка

ГОСТ Р 51447—99 (ИСО 3100-1—91) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб

## 3 Определение

Массовая доля *L* (–)-оксипролина в мясе и мясных продуктах — массовая доля *L* (–)-окси-пролина, определенная в соответствии с методикой, установленной настоящим стандартом, выра-женная в процентах к массе продукта.

## 4 Сущность метода

Гидролиз навески в постоянно кипящем растворе соляной кислоты, содержащем хлорид олова (II). Фильтрация и разбавление гидролизата. Нейтрализация гидроксидом натрия аликвотной части разбавленного гидролизата. Фильтрация и разбавление. Окисление *L* (–)-оксипролина хлорамином-Т с последующим образованием окрашенного в красный цвет соединения *p*-диметиламинобензальде-гида. Фотометрическое измерение при длине волны 558 нм.

## 5 Реактивы

Все реактивы должны быть аналитического качества. Используемая вода должна быть дистил-лированной или эквивалентной чистоты.

### 5.1 Раствор соляной кислоты, содержащий хлорид олова (II)

Растворяют в воде 7,5 г хлорида олова (II) дигидрата ( $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), разбавляют до 500 см<sup>3</sup> и добавляют 500 см<sup>3</sup> соляной кислоты ( $\rho_{20}$  1,19 г/см<sup>3</sup>).

### 5.2 Соляная кислота, приблизительно 6 моль/дм<sup>3</sup> раствор

Смешивают равные объемы соляной кислоты ( $\rho_{20}$  1,19 г/см<sup>3</sup>) и воды.

### 5.3 Гидроксид натрия, приблизительно 10 моль/дм<sup>3</sup> раствор

Растворяют в воде 40 г гидроксида натрия, охлаждают и разбавляют до 100 см<sup>3</sup>.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техни-ческому регулированию и метрологии

**5.4 Гидроксид натрия, приблизительно 1 моль/дм<sup>3</sup> раствор**

Растворяют в воде 1 г гидроксида натрия, охлаждают и разбавляют до 100 см<sup>3</sup>.

**5.5 Буферный раствор, pH 6,0**

Растворяют в воде:

50 г лимонной кислоты моногидрата (C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub>·H<sub>2</sub>O);

26,3 г гидроксида натрия;

146,1 г ацетата натрия тригидрата [Na(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)·3H<sub>2</sub>O].

Разбавляют водой до 1000 см<sup>3</sup>. Смешивают этот раствор с 200 см<sup>3</sup> воды и 300 см<sup>3</sup> пропанола-1.

Этот раствор устойчив в течение нескольких недель при 4 °С.

**5.6 Реактив хлорамина-Т**

Растворяют в 10 см<sup>3</sup> воды 1,41 г *N*-хлор-*p*-толуолсульфамида натрия тригидрата (хлорамин-Т) и последовательно добавляют 10 см<sup>3</sup> пропанола-1 и 80 см<sup>3</sup> буферного раствора.

Этот раствор готовят непосредственно перед использованием.

**5.7 Цветной реактив**

10,0 г *p*-диметиламинобензальдегида растворяют в 35 см<sup>3</sup> 60 %-ного раствора хлорной кислоты (*m/m*), а затем медленно добавляют 65 см<sup>3</sup> пропанола-2.

Этот раствор готовят в день использования.

**Примечание** — Если необходима очистка *p*-диметиламинобензальдегида (см. примечание к п. 8.5), поступают следующим образом: готовят насыщенный раствор *p*-диметиламинобензальдегида в горячем 70 %-ном этаноле (*V/V*). Охлаждают сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике. Примерно через 12 ч раствор фильтруют на воронке Бюхнера. Промывают небольшим количеством 70 %-ного этанола (*V/V*). Снова растворяют в горячем 70 %-ном этаноле (*V/V*). Добавляют холодную воду и тщательно перемешивают. Повторяют эту процедуру до тех пор, пока не образуется достаточное количество молочно-белых кристаллов. Оставляют на ночь в холодильнике. Фильтруют раствор на воронке Бюхнера, промывают 50 %-ным этанолом (*V/V*) и высушивают под вакуумом в присутствии оксида фосфора (*V*).

**5.8 Стандартные растворы *L* (—)-оксипролина**

Готовят основной раствор, растворяя в воде 50 мг 4-оксипирролидин- $\alpha$ -карбоновой кислоты (оксипролин). Добавляют одну каплю раствора соляной кислоты и разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>. Этот раствор устойчив в течение 1 мес при 4 °С.

В день использования 5 см<sup>3</sup> основного раствора разбавляют до 500 см<sup>3</sup> водой в мерной колбе. Затем готовят четыре стандартных раствора, разбавляя водой 10, 20, 30 и 40 см<sup>3</sup> этого раствора до 100 см<sup>3</sup> и получая соответственно концентрации *L* (—)-оксипролина 0,5; 1; 1,5 и 2 мкг/см<sup>3</sup>.

**6 Аппаратура**

Обычная лабораторная аппаратура, а также указанная в 6.1—6.10.

6.1 Механическая мясорубка лабораторного типа с решеткой, диаметр отверстий которой не более 4 мм.

6.2 Колба для гидролиза круглодонная или плоскодонная, вместимостью около 200 см<sup>3</sup>, с широким горлом, оснащенная воздушным или водяным холодильником.

6.3 Электрическое устройство для нагревания (например, калильная сетка для нагревания, электроплитка или электрическая песчаная баня).

6.4 Фильтры из фильтровальной бумаги диаметром 12,5 см.

6.5 pH-метр.

6.6 Алюминиевая или пластиковая фольга.

6.7 Водяная баня с терморегулированием температуры в пределах (60±5) °С.

6.8 Спектрофотометр, обеспечивающий измерение при длине волны (558±2) нм, или фотоэлектроколориметр со светофильтром, имеющим максимум поглощения при длине волны (558±2) нм.

6.9 Кюветы с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм.

6.10 Аналитические весы.

**7 Отбор проб**

7.1 Отбирают пробу продукта не менее 200 г.

7.2 Пробу хранят в таких условиях, чтобы предотвратить порчу и изменение состава.

## 8 Проведение анализа

### 8.1 Подготовка проб к испытанию

#### 8.1.1 Сырое мясо и мясные продукты

Мясо в охлажденном состоянии (чуть ниже 0 °С) острым ножом нарезают на кубики (приблизительно 0,5 см<sup>3</sup>, т. е. длина стороны кубика примерно 8 мм).

Пробу помещают в сосуд и герметично закрывают или упаковывают под вакуумом в термостойкую пластиковую пленку; затем нагревают и выдерживают при температуре 70 °С в течение 30 мин; охлаждают и продолжают испытание в соответствии с требованиями п. 8.1.2.

В процессе последующих стадий подготовки пробы и взвешивания навески необходимо обеспечить хорошее перемешивание пробы, особенно равномерное распределение жира и жидкости.

**Примечание** — Тепловая обработка размягчает соединительную ткань и делает ее менее устойчивой к гомогенизации. Однако это может также привести к отделению жидкости, содержащей желатин. Присутствие жира может также потребовать особого внимания к приготовлению гомогенной пробы для испытания.

#### 8.1.2 Мясо и мясные продукты, готовые к употреблению

Пробу гомогенизируют, пропуская ее дважды через мясорубку и тщательно перемешивая. Хранят гомогенизированную пробу в целиком заполненном воздухонепроницаемом закрытом сосуде в таких условиях, чтобы предотвратить ее порчу и изменение состава. Анализ испытуемой пробы проводят в течение 24 ч.

### 8.2 Навеска

В колбу для гидролиза взвешивают около 4 г испытуемой пробы с точностью 0,001 г. Навеску берут так, чтобы ни одна частица пробы не прилипла к боковой стенке колбы.

### 8.3 Гидролиз

8.3.1 В колбу помещают несколько кусочков карбида кремния для равномерного кипения, добавляют (100±1) см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, содержащей хлористое олово (II). Колбу соединяют с воздушным или водяным холодильником, нагревают до спокойного кипения на нагревательном устройстве и выдерживают в течение 16 ч (лучше оставить на ночь).

**Примечание** — По желанию аналитика гидролиз можно проводить последовательно в две стадии, каждая от 7 до 8 ч в течение двух дней. Результаты данного альтернативного метода незначительно отличаются от результатов, полученных при проведении гидролиза в одну стадию в течение 16 ч.

8.3.2 Горячий гидролизат фильтруют через фильтровальную бумагу в мерную колбу с одной отметкой вместимостью 200 см<sup>3</sup>. Колбу и фильтровальную бумагу промывают три раза, используя каждый раз по 10 см<sup>3</sup> горячего раствора соляной кислоты, промывную воду добавляют к гидролизату. Объем доводят водой до метки и перемешивают. Определение проводят не позднее следующего дня после гидролиза.

### 8.4 Проведение цветной реакции и измерение оптической плотности

8.4.1 В химический стакан пипеткой переносят такой объем гидролизата, чтобы после его разбавления до 250 см<sup>3</sup> (см. п. 8.4.2) концентрация  $L$  (—)-оксипролина была от 0,5 до 2 мкг/см<sup>3</sup>.

**Примечание** — В большинстве случаев объем гидролизата от 5 до 25 см<sup>3</sup> в зависимости от количества соединительной ткани, содержащейся в пробе.

8.4.2 С помощью рН-метра доводят рН до (8±0,2), добавляя по каплям сначала 10 моль/дм<sup>3</sup> раствор гидроксида натрия, а затем 1 моль/дм<sup>3</sup> раствор гидроксида натрия. Содержимое стакана фильтруют в мерную колбу с одной отметкой вместимостью 250 см<sup>3</sup>. Промывают стакан и осадок гидроксида олова на фильтровальной бумаге не менее трех раз водой порциями по 30 см<sup>3</sup>, собирая промывную жидкость в мерную колбу. Объем доводят до метки и перемешивают.

8.4.3 4,00 см<sup>3</sup> этого раствора переносят в пробирку и добавляют 2,00 см<sup>3</sup> реактива хлорамина-Т, перемешивают и оставляют при комнатной температуре на (20±1) мин.

8.4.4 Добавляют 2,00 см<sup>3</sup> цветного реактива, тщательно перемешивают и закрывают пробирку алюминиевой или пластиковой фольгой.

8.4.5 Пробирку быстро переносят в водяную баню температурой (60±5) °С и нагревают в течение точно 20 мин.

8.4.6 Охлаждают под струей воды в течение не менее 3 мин.

8.4.7 Оптическую плотность измеряют при длине волны (558±2) нм в кювете на спектрофотометре или фотоэлектроколориметре со светофильтром.

8.4.8 Вычитают оптическую плотность контрольного раствора и находят концентрацию

*L* (—)-оксипролина в разбавленном гидролизате по калибровочному графику, построенному, как описано в 8.6.

### 8.5 Контрольное испытание

Процедуру, описанную в 8.4.3—8.4.8, используя вместо разбавленного гидролизата воду, проводят в двух повторностях.

**Примечание** — Если оптическая плотность контрольного раствора превышает 0,040, следует приготовить свежий цветной реактив и, при необходимости, провести очистку *p*-диметиламинобензальдегида.

### 8.6 Калибровочный график

8.6.1 Повторяют всю процедуру определения, описанную в 8.4.3—8.4.8, используя вместо разбавленного гидролизата по очереди 4,00 см<sup>3</sup> каждого из четырех разбавленных стандартных растворов *L* (—)-оксипролина.

8.6.2 Строят чертеж, нанося измеренные значения оптической плотности против соответствующих концентраций стандартных растворов *L*(—)-оксипролина и проводя прямую линию через нанесенные на чертеж точки и начало координат.

**Примечание** — Для каждой серии анализов необходимо строить калибровочный график.

### 8.7 Повторность результатов

Повторность проведения анализа двухкратная.

## 9 Выражение результатов

### 9.1 Метод расчета и формула

Для каждой из двух навесок массовую долю *L* (—)-оксипролина (*X*) в процентах к массе продукта вычисляют по формуле

$$X = \frac{5c}{mV},$$

где *c* — концентрация *L* (—)-оксипролина в разбавленном гидролизате, найденная по калибровочному графику, мкг/см<sup>3</sup>;

*m* — масса навески, г;

*V* — объем гидролизата, используемый для разбавления до 250 см<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений при условии, что это удовлетворяет требованиям 9.2. Результат вычисляют с точностью до 0,01 %.

### 9.2 Согласование между повторными результатами испытаний

Расхождение между результатами двух параллельных определений, проведенных одним и тем же аналитиком, не должно превышать 5 % по отношению к среднеарифметическому значению.

## 10 Отчет об испытании

В отчете об испытании должны быть указаны используемый метод и полученные результаты. В нем также должны быть упомянуты любые условия проведения испытаний, не установленные данным стандартом или касающиеся как необязательных, так и любых других подробностей, которые могут повлиять на конечный результат.

Отчет должен включать в себя все подробные данные, необходимые для полной идентификации пробы.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом мясной промышленности

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 28 августа 1992 г. № 1062

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3496—78 «Мясо и мясные продукты. Эталонный метод определения содержания *L* (—)-оксипролина» и полностью ему соответствует

**3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**4 ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Январь 2010 г.