



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 20582—86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным Агропромышленным комитетом СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

**В. С. Циков, А. И. Капюжный, Е. Л. Литвиненко, П. П. Дыга, А. И. Науменко,
А. М. Гречанюк, В. Б. Островский, А. И. Фукс**

ВНЕСЕН Государственным Агропромышленным комитетом СССР

Зам. председателя Г. А. Романенко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1986 № 1019

**Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор Г. А. Макарова
Корректор В. Ф. Малюгина**

Сдано в набор 13.05.86 Подп. в печать 02.07.86 Усл. печ. л. 0,7 Усл. кр.
печ. л. 1,0

**Л. Л.
к. п.**

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123842 Москва, ГСП,
109116 «Московский печатник», Москва, Л. П. пер.

пер. 3

**СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

**ГОСТ
20582—86**

Технические условия

Maize seeds. Varietal and sowing characteristics.
Specifications

Взамен
ГОСТ 20582—80

ОКП 97 1361

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 22 апреля 1986 г. № 1019 срок введения установлен

с 01.07.87
до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена кукурузы, кроме сахарной, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для посева должны использоваться семена кукурузы районированных и перспективных гибридов, гибридных популяций и сортов, утвержденных в установленном порядке, и родительских форм гибридов.

1.2. По сортовым качествам (типичности и ксенийности) семена кукурузы должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Группа семян | Сортовая типичность %, не менее | | Количество кесчинок зерен, шт на 100 початков не более | |
|--|---------------------------------|----------|--|----------|
| | по данным апробации | | | |
| | полевой | амбарной | полевой | амбарной |
| Семена суперэлиты сортов, самоопыленных линий и гибридных популяций | 99,5 | 100,0 | 20 | 0 |
| Семена элиты сортов, самоопыленных линий и гибридных популяций | 99,5 | 100,0 | 20 | 10 |
| Семена самоопыленных линий первой и второй репродукций на участках размножения; семена самоопыленных линий и простых гибридов на участках гибридизации при выращивании простых и трехлинейных гибридов — родительских форм | 98,0 | 99,0 | 50 | 30 |
| Семена второго поколения простых и трехлинейных гибридов — родительских форм на участках размножения | 98,0 | 99,0 | 400 | 200 |
| Семена первого поколения простых, трехлинейных, двойных межлинейных, сорто-линейных и многолинейных гибридов товарного использования | — | 98,0 | — | 600 |
| Семена сортов и гибридных популяций первой и последующих репродукций | | | | |
| I категории | 99,0 | 100,0 | 100 | 10 |
| II категории | 98,0 | 99,0 | 300 | 100 |
| III категории | 97,0 | 99,0 | 600 | 200 |

1.3. По посевным качествам семена кукурузы делят на два класса в соответствии с нормами, указанными в табл. 2. Семена суперэлиты и элиты сортов и гибридных популяций по посевным качествам должны соответствовать нормам первого класса. Допускается всхожесть семян суперэлиты и элиты самоопыленных линий не ниже норм 2-го класса.

Таблица 2

| Культура | Класс | Чистота | Семена культурных растений, шт. на 1 кг, не более | Семена с макротравмами в области зародыша, % к количеству, не более | Всхожесть, %, не менее | Влажность, %, не более |
|------------------|-------|---------|---|---|------------------------|------------------------|
| Кукуруза в зерне | 1 | 99,0 | 5 | 20,00 | 96 | 14,0 |
| | 2 | 98,00 | 5 | — | 90 | 14,0 |

Для посева на зерно используют семена I-го класса.

В страховой семенной фонд должны быть засыпаны семена I-го класса.

1.4. В семенах кукурузы в початках количество зерен, пораженных нигроспорозом, серой и красной гнилью, диндидиозом, фузариозом и белью при амбарной апробации в сумме на 100 початков не должно превышать:

300 шт. для семян суперэлиты и элиты;

500 шт. для семян первой и последующих репродукций (поколений гибридов).

1.5. В семенах кукурузы не допускается наличие:

семян и плодов сорных растений;

карантинных вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР;

живых вредителей и их личинок, повреждающих семена кукурузы.

1.6. Семена, подготовленные к посеву на заводах по обработке семян кукурузы, должны быть обработаны ядохимикатами с применением пленкообразующих составов в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке. До 1991 г. допускается протравливание семян без использования пленкообразующих составов.

Семена, высеваемые из семенных фондов колхозов, совхозов и других хозяйств, должны быть протравлены по ГОСТ 23914—79.

1.7. Семена стерильных линий, простых, трехлинейных гибридов и сортов, используемые при производстве гибридных семян, окрашивают анилиновыми красителями в синий, а восстановителей фертильности — в красный цвет. Семена закрепителей стерильности не окрашивают.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85 со следующим дополнением к разделу 1.

Каждая партия семян суперэлиты и элиты сортов, самоопыленных линий и гибридных популяций кукурузы, отгружаемая на посев, сопровождается Аттестатом на семена, а каждая партия семян первой и второй репродукций самоопыленных линий, первой — третьей репродукций сортов и гибридных популяций, а также первого и второго поколений простых и трехлинейных гибридов — родительских форм — Свидетельством на семена.

Каждая партия семян первого поколения двойных межлинейных, простых и трехлинейных гибридов товарного использования,

сортолинейных и многолинейных гибридов сопровождается Свидетельством на гибридные семена кукурузы.

Каждая партия семян кукурузы, засыпанных в семенные фонды колхозов, совхозов и других хозяйств, должна быть оформлена Актом апробации или Актом полевого обследования, Актом амбарной апробации кукурузы и Удостоверением о кондиционности семян по ГОСТ 12046—85.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовые качества семян кукурузы определяют полевой и амбарной апробациями по документацию, указанной в справочном приложении.

3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12036—85, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81 и ГОСТ 12037—81 со следующими дополнениями.

3.2.1. Определение макротравм в области зародыша проводят до обработки семян ядохимикатами.

Из семян основной культуры, выделенных из навески по ГОСТ 12037—81, отсчитывают без выбора четыре пробы по 100 семян в каждой. Отсчитанные семена просматривают под лупой 2—4-кратного увеличения. Зерновки, имеющие макротравмы в области зародыша, отбирают по следующим признакам: выбита часть зародыша, отчленен частично или полностью перикарпий (оболочка) над зародышем, видна половина и более гиллярного (черного или коричневого) слоя вследствие отчленения основания семени (чехлика). В каждой пробе подсчитывают число семян с макротравмами зародыша и вычисляют его в процентах к общему числу семян в пробе.

3.2.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов анализа четырех проб, если отклонения результатов анализа отдельных проб от среднего не превышают допустимые отклонения, указанные в табл. 3.

Таблица 3

| Среднее арифметическое значение результата определения числа семян с макротравмами зародыша, % | Допускаемое отклонение результатов анализа отдельных проб от среднего арифметического, % |
|--|--|
| От 0 до 5 | ±2 |
| От 6 до 10 | ±4 |
| От 11 до 15 | ±6 |
| От 16 до 20 | ±8 |
| От 21 до 30 | ±11 |
| От 31 до 45 | ±14 |
| От 46 до 60 | ±18 |

В случае отклонения результатов анализа одной пробы от среднего на величину, превышающую допускаемое отклонение по табл. 3, результат анализа вычисляют по результатам трех остальных проб, а при отклонении выше допускаемого результатов анализа двух проб — анализ повторяют. Если при повторном анализе за пределы допускаемых отклонений выходят результаты анализа двух проб, то число семян с макротравмами в области зародыша вычисляют как среднее арифметическое двух определений, то есть по восьми пробам.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Протравленные семена кукурузы упаковывают в четырехслойные непропитанные бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 массой не более 25 кг; неprotравленные семена — в тканевые мешки по ГОСТ 18225—72 массой не более 50 кг. Мешки с неprotравленными семенами, зашитые ручным способом, должны быть опломбированы.

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77. Каждый мешок с семенами, кроме суперэлита и элита, должен иметь наружную этикетку или штамп с указанием:

- наименования и адреса завода (хозяйства);
- наименования гибрида (сорта, линии, популяции);
- поколения (репродукции);
- года урожая;
- сортовой типичности;
- номера партии;
- номера фракции;

- даты упаковки семян;
- номера смены завода, выпустившей семена;
- обозначения настоящего стандарта;
- наименования протравителя и пленкообразующего полимера с надписью «Протравлено!», «Ядовито!».

Каждый мешок с семенами суперэлита и элита должен иметь наружную и внутреннюю этикетки с указанием:

- наименования хозяйства, выращившего семена;
- наименования сорта (линии, популяции);
- репродукции (суперэлита, элита);
- года урожая;
- сортовой типичности;
- номера партии;
- даты упаковки семян;
- обозначения настоящего стандарта.

4.3. Семена кукурузы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании семян

железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. Транспортирование семян кукурузы пакетами — по ГОСТ 21929—76, высота пакета должна быть не более 1,2 м, масса пакета — не более 1 т.

4.4. Семена кукурузы должны храниться в закрытых обеззараженных помещениях.

4.5. В складах с асфальтированным, бетонным или каменным полом мешки кладут на поддоны или настилы из досок, отстоящие от пола не менее чем на 15 см.

Высота штабеля должна быть не более 4,5 м, ширина — не более 2,4 м. Проходы между штабелями и стенами склада должны быть не менее 0,7 м, а проходы, используемые для операций приема и отпуска — не менее 1,5 м.

4.6. Допускается в колхозах и совхозах хранить семена кукурузы в початках насыпью высотой не более 2 м при влажности семян не более 16%.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ СЕМЯН

Апробацию сортовых посевов и семян кукурузы проводят по «Инструкции по апробации сортовых посевов», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 19 мая 1978 г.