


СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12565—67
	ШКУРКИ ГОРНОСТАЯ И ЛАСКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ Ermine and weasel skins undressed	Взамен ГОСТ 6373—52 и ОСТ НКЗаг 401
		Группа С82
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки горностая и ласки из отряда хищных, семейства куньих.</p> <p>2. Шкурки горностая и ласки характеризуются следующими признаками:</p> <p style="padding-left: 40px;">шкурки горностая (зимние) имеют волосяной покров белый, уравненный по высоте на основной площади. Хвост в концевой части черного цвета;</p> <p style="padding-left: 40px;">шкурки ласки отличаются от шкурок горностая меньшим размером, менее пышным волосяным покровом. В северных районах Советского Союза шкурки ласки имеют волосяной покров белый, в южных — светло-коричневый, палевый. Хвост короткий со слабым опушением без черного кончика.</p> <p>3. Шкурки должны быть сняты чулком с головы с закрытым огузком, с сохранением меха головы (с носиком), лап (с коготками) и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, ушных хрящей, сухожилий и запекшейся крови на мездре и волосе; обезжирены без повреждения корней волос; оправлены на правилках установленной формы (см. чертеж) мездрой наружу с соблюдением отношения одноственной ширины посередине шкурки к ее длине как 1 : 7; законсервированы пресно-сухим способом.</p>		
Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25/1 1967 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена



4. В зависимости от качества волосяного покрова, состояния мездры и районов распространения горностая шкурки подразделяют на края в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименования краёв	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
1. Березовский	Тюменская и Омская области	Белоснежный, блестящий, густой, высокий и шелковистый. Мездра плотная
2. Барабинский	Новосибирская, Томская, Оренбургская, Свердловская, Курганская, Челябинская области; Алтайский край, кроме Горно-Алтайской автономной области; Казахская ССР	Белоснежный и белый, блестящий, густой, высокий, шелковистый. Мездра плотная и менее плотная

Шкурки горностая и ласки невыделанные

ГОСТ 12565—67

Продолжение

Наименования кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
3. Енисейский	Красноярский край, кроме Таймырского и Эвенкийского национальных округов; Тувинская АССР; Горно-Алтайская автономная область Алтайского края; Кемеровская область	Белый, менее густой. Мездра плотная
4. Якутский	Якутская АССР; Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Амурская области; Приморский край; Иркутская область; Верхне-Буреинский, Николаевский, Охотский, Полюно-Осипенковский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы Хабаровского края; Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский районы Читинской области; Таймырский и Эвенкийский национальные округа Красноярского края; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Белый, блестящий, густой и более высокий. Мездра менее плотная
5. Забайкальский	Бурятская АССР, Хабаровский край, Читинская область, кроме районов, указанных в Якутском кряже	Белый, менее густой. Мездра менее плотная
6. Печорский	Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Ухтинский, Удорский, Интинский, Воркутинский, Княжпогостский и Усть-Куломский районы Коми АССР; Ненецкий национальный округ и Мезенский район Архангельской области	Белоснежный, блестящий, густой и шелковистый. Мездра плотная
7. Северный	Коми АССР и Архангельская область, кроме районов, указанных в Печорском кряже; Пермская область; Удмуртская АССР; Кировская, Вологодская, Мурманская, Ульяновская области; Карельская АССР; Башкирская АССР; Татарская АССР	Белый, менее блестящий. Мездра плотная

Продолжение

Наименования кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
8. Северо- Центральный	Остальные районы Европейской части СССР, кроме указанных в Северном и Печорском кряжах	Белый, менее густой, низкий и грубоватый. Мездра плотная

Примечания:

1. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

2. Шкурки ласки по кряжам не подразделяют.

5. По размерам шкурки горностая должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурок	Кряжи				
	Березовский	Барабинский	Печорский	Енисейский, Северный, Северо- Центральный	Якутский, Забайкальский
<i>площадь в см²</i>					
Крупный	Более 320	Более 300	Более 280	Более 260	Более 175
Средний	Более 250 до 320 вкл.	Более 240 до 300 вкл.	Более 220 до 280 вкл.	Более 200 до 260 вкл.	Более 130 до 175 вкл.
Мелкий	До 250 вкл.	До 240 вкл.	До 220 вкл.	До 200 вкл.	До 130 вкл.

Примечания:

1. Шкурки ласки по размерам не подразделяют.

2. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки горностая и ласки делят по сортам в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок		
	горностая	ласки	
		белой	светло-коричневой
Первый	Полноволосый, с развившимся волосяным покровом, частой остью и густым пухом, чисто белой окраски. Мездра чистая, тонкая	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белой окраски. Мездра чистая, плотная	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, светло-коричневой окраски. Мездра чистая, тонкая

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок		
	горноста́я	ласки	
		белой	светло-коричневой
Второй	Полноволосый, с развившимся волосяным покровом, но с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость), особенно заметных у основания хвоста и на лобике. Мездра чистая, но несколько утолщенная	Менее полно-волосый, с недо-развившимися остью и пухом, с наличием не-значительной бу-сости, особенно заметной на хво-сте и лобике. Мездра чистая, утолщенная	Менее полно-волосый, с недо-развившимися остью и пухом, по окраске тем-нее, чем в пер-вом сорте. Мезд-ра темная, утол-щенная
Третий	Менее полново-лосый, с недоста-точно развившимся волосяным покро-вом, с незначи-тельной бусостью. Хвост у основания и ло-бик сероватые. Мездра утолщенная	—	—

7. В зависимости от наличия пороков шкурки горноста́я и ласки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	малый	средний	большой
1. Разрывы об-щей длиной к длине шкурки в %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—50,0 вкл.; шкурки, пере-рванные попе-рек
2. Дыры к пло-щади шкурки в %	До 0,5	0,6—1,1	1,1—2,0 вкл.
3. Плесины к общей площади шкурки в %	Не допускаются	До 0,5	0,6—1,0

Продолжение

Пороки	Группы дефектов		
	малый	средний	большой
4. Прострелы дробовые	До 3	4—5	6—10
5. Запекшаяся кровь на мездре или на волосе к площади шкурки в %	Не допускается	До 1,0	1,1—2,0
6. Признаки линьки шкурки	Не допускаются	Ранневесенние, чисто белые, но с незначительно поредевшими остью и пухом. Мездра утолщенная с желтым оттенком	—

Примечания:

1. Шкурки ласки по наличию пороков делят на две группы дефектов: «средний» и «большой». Шкурки ласки, имеющие пороки, не превышающие нормы, установленные для шкурок горностая группы дефектов «малый», дефектами не считаются.

2. Один дробовой прострел на участках меха головы или лапках на шкурках горностая или продольный разрез по череву между передними лапками длиной до 5 см вкл. дефектами не считаются.

3. Шкурки горностая с дробовыми прострелами более одной пробойны (независимо от их количества) на участках меха головы до шеи относятся к группе дефектов «малый» и шкурки с дробовыми прострелами более трех пробойн (независимо от их количества) на участках меха головы и шеи относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на остальных части шкурки.

8. В дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При совокупности одного порока, относимого к группе дефектов «средний» и двух пороков из группы дефектов «малый», шкурки переводят в группу дефектов «большой».

9. Шкурки, имеющие пороки, которые превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также пре-

лые, горелые, поврежденные молью и кожеедом оцениваются не более 25% от стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки горностая и ласки весенние и поздневесенние с сильно поредвшим волосяным покровом, с поглубевшей темной мездрой, летние почти без пуха (чалые), раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, шкурки горностая темнобусые относят к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок горностая и ласки производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок горностая в процентах к стоимости шкурки первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкурок	Сорта											
	Первый				Второй				Третий			
	Нормальные	Группы дефектов			Нормальные	Группы дефектов			Нормальные	Группы дефектов		
		малый	средний	большой		малый	средний	большой		малый	средний	большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок ласки в процентах к стоимости шкурки первого сорта

Сорта	Нормальные	Группы дефектов	
		средний	большой
Первый	100,0	75,0	50,0
Второй	50,0	37,5	25,0

Скидки от зачетной стоимости в %:

за ярко выраженную желтизну или загрязненность волос (кроме хвоста)	10
за правку пластом	10
за отсутствие хвоста (у горностая)	5
за отсутствие головы до шен	10
за отсутствие головы с шеей	25

Изменение № 1 ГОСТ 12565—67 Шкурки горноста я и ласки невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3000

Дата введения 01.02.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»,
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7884, ОКП 98 7885.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, горелые, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, горелые».

(Продолжение см. с. 298)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12565—67)

лые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом, с поглубшей темной мездрой, летние почти без пуха, раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, шкурки горноста я темно-бурые относят к нестандартным».

Пункт 10 исключить.

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурки первого сорта крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)